

మణి సూర్యబీజ రిస్ట్ర

మొలక : ఆర్. జి. హాబ్స్

అనుబంధ : ఎస్. బి. నరసింహారావు



కన్నడ అధ్యయన విభాగ
కృషి విశ్వ విద్యానిలయ
బೆంగళూరు - 560065

U. A. S. Kannada Publications

MANNU SUKSHMAJEEVI SHAstra

(SOIL MICROBIOLOGY)

Author

Dr. R. B. Patil

Translator

S. G. Narasimhachar

Published with the Assistance of the Government of India in the Ministry of Education and Social Welfare under the Scheme for Production of University Level Literature in Indian Languages.

1982

UNIVERSITY OF AGRICULTURAL SCIENCES

BANGALORE-560 065

ಪ್ರಕಟಣೆ : 112


ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ಶಾಸ್ತ್ರ

ಮೂಲ

ಡಾ|| ಆರ್. ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್

ಅನುವಾದ

ಎಸ್. ಜಿ. ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್



1982

ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ

ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 065

ಮೂಲ — ಸಾಯಿಲ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯೋಲಜಿ

ಅನುವಾದ — ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ಶಾಸ್ತ್ರ

(ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಿದ್ಧ
ಗೊಂಡು, ಸಂವಹನ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಕಾಶಿತ) ಪ್ರಥಮ ಮುದ್ರಣ : 1982

ಪ್ರತಿಗಳು : 1000, ಪುಟಗಳು : viii + 120

ಬೆಲೆ : ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರತಿ ರೂ. 10, ಕ್ಯಾಲಿಕೊ ಪ್ರತಿ ರೂ. 20.

© ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದನೆ

ಎಲ್. ಚ. ಹಿತ್ತಲಮನಿ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಸಹ ಸಂಪಾದನೆ

ಸಿ. ಕೆ. ಕಾಮುದಿನಿ

ಸಂಶೋಧನ ಸಹಾಯಕರು

ಭಾಷಾಂತರ ಪರಿಶೀಲನೆ

ಎಸ್. ಎ. ಹೆಗ್ಗಡೆ

ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ವಿಭಾಗ

ಕಲೆ

ಕೆ. ವಿದ್ಯಾಧರಯ್ಯ

ಕಲಾವಿದರು

ಮುದ್ರಣ

ರಜನಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್, ಕಾಮಾರಪಾರ್ಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು

ಕುಲಪತಿಗಳ ಹಾರೈಕೆ

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಎರಡನೆಯ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವಿಂದು ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನೂರಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಕಿ ಹೊತ್ತುಗೆಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ. ಹತ್ತಾರು ಎರಡನೆಯ ಮುದ್ರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಈ ಗ್ರಂಥಗಳ ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಹಾಗೂ ಜನಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ದ್ಯೋತಕ.

ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು ಹಲವಾರು. ಅವುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಪಾರ. ಅವುಗಳ ಮಹತಿ ಹೆಚ್ಚಿನದು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪತ್ತು ಒಂದು ಮೇರು ವರ್ವತ. ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನ ನಾಡಿಗೆಗೆ ಹಾಗೂ ನಾಡಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆದಾಗ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೃಷ್ಠಿ-ತುಷ್ಠಿ, ಭದ್ರತೆ-ಭವ್ಯತೆ, ಸುಖ-ಶಾಂತಿಗಳು ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯ ಸಂದೇಶ ಹರಡಲನುವಾಗುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ದೇಶ ಸೇವೆಯ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯಗಳು.

ಒಂದು ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ಮೊಳೆತ ಪೈರು, ಇಂದು ಹುಲುಸಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ಹೇತುವಾದ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ನನಸಾಗಲು ಈ ಬೆಳೆ ವಿಶಕ್ಯ ಸಾಲದು. ವಿಜ್ಞಾನದ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ನೂರು ನೂರು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಬೇಕು. ಆ ದಿನದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ಕಳಕಳಿಯ ಹಾರೈಕೆ.

ಈಗ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ. ಇದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಸಂಪಾದಕರ ಮಾತು

ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವ ಡಾ|| ಎಲ್. ಬಿ. ಪಾಟೀಲರು ಬರೆದಿದ್ದು, ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಜಿ. ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ ಇದನ್ನು ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ವಿಕಾಸ, ಮಣ್ಣಿನ ವಾತಾವರಣ, ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು, ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ವಿಷಾಣುಗಳು. ಸಾಪಯವ ವಸ್ತುಗಳ ವಿಭಜನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಸಾರಜನಕ ಖನಿಜೀಕರಣ. ಸಾರಜನಕ ಪರಿವರ್ತನೆ, ಇತರ ಖನಿಜ ಪೋಷಕಾಂಶ ಪರಿವರ್ತನೆ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಕರಡೋದುವಿಕೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದವರು ಶ್ರೀ ಎಂ. ರಮೇಶ್, ಮುಖಪುಟದ ಪಡಿಯಚ್ಚು ತಯಾರಿಸಿದವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಆರ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿಯೋ ದವರು. ಇವರಿಗೆ ನಷ್ಟ ನೆನಕೆಗಳು.

ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತ ರೈತಬಾಂಧವರು, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರುಗಳಿಗೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವುದೆಂದು ಅಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ
ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ
ಬೆಂಗಳೂರು-560 065

ವೀ. ಚ. ಹಿತ್ತಲಮನಿ
ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಹಾಗೂ
ಕೆ.ಆ.ಸ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

ಪರಿವಿಡಿ

ಕುಲಪತಿಗಳ ಹಾರೈಕೆ	iii
ಸಂಪಾದಕರ ಮಾತು	iv
ಪರಿವಿಡಿ	v
ಅಧ್ಯಾಯ 1. ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ವಿಕಾಸ ಮತ್ತು ಮೂಲ್ಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು	1
ಅಧ್ಯಾಯ 2. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ದಾತಾವರಣ	4
ಅಧ್ಯಾಯ 3. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು	11
ಅಧ್ಯಾಯ 4. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	19
ಅಧ್ಯಾಯ 5. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಾಣುಗಳು	56
ಅಧ್ಯಾಯ 6. ಸಾವಯವ (ಸೇಂದ್ರೀಯ)ವಸ್ತುಗಳ ವಿಭಜನೆ-ತಳಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಸಸ್ಯವರ್ಗಗಳು	62
ಅಧ್ಯಾಯ 7. ಸಾವಯವ ವಸ್ತುಗಳ ವಿಭಜನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು	67
ಅಧ್ಯಾಯ 8. ಸಾರಜನಕ ಖನಿಜೀಕರಣ	79
ಅಧ್ಯಾಯ 9. ಸಾರಜನಕದ ಪರಿವರ್ತನೆ-ನಿಕ್ಷಾರಜನಕೀಕರಣ	87
ಅಧ್ಯಾಯ 10. ಗಾತ್ರದ ಬದ್ಧ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು	101
ಅಧಾರ ಗ್ರಂಥಗಳು	108
ಪರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದಕೋಶ	110

ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ಶಾಸ್ತ್ರ

ಒಪ್ಪೋಲೆ

ಪುಟ	ಸಾಲು	ತಪ್ಪು	ಒಪ್ಪು
32	8	ಶರೀರಗಳು	ಶರೀರಗಳು
39	2	ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತಲೂ	ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತಲೂ
86	4	N^{O_2}	NO_2
100	7	ಜೀವಿಯಿದ	ಜೀವಿಯಿಂದ

ಅಧ್ಯಾಯ I

ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ವಿಕಾಸ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು

ಭೂಮಿಯು ಸುಮಾರು 4.5 ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಉದ್ಭವವಾಯಿತೆಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಅದಾದ ಒಂದು ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ತರುವಾಯ, ಜೀವಿಗಳು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಆಳವಿಲ್ಲದ ಸಮುದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವವಾಗಿರಬೇಕು. ತೀರಾ ಪ್ರಾರಂಭದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕರಹಿತ ಇಂಗಾಲ (CH_4), ಅಮೋನಿಯಾ (NH_3), ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ (H_2S) ಮತ್ತು ನೀರಿನ (H_2O) ಅಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ವಾತಾವರಣವು ಇದ್ದಿರಬೇಕು. ಆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬಿರುಸಾದ ಉದಾತ್ತೀತ ಕಿರಣಗಳ ಪಸರಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಈ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಅನಿಲಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಯೋಜನೆಗೊಂಡು ಶರ್ಕರ, ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲ, ಫ್ಯೂರೈನ್, ಪಿರಿಮಿಡೈನ್ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬು(ಮೇದಸ್ಸು) ಆಮ್ಲಗಳು ಉದ್ಭವವಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಪರಮಾಣುಗಳು ಬಹುರೂಪಿತಗೊಂಡು ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್, ಲಿಪಿಡ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ಈ ಪರಮಾಣುಗಳ ಪದೇ ಪದೇ ತಾಕಲಾಟದಿಂದ ಮುಂದೆ ತೀರ ಪ್ರಾರಂಭದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಕೋಶದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ವಿದೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಆಮ್ಲಜನಕ ಉದ್ಭವಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ತೀರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಕೋಶವು ತನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಸಮುದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡುಬಿದ್ದ ಸಾವಯವ ಸಾರದ ಸಮುತ್ಪಾದದಲ್ಲಿ ಹುದುಗುವಿಕೆಯ ಜೀವದ್ರವ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿರಬೇಕು. ಹುದುಗುವಿಕೆಯ ಜೀವದ್ರವ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಯು ಕ್ಲಾಸ್ಟಿಡಿಯ, ದುಗ್ಲಾಪ್ಪ, ವಿಕಾಣುಜೀವಿ ಅಥವಾ ಯೀಸ್ಟ್ ಗಳಿಂದಾಗುವ ದುಧ್ಯಸಾರ ಹುದುಗುವಿಕೆಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತಿರಬೇಕು. ಮೊಟ್ಟಮೊದಲಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ಜೀವನ ಉದಾತ್ತೀತ ಕಿರಣ ಪ್ರಸರಣೆಯ ನಿರ್ಜೀವೀಕರಣ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲು ಸಮುದ್ರದ ಕೆಳಪದರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಬೇಕು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗವೆಲ್ಲ ನಿರ್ಜೀವಯುತವಾಗಿತ್ತು. ವಸಾ

ಯವ ಸಾರದಿಂದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮುಗಿದಮೇಲೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಆಮ್ಲರಹಿತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಾವಯವ ಮತ್ತು ನಿರವಯವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಕೋಶವಸ್ತುವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡವು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾದರಿಯ ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದರೆ, ಗಂಧಕವನ್ನು ಅಪಕರ್ಷಕ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳು. ಇವು ಸಲ್ಫೇಟ(ಗಂಧಕವಸ್ತು)ನ್ನೇ ತುದಿಗಳ ವಿದ್ಯುದ್ವಾಹಕ ಸ್ವೀಕಾರಕಗಳನ್ನಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಸಾವಯವ ಪರಮಾಣುಗಳನ್ನು ಇಂಗಾಲ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಮೂಲವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸಲ್ಫೈಡ್‌ಗಳೂ ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚುಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಮತ್ತು ಉದಾಹಿತ ಕಿರಣಗಳ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆಯಿಂದ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿರುವಂತಹ ಓಜೋನ್‌ವಲಯ ನಿರ್ಮಾಣವಾದಾಗ ಅಪಕರ್ಷಿತ ಗಂಧಕ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಜಲಜನಕ ಕೊಡುಗೆಗಳಾಗಿ, ಪ್ರಸರಿತ ಬೆಳಕನ್ನು ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಇಂಗಾಲ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ಇಂಗಾಲ ಮೂಲವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿರ್ವಾಯುಪರ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳು ವಿಕಾಸಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ಜೀವಿಗಳ ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸುವಿಕೆಯು ಆಮ್ಲಜನಕರಹಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ಸಾರಜನಕ ಮತ್ತು ಇಂಗಾಲ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಬೆಳೆದಂತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ಜಗತ್ತು ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಿತ ಸಾವಯವ ವಸ್ತುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದುವು. ಇದು ಸಾವಯವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾವಯವ ಮಾಧ್ಯಮ ಜೀವಿಗಳ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ವಿಡಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಹಂತವು ಇಂಗಾಲ, ನೀರು ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ತಾವೇ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬಲ್ಲ ನೀರಿನ ಶೈವಲ ಸಂಬಂಧ ಜೀವಿಗಳ ವಿಕಾಸ. ಈ ಶೈವಲಗಳು ನೀರಿನಿಂದ ಜಲಜನಕ ಅಂಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದವು. ವಾಯುಮಂಡಲವು ಆಮ್ಲಜನಕ ಯುಕ್ತವಾದಂತೆ ಹಾಗೂ ಇಂಗಾಲ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡಿನ ಸ್ವಯಂಪೋಷಿತ ಸ್ಥಿರೀಕರಣದ ಮುಖಾಂತರ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವಯವ ವಸ್ತು ಕೊಡಬಿದ್ದಂತೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವಾಯುಪರ, ಸಾವಯವ ಮಾಧ್ಯಮ ಶೀಲೀಂಧ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಟಿಸಿವಿ ಚಕ್ರ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಣ ಸಾಗಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳುಳ್ಳ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳು ವಿಕಾಸಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ಆಮ್ಲಜನಕವೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ದೊರೆತಂತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉತ್ಕರ್ಷಣದಿಂದ ಇಂಗಾಲ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ನೀರುಗಳಾಗುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಉಸಿರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಮುಂದೆ ನಿರವಯವ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದವು. ರಸಾಯನ ಸಂಶ್ಲೇಷಣ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆರಳು ಮತ್ತು ಉಷ್ಣಾಂಶವು ಕಡಮೆ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನೂ ಬೆಳಕಿನ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಜೀವಿಸುವ ಏಕಾಣುಗಳು ಪ್ರಕಾಶ ಮತ್ತು ಉಷ್ಣಾಂಶವಿರುವ ಭೂ

ಪ್ರದೇಶವನ್ನೂ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಾಗುವು. ಶೈವಲ ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಸಹಜೀವನದಿಂದ ಶಿಲಾವಲ್ಕಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿರಬಹುದು. ಉಷ್ಣತೆ, ಚಳಿ ಮತ್ತು ಉದಾತ್ತೀತ ವಿಸರಣೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧಿಸುವ ಗಣನೀಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಬೆಳಕು. ಇಂಗಾಲ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಸಿಜ ವಸ್ತುಗಳಿಂದಲೇ ಜೀವನ ಪನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪಡೆದಿರುವ ಶಿಲಾವಲ್ಕಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಥಮ ವಸಾಹತುಗಳಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದವು. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇಂಗಾಲ, ಸಾರಜನಕ, ಗಂಧಕ, ಕಬ್ಬಿಣ ಇತ್ಯಾದಿ ಜೀವೋಭೂರಾಸಾಯನಿಕ ಚಕ್ರಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ವಾದ ಹೊಸಜೀವಿಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಅನಂತರ ಮೇಲ್ಕುಟ್ಟಿದ ಜೀವಿಗಳು ಅಂದರೆ, ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತೋರಿದವು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಹಾರ ಉತ್ಪಾದಕ ಗಳಾಗಿಯೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ವಿಭಾಜಕಗಳಾಗಿ(ಕೊಳೆತಿನಿ) ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಜೀವವ್ರವ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಜೀವೋಭೂರಾಸಾಯನಿಕ ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪರ್ತಿಗಳಾಗಿ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಪರಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಜೀವಿಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆದವು. ಮೈಕೊರೈಜಲ್ ಸಾಂಘಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಜೇರು ಗಂಟುಗಳ ಸಹಜೀವನಗಳು ಮಾದರಿಯ ಲಾಭದಾಯಕ ಕೂಡುಬಾಳಿಕೆಯ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಸಸ್ಯಗಳ ಮೇಲಿನ, ರೋಗಕಾರಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಪರಾವಲಂಬಿ ಕೂಡುಬಾಳಿಕೆಯ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿವೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳು ಕೊಳೆತಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಹಾರವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಅಮೋನಿಯಾ ಅಥವಾ ಸಾರಜನಕ ಮತ್ತು ಗಂಧಕಗಳ ಉತ್ಪರ್ಷಕಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ. ಮಗ್ಗಿನಲ್ಲಿಯೆ ಅಕ್ಕಿನೂ ಮೃತೀಟುಗಳು, ಏಕಾಣುಜೀವಿ ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಅನೇಕ ಪ್ರತೀವಿ(ಆಂಟಿ ಬಯೋಟಿಕ್)ಗಳ ಉಗಮಗಳಾಗಿ ಕೆಲವು ರೋಗಜಿಹ್ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅವು ಮಾನವ ಪರಿಸರಗಳ ಮನುಷ್ಯ ನಿರ್ಮಿತ ಕಲುಷಿತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಔದ್ಯಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಈ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿರಾಸ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಧ್ಯಾಯ 2

ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ವಾತಾವರಣ

ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಜೀವಿಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು. ಜೀವಿಗಳು ಎಂದರೆ ಸಸ್ಯಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಣುಜೀವಿಗಳು; ಜೀವವಿಲ್ಲದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಎಂದರೆ ಖನಿಜ ಸಂಬಂಧದ ವಸ್ತುಗಳು, ಸಾವಯವ(ಸೇಂದ್ರಿಯ) ಪದಾರ್ಥಗಳು. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಗಾಳಿ ಅಥವಾ ಅನಿಲಗಳು.

ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ತೇವಾಂಶ

ನೀರು, ಗಾಳಿ, ಬೆಳಕು ಇವೇ ಮುಂತಾದುವುಗಳ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಬೆಟ್ಟದಂಥ ಬಂಡೆಗಳು(ಕಲ್ಲಿನ ಬಂಡೆಗಳು) ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಮರಳಿನಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಗೆಬಗೆಯ ಆಕಾರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಖನಿಜಾಂಶಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಈ ಮಾರ್ಪಾಡಾದ ಖನಿಜಾಂಶಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಗಾತ್ರದ ಮೇಲೆ ನುರುಜು ಕಲ್ಲು(ಗಾತ್ರ 2 ಮಿಲಿಮೀಟರ್), ಸ್ವಲ್ಪ ಒರಟಾದ ಮರಳು(ಗಾತ್ರ 2 ರಿಂದ 0.2 ಮಿಲಿಮೀಟರ್), ಮತ್ತು ನಯವಾದ ಮರಳು (ಗಾತ್ರ 0.2 ರಿಂದ 0.02 ಮಿಲಿಮೀಟರ್), ಗೋಡು ಅಥವಾ ಮೆಕ್ಕಲು (ಗಾತ್ರ 0.02 ರಿಂದ 0.002 ಮಿಲಿಮೀಟರ್) ಮತ್ತು ಜೇಡಿಮಣ್ಣು (ಹರಳಿನ ಗಾತ್ರ 0.002 ಮಿಲಿಮೀಟರ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಸಣ್ಣ)ಗಳೆಂದು ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು.

ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ ಮಣ್ಣಿನ ಹಳಕುಗಳ ಹೆಚ್ಚುಕಡಮೆಯ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣಿನ ರಚನೆ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ರಚನೆಗೆ ಮರಳು ಭೂಮಿ, ಗೋಡು ಭೂಮಿ, ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ, ಜೇಡಿಮಣ್ಣು

ಮಿಶ್ರಿತ ಭೂಮಿ ಎಂಬುದು ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡುವುದು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮೇಲ್ಮೈ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವುಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಕೃತಿಯ ಅಳತೆ ಹಾಗೂ ಅವು ಕೇಯೋಲೈಟ್, ಮಾಂಟ್ ಮೊರಿಲೋಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೈಟ್ ಎಂಬ ಖನಿಜಾಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದೇ ಆಗಿದೆ. ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳು ಮಣ್ಣಿನ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ಮಣ್ಣಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ, ಭೌತಿಕ ಹಾಗೂ ಜೈವಿಕ ಗುಣಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ಕೇಯೋಲೈಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಜೇಡಿಮಣ್ಣುಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮಕಣಗಳ ಮೇಲ್ಮೈ $50 \text{ m}^2/\text{g}$ ಮತ್ತು ಮಾಂಟ್ ಮೊರಿಲೋಸೈಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಕಣಗಳ ಮೇಲ್ಮೈ $800 \text{ m}^2/\text{g}$ ಗಳಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ. ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುದ್ವಾಹಕ ಶಕ್ತಿಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಧನ ವಿದ್ಯುದ್ವಾಹಿ ಕಣಗಳಾದ ಜಲ ಜನಕ (H^+), ಪೊಟ್ಯಾಷ್ (K^+), ಸೋಡಿಯಂ (Na^+), ಕ್ಯಾಲ್ಷಿಯಂ (Ca^{++}) ಮ್ಯಾಗ್ನೀಸಿಯಂ (Mg^{++}) ಮತ್ತು ಅಮೋನಿಯಂ (NH_4^+) ಗಳು ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಕಣಗಳ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಆಕರ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಕಲಿಲ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಅನಿಲಗಳು ಒತ್ತಾಗಿ ದುಂದಗಟ್ಟುವಿಕೆಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ವಿನಿಮಯಸ್ಥಿತಿ ಎಂಬುದು ಹೆಸರು. ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳ ಮೇಲೆ ಧನ ವಿದ್ಯುದ್ವಾಹಿ ಕಣಗಳು ದುಂದಗಟ್ಟುವಿಕೆಗೆ ಧನ ವಿದ್ಯುದ್ವಾಹಿ ಕಣ ವಿನಿಮಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಧನ ವಿದ್ಯುದ್ವಾಹಿ ಕಣಗಳ ವಿನಿಮಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ: ಏಕೆಂದರೆ, ವಿದ್ಯುದ್ವಾಹಿ ಕಣಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಕಲಿಲ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ವಿನಿಮಯಗೊಂಡು, ವಿದ್ಯುದ್ವಾಹಿ ಕಣಗಳು ಮಣ್ಣು ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇವು ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ಬಳಕೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ.

ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥ

ಗಾಳಿ, ಮಳೆ, ಬಿಸಿಲು ಮುಂತಾದ ಹವಾಮಾನ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ, ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳು ಚೂರು ಚೂರಾಗಿ ಮುಂದೆ ಸಣ್ಣಕಣಗಳಾಗಿ, ಖನಿಜಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಅದು ಸಸ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸುವ ಮಣ್ಣು ವಿನಿಮಯವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮಸ್ ರೂಪದ ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇರಬೇಕು. ಸತ್ತ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಉಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ವಿಭಜಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿ ವಿಭಜನೆಗೊಂಡ, ಕೊಳೆತ, ಕಿರಗಬಲ್ಲ ಸಾವಯವ ಮತ್ತು ನಿರವಯವ ಅಂಶವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳ ಸತ್ತ ಅವಶೇಷಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೊಳೆಯದಿರುವ ನಾರು, ಕಡ್ಡಿ ಮತ್ತು

ಅಸ್ಥಿಮೇ ಮುಂತಾದುವುಗಳು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಹ್ಯೂಮಸ್ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮಸ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 1-4 ಭಾಗ ಸಾವಯವ ವಸ್ತುವಿರುತ್ತದೆ.

ಪೀಟ್ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ವಸ್ತುಗಳು ಶೇಕಡಾ 60-80 ಭಾಗವಿರಬಹುದು. ಜೇಡಿಯಂತೆಯೇ ಹ್ಯೂಮಸ್ ಸಹ ಕೆಲಿಲಯಂಕ್ತವಾಗಿದ್ದು ಮಣ್ಣಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ, ಭೌತಿಕ ಹಾಗೂ ಜೈವಿಕ ಗುಣಧರ್ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಧನ ವಿದ್ಯುದ್ವಾಹಕ ಕಣಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ನೀರಿನ ಅಂಶ

ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ನೀರಿನ ಅಂಶ(ತೇವಾಂಶ)ವು ಅನೇಕ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದಿಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಣದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವು ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಳಗಳು ದೊಡ್ಡವೇ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣವೇ ಇರಬಹುದು. ಈ ಕಣಗಳಿಂದ ಕಣಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಸ್ಥಳವು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಾಲರಿಯಂತೆ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗ (ಸ್ಥಳ)ಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯೂ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಅಂಶವೂ ಅಡಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಳೆಯಾದರೆ, ಈ ಕಣದಿಂದ ಕಣಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಜಾಗಗಳೆಲ್ಲ ಬರೀ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗಿ ಗಾಳಿಯೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಕಾಲದ ಬಳಿಕ ಈ ಹೆಚ್ಚಾದ ನೀರು ಭೂಮಿಯ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಸಿದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಕೆಳಗೆ ಬಸಿದ ನೀರಿಗೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಿತ ನೀರು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಈ ನೀರು ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗಂಧುಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಮನಾಳಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದಿಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆಗ ಈ ನೀರು ಒಂದು ಜಮೀನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಜಮೀನು ಅಥವಾ ಮಣ್ಣು ಒಣಗುತ್ತಾ ಬಂದಂತೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಹಿಡಿದಿಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಅಥವಾ ದ್ರವವು ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಬಂದು ನೀರು ಸಸ್ಯಗಳ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ದಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಈ ನೀರನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿರುವ ಶಕ್ತಿಗಳು ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಸ್ಯಗಳ ಬೇರುಗಳು ಈ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿರುವ ದ್ರವ (ನೀರು)ವನ್ನು ಬೇರುಗಳ ಮೂಲಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಸಮರ್ಥವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ನೀರಿನ ಅಭಾವದಿಂದ ಸಸ್ಯಗಳು ಬಾಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಬಾಡು ಬಿಂದು. ಆದರೆ, ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಜೀವಿಸಿರಬಲ್ಲವು;

ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಅವುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಕುಂದಿ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮಣ್ಣು ಜಲಸಂತ್ಯಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣದಿಂದ ಕಣಕ್ಕೆ ಇರುವ ಸ್ಥಳವೂ ನೀರಿನಿಂದ ಅಕ್ರಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಸಸ್ಯಗಳೂ ಜೀವಿಸಲಾರವು ಮತ್ತು ವಾಯುಪರ(ವಾಯುವಿನಿಂದ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜೀವನಮಾಡುವ) ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳೂ ಜೀವಿಸಲಾರವು. ಏಕೆಂದರೆ, ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ವಾಯುವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ(ಜಮೀನಿನ ಒಳಗೆ)ರುವ ಗಾಳಿ

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣುಗಳೂ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬಿರುಕುಗಳು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ, ಒಂದು ಜಮೀನಿನ ಘನ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 50 ಪ್ರಮಾಣದಷ್ಟು ಗಾಳಿ ಇರುವ ಜಾಗ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ, ಕಣದಿಂದ ಕಣಕ್ಕೆ ಬಿಚ್ಚಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಗಾಳಿಯು ಇದ್ದೇ ಇರಬೇಕು. ಭೂಮಿಯ ಅಂದರೆ, ಮಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಆಡಕವಾಗಿರುವ ಗಾಳಿಗೂ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಸುವ ಗಾಳಿಗೂ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಣ್ಣಿನ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣದ ಗಾಳಿಗಳ ವಿಸಮಯಕ್ಕೆ ಎಡೆಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ವಾಯುಪರ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿ(ಆಮ್ಲಜನಕ) ಯಾಡುವ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ ; ಆದರೆ ಇದು ತಪ್ಪು ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಣ್ಣು(ಜಮೀನು)ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಾಳಿ ಇದೆ ಎಂದು ಕಂಡರೂ, ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಇದೇ ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕವು ಬಹಳ ಕಡಮೆಯಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳೂ ಇದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕವಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕುವ ನಿರ್ವಾಯುಪರ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಜಲಸಂತ್ಯಷ್ಟ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಣದಿಂದ ಕಣಕ್ಕೆ ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ದುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನಿರ್ವಾಯುಪರ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಸುತ್ತವೆ : ಸಾವಯವ ಆಮ್ಲಗಳೂ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂತಿಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳೂ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಶೇಖರವಾಗುತ್ತವೆ. ನಿರ್ವಾಯುಪರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫೈಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಕರ್ಷಿತ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಸಂಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಶೇಖರವಾಗಿ ಸಸ್ಯಬೀಜಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದು. ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ನೈಟ್ರೇಟ್

ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಫೇಟುಗಳೂ ದಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಗಾಳಿಯ ಅತೀವ ಏರು ಪೇರುಗಳಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಷ್ಟು ತೊಂದರೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಮಣ್ಣಿನ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಬಹಳ ಕಡಮೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಮತ್ತು ಒಹಳ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಗಾಲ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಉಳ್ಳ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಭೂಮಿ(ಮಣ್ಣು)ಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ನೀರು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಇಂಗುವ ಅಥವಾ ಬಸಿದುಹೋಗುವ ಜಮೀನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಮ್ಲಯುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಸಿಯಂ ಕ್ಷಾರಗಳಿಲ್ಲವು ತಟಸ್ಥ ಮಣ್ಣುಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ : ಅಂದರೆ, ಅವು ಆಮ್ಲೀಯ(ಹುಳಿ)ವೂ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕ್ಷಾರೀಯವೂ ಅಲ್ಲದ ಜಮೀನುಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ವಿಸಮಯ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಉಳ್ಳ ಮಣ್ಣುಗಳು ಕ್ಷಾರ ಸ್ವಭಾವದವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮಣ್ಣಿನ pH ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹ್ಯೂಮಸ್ ಮಣ್ಣಿನ pH ಮಟ್ಟವು ಹೆಚ್ಚು ಏರುಪೇರಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ : ಸಾರಜನಕೀಕರಣದಂಥ ಕೆಲವು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ pH ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಏರುಪೇರಾಗದಿರುವುದು ಅವಶ್ಯ. ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಆಮ್ಲಯುಕ್ತ ಕಾಡುಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳು ಸಾಗುವಳಿಯೋಗ್ಯ ತಟಸ್ಥ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆಕ್ಸಿನೊಮೈಸೀಟ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ತಟಸ್ಥದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕ್ಷಾರಯುತ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಆಮ್ಲ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡಮೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಮಣ್ಣಿನ ಉಷ್ಣಾಂತ

ಸೂರ್ಯನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಜಮೀನಿನ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಆ ಭೂಮಿ ಇರುವ ದಿಕ್ಕು, ಅದರ ಇಳುಕಲು, ಮಣ್ಣಿನ (ಭೂಮಿಯ) ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆದಿರುವ ಸಸ್ಯಸಂಪತ್ತು ಇವುಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸಸ್ಯಸಂಪತ್ತು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಖರುವ ಕಿರಣಗಳ ಪ್ರಜ್ವಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ತಾಕದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಮಣ್ಣುಗಳು ತಿಳಿಯಾದ ಬಣ್ಣದ ಮಣ್ಣುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೂರ್ಯಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಮದರದ ಮಣ್ಣು ಕೆಳಪದರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣಾಂತದ ಏರುಪೇರುಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ತೇವಯುಕ್ತ ಮಣ್ಣುಗಳು ಶುಷ್ಕ (ಒಣ) ಮಣ್ಣಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು

ಉಷ್ಣವನ್ನು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ತೇವಯುಕ್ತ ಮಣ್ಣುಗಳು ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿಯೆ ಅಧಿಕ ಏರುಪೇರುಗಳನ್ನು ಕಡಮೆಮಾಡುತ್ತವೆ. ಉಷ್ಣಾಂಶವು ಅಧಿಕವಾದಂತೆಲ್ಲ, ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹೊರಗೂ ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಒಳಗೂ ನಡೆಯುವ ಅನಿಲ ವಿನಿಮಯ ಅಧಿಕಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಉಷ್ಣಾಂಶವು ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳ ಜೀವದ್ರವ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಪದರದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಾಗುವ ಅಧಿಕ ಏರುಪೇರುಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತವೆ: ಆದರೆ, ಕೆಳಪದರದಲ್ಲಿಯೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಪಂಚೀಕರಣಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಅದು ಅತ್ಯಲ್ಪವಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಪದರದಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಿಗಳಂತೆ ಉಷ್ಣವು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಮೆಯಾದರೆ ಪಡುವಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಬಾಧೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಚಳಿಗಾಲ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಲುಗಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಬದಲಾಗಿ ಕುಂದುತ್ತದೆ. ಅತಿ ಉಷ್ಣವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಚಳಿಯೂ (೨), ಇವುಗಳಿಗೆ ಮಾರಕವಾಗುವುದು ಅಪರೂಪ.

ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು

ಸಾವಯವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಫಲವತ್ತಾದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಶ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಸಸ್ಯವರ್ಗಕ್ಕೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪರ್ಧೆಯೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸಾವಯವ ಮಾಧ್ಯಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಸಾವಯವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಇಂಗಾಲ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಮೂಲವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸ್ವಪೋಷಿತ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಸಿರವೆಯವ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಉತ್ಕರ್ಷಣೆಯನ್ನೇ ಶಕ್ತಿಮೂಲವಾಗಿಯೂ ಇಂಗಾಲ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ಇಂಗಾಲಮೂಲವಾಗಿಯೂ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಶೈವಲಗಳು ತೇವಾಂಶವಿರುವ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಇವು ವಾಯುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಇಂಗಾಲ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ಇಂಗಾಲಮೂಲವಾಗಿಯೂ ಸೂರೈನ ಬೆಳಕನ್ನು ಶಕ್ತಿಮೂಲವಾಗಿಯೂ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಕ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳು ಅಪಕರ್ಷಿತ ಗಂಧಕ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಜಲಜನಕಮೂಲವಸ್ತುವಾಗಿಯೂ ಮಂದ ಬೆಳಕನ್ನು ಶಕ್ತಿಮೂಲವಾಗಿಯೂ ಇಂಗಾಲ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ಇಂಗಾಲಮೂಲವಾಗಿಯೂ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ನಿರ್ವಾಯುಪರ ಸ್ಥಿತಿ ಅವಶ್ಯವಿದ್ದು ಜಲೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಇಂಥ ಸ್ಥಳಗಳು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಯ್ದಿರುವ ಬತ್ತದ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.

ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಸಸ್ಯಗಳು ಹವಾಮಾನದ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗುವಿಕೆ ಹವಾಮಾನಸ್ಥಿತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಮೆಯಾದಂತೆಲ್ಲ, ಉಷ್ಣಾಂಶ, ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು

ಪೋಷಕ ದ್ರವ್ಯಗಳೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತ ಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಹವಾಮಾನದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಇರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಣ್ಣು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುವುದು ಅಪರೂಪ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮರಗಳ ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಉದುರಿಹೋಗಿ ಮುಂದೆ ಬೇಸಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಬೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯುವಂಥ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳಿಂದ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಋತುಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಿದಂತೆಲ್ಲ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಾಗುವ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟು ನಿಖರವಾಗಿ ಅಳತೆಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಕಾರಣ ಋತು ಬದಲಾವಣೆಯ ಫಲವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕುರಿತು ಮುಂದಾಗಿ ಹೇಳಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಕಡಮೆ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಧನಗಳು ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಇದೆಯೆಂದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬಹುದು.

ಅಧ್ಯಾಯ 3

ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು

ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ ಸಹ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ; ಏಕೆಂದರೆ, ಇವು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಪೋಷಕ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತವೆ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಶೈವಲ, ಶಿಲೀಂಧ್ರ, ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳು, ಪ್ರೋಟೋಜೋವ ಮತ್ತು ವಿಷಾಣು ಇವೇ ಮುಂತಾದವು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಏಕಾಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಟೋಜೋವ ಅಥವಾ ವಿಷಾಣು ಜೀವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣುಜೀವಿಗಳ ಜೈವಿಕ ತೂಕ ಏಕಾಣುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾದರಿಯ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ, ಬಿಸಿಲುಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳು ಉದಾರುಹಂಫ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಜೀವಿಗಳ ಒಣತೂಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಅವುಗಳ ಪರಿಮಾಣ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರುತ್ತದೆ:

ಒಂದು ಹೆಕ್ಟೇರಿನಲ್ಲಿ

ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳು	...	7.30 ಹೆ/ಕೆ.
ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು	...	454.00 ಹೆ/ಕೆ.
ಅಕ್ಕಿನೊಮ್ಮೆಸೀಟುಗಳು	...	0.20 ಹೆ/ಕೆ.
ಪ್ರೋಟೋಜೋವ	...	1.00 ಹೆ/ಕೆ.
ಜಂತುಹುಳು(ನೆಮಟೋಡ್)ಗಳು ಮತ್ತು ಎರೆಹುಳುಗಳು	...	14.00 ಹೆ/ಕೆ.
ಒಟ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಸ್ಯಗಳು	...	461.50 ಹೆ/ಕೆ.
ಒಟ್ಟು ಜೈವಿಕ ತೂಕ	...	497.00 ಹೆ/ಕೆ.

ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳು ಮುಖ್ಯವಾದುವು : ಏಕೆಂದರೆ, ಅವುಗಳಿಂದಲೇ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಜೀವರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏಕಾಣು ಜೀವಿಯ ತೂಕಕ್ಕೂ ಅದರ ಹೊರಮೈ ಅಳತೆಗೂ ಇರುವ ದೆಚ್ಚಿನ ಅಂತರ: ಅನುರೇ. ಅದರ ಹೊರಮೈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದು, ಪೋಷಕ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊರಮೈಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ(ಒೀರಿಕೊಳ್ಳುವ) ಶಕ್ತಿಯಿರುತ್ತದೆ. ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಪೋಷಕ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಲಭ ರಚನೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ವಶ್ಯವಂತೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನೇ ಬಹುದು ಸಂತತಿಯನ್ನು ನೀಗಬೇಗನೆ ದೃಢಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಸಂಯುಕ್ತಪಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು, ಅವುಗಳನ್ನು ಶಕ್ತಿಮೂಲ ವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ವಾಯು ಪರತೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಾಯುಪರ ಇಲ್ಲವೇ ಸಾವಯವ ದ್ರಾಢ್ಯಮದಿಂದ ಸ್ವಪೋಷಿತ ಜೀವ ದ್ರವ್ಯಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಗ ವನ್ನು [ಅನುರೇ ಬಂದು ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್(ಒಣಗಿರುವ) ಜೀವಕೋಶಗಳು ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಮಿಲಿಮೀಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ] ಕೆಳಗೆ ಕಾಣಿಸಿದೆ :

ಅಜಟೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಜಿಲಿಸ್	1200
ಸ್ಯೂಡೊಮೊನಾಸ್ ಫ್ಲೈಟಿಸೆನ್ಸ್	50
ನೊಕಾರ್ಡಿಯ ಓಪಾಕ (ಆಕ್ಟಿನೋಮೈಸೀಟ್)	12
ಫೈಸೇರಿಯಂ ಸೊಲಾನಿ (ಫೀಲಿಂಧ್ರ)	10
ಕ್ಲೋಸ್ಟ್ರಿ (ಶೈವಲ)	40
ಪ್ಯಾರಮೀಷಿಯಂ (ಪ್ರೋಟೋಜೊವ)	0.5

ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಗಿರುವ ಇತರ ಗುಣಗಳೆಂದರೆ: ಸಾರಜನ ಕೀಕರಣ ಕ್ರಿಯೆಯು ನೀಲಿ ಹಸುರು ಶೈವಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ,(ಪಾಸ್ತವವಾಗಿ ಕೆಲವು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ನೀಲಿ ಹಸುರು ಶೈವಲಗಳನ್ನು ನೀಲಿ-ಹಸುರು ಏಕಾಣುಜೀವಿ ಎಂದು ಕರೆಯಬಯಸುತ್ತಾರೆ.) ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಸಾರಜನಕೀ ಕರಣ ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಗಂಧಕ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣ ಸಂಯುಕ್ತ ಪಸ್ತುಗಳ ಉತ್ಪರ್ಷಣೆ ಬಹುವಾಗಿ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಮಣ್ಣಿನೋಳಿಗೆ ಇರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಮುಖ್ಯ ಗುಣವುಗಳು

ಅದಾರ ಸೇವನೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು

ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಧಾನದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ನೋಡುವುದು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಸಾದೃಶ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ವಿಕಸನ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಮೇಲೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವರ್ಗೀಕರಣತತ್ವ: ಆದರೆ, ಅಂಥ ವರ್ಗೀಕರಣವು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಷ್ಟೇನೂ ಸುಸಂಬಂಧವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಅವುಗಳನ್ನು ಅವು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಭೂರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವೆಂದು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಕೆಲವು ಭೂರಾಸಾಯನಿಕ ವರ್ಗೀಕೃತ ಗುಂಪುಗಳ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ :

ಭೂರಾಸಾಯನಿಕ ವರ್ಗ	ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳು	ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು	ಅಕ್ಷಿನೋಮೈ- ಸೀಟುಗಳು
1. ಸೆಪ್ಟಿಲೋಸ್ ವಿಭಜನ ಕಾರಿಗಳು	ಆಕ್ಟೋಮೊಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಲ್ಲಸ್ ಸೆಪ್ಟಿಲೋಮೊನಾಸ್	ಆಸ್ಪರ್ ಜೆಲ್ಲಸ್ ಫ್ಯುಸೇರಿಯಂ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮ	ನೊಕಾರ್ಡಿಯ ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೊಮೈಸಸ್ ಮೈಕ್ರೊಮೊನೊ ಸ್ಟೋರ
2. ಲಿಗ್ನಿನ್ ವಿಭಜನ ಕಾರಿಗಳು		ಕೊಪ್ರಿನಸ್ ಅಗಾರಿಕಸ್ ಪೊರಿಯ	
3. ಪೆಕ್ಟಿನ್ ವಿಭಜನ ಕಾರಿಗಳು	ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಲ್ಲಸ್ ಎರ್ಟ್ವಿನಿಯ ಕ್ಲಾಸ್ಟಿಡಿಯಂ	ಫ್ಯುಸೇರಿಯಂ ಪಟಿಸಿಲ್ಲಿಯಂ	ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೊಮೈಸಸ್
4. ಅಮೋನಿಯ ಉತ್ಪರ್ಷಕ ಗಳು	ಮೈಕ್ರೊಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಲ್ಲಸ್ ನೈಟ್ರೊಸೊಮೊನಾಸ್	ಆಸ್ಪರ್ ಜೆಲ್ಲಸ್	ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೊಮೈಸಸ್
5. ನೈಟ್ರಿಟೇಟ್ ಉತ್ಪರ್ಷಕ ಗಳು	ನೈಟ್ರೊಬ್ಯಾಕ್ಟರ್	ಆಸ್ಪರ್ ಜೆಲ್ಲಸ್ ಪೆನಿಸಿಲ್ಲಿಯಂ	

- | | | |
|---|--|--------------------------------|
| 6. ನೈಟ್ರೇಟ್
ಅಥವಾ
ನೈಟ್ರೈಟ್
ಅಪಕರ್ಷಕ
ಗಳು | ಅಕ್ಸೊಮೊಬ್ಯಾಕ್ಟರ್
ಸ್ಯೂಡೊಮೊನಾಸ್
ಥಯೊಬ್ಯಾಸಿಲ್ಲಸ್ | ಆಸ್ಪರ್ ಜಿಲ್ಲಸ್
ಪೆನಿಸಿಲ್ಲಿಯಂ |
| 7. ಗಂಧಕ
ಉತ್ಕರ್ಷಕ
ಗಳು | ಹಸರು ಮತ್ತು
ನೇರಳೆ ಏಕಾಣುಗಳು
ಥಯೊಬ್ಯಾಸಿಲ್ಲಸ್
ಬೆಗ್ನಿಯಟೋವ | ಪೆನಿಸಿಲ್ಲಿಯಂ |
| 8. ಗಂಧಕ
ಅಪಕರ್ಷಕ
ಗಳು | ಡೈಸೆಲ್ಡ್ರಿಯೊ
ಬ್ಯಾಸಿಲ್ಲಸ್
ಕ್ಲಾಸ್ಟಿಡಿಯಂ | |

ಲಾಕ್‌ಹೆಡ್ ಮತ್ತು ಚೇಸ್ (1943) ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಆಹಾರಸೇವನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸರಳದಿಂದ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿರುವ ಏಳು ಬಗೆಯ ಮಣ್ಣುಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾದವು ಸರಳ ಮಿಸೆಲವಣುಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ಲೂಕೋಸುಳ್ಳ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದವುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ ಆ ವಸ್ತುಗಳ ವಿವಿಧ ಸಂಯೋಜನೆ ಅವಶ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳು, ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಕಾರಕಗಳು. ಯೀಸ್ಟ್‌ಸಾರ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣುಸಾರಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು, ಅವು ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಇಂಗಾಲಮೂಲವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಸ್ತುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೂ ವರ್ಗೀಕರಿಸಬಹುದು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾದ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳೆಂದರೆ ಸಾವಯವ ಮಾಧ್ಯಮ ಜೀವಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ವಪೋಷಿತ ಜೀವಿಗಳು. ಸ್ವಪೋಷಿತಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಗೆಯಿವೆ : ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಕ ಸ್ವಪೋಷಿತ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸ್ವಪೋಷಿತಗಳು. ಸಾವಯವ ಮಾಧ್ಯಮ ಜೀವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಇಂಗಾಲಮೂಲಗಳಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಕ ಸ್ವಪೋಷಿತಗಳು ಬೆಳಕನ್ನು ಶಕ್ತಿಮೂಲವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡರೆ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಸ್ವಪೋಷಿತಗಳು

ನಿರವಯವ ವಸ್ತುಗಳ ಉತ್ಕರ್ಷಣೆಯನ್ನೇ ಶಕ್ತಿಮೂಲವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇವೆರಡೂ ಇಂಗಾಲ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ಇಂಗಾಲಮೂಲವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಏಲೀಂಧ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೊಜೋವಗಳು ಅಹಾರಸೇವನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಮಾಧ್ಯಮ ಜೀವಿಗಳು. ಕೆಲವು ಏಲೀಂಧ್ರಗಳು, ಜಂತುಹುಳು(ನೆಮಟೋಡು)ಗಳಂಥ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಣ್ಣುಜೀವಿಗಳನ್ನೇ ಭಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರೋಟೊಜೋವಗಳು ಏಕಾಣು ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೂರು ಬಗೆಯ ಅಹಾರ ಸೇವಕಗಳು ಎಂದರೆ ಸಾವಯವ ಮಾಧ್ಯಮ, ದ್ವುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಕ ಸ್ವಪೋಷಿತ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸ್ವಪೋಷಿತಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಶೈವಲಗಳು ದ್ವುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಕ ಸ್ವಪೋಷಿತಗಳಾದರೂ ಕೆಲವು ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.

ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ

ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಪರಿಮಾಣವು ವಾತಾವರಣ ವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಒಂದೇ ವಾತಾವರಣ(ಪರಿಸರ) ಅಥವಾ ವಾಸಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಆ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುತ್ತವೆ. ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ, pH (ಆಮ್ಲಕ್ಷಾರತೆ), ಉಷ್ಣಾಂಶ, ಗಾಳಿಯಾಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಬಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ.

ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತ ನೀರಿದ್ದಲ್ಲಿ, ವಾಯುಪರ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಸೀಮಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇವಲ ಪರೋಕ್ಷ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ. ನೀರುನಿಂತ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಜಿನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿಯಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಾಂದ್ರತೆಯು 3×10^{-6} ಗಿಂತಲೂ ಕಡಮೆಯಾದಾಗ ವಾಯುಪರ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ನಿಶ್ವೇಷವಾಗುತ್ತವೆ ಇಲ್ಲವೇ ಅವುಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಬದ್ಧ ನಿರ್ವಾಯುಪರ ಜೀವಿಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಐಚ್ಛಿಕ ನಿರ್ವಾಯುಪರ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವದ್ರವ್ಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ವಾಯುಪರತೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಾಯುಪರತೆಗೆ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಮರಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಲ್ಪ ನೀರಿನಂಶವಿರುವಾಗಲೂ ಸಹ ನೀರುವಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಸಮರ್ಥವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಜೀಡಿಯುತ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮರಳು ಮಣ್ಣಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೀರಿರುವಾಗಲೂ ಸಹ ನೀರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಸ

ಮರ್ಥವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಜೇಡಿಯಂತ ಮಣ್ಣು ನೀರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಿಗುವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಆ ನೀರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಸಮರ್ಥವಾಗುತ್ತವೆ.

ವಿವಿಧ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ತೇವಾಂಶ ಜೇಡಿಕೆಯು ವಿವಿಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಣ(ರುಷ್ಕ) ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿನೊಮೈಸೀಟುಗಳು ತಮ್ಮ ಜಟಿಲವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ, ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ನಿಶ್ಚೇಷ್ಟಿತವಾಗಬಹುದು. ಶೈವಲಗಳು ತೇವಯುಕ್ತ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೋಟೊಜೋವಗಳು ಆದ್ರ್ವ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಜಟಿಲವಟಿಕೆಯಿಂದಿದ್ದು ಮಣ್ಣು ಒದಗದಂತೆ ಪೂತಿಕೋಶಾ(ಕೋಶಾ)ವರಣ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಬಹುದು. ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ವಾಯುಪರ ಜೀವದ್ರವ್ಯ ಪರಿಣಾಮವಿರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದ್ಧಜೀವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ; ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಐಚ್ಛಿಕ ಜೀವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅದಕಾರಣ ಜಲಸಂಕ್ರಮಣ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬದ್ಧ ಹಾಗೂ ಐಚ್ಛಿಕ ನಿರ್ವಾಯುಪರ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳು ಶೈವಲಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಸಸ್ಯಗಳಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗಿದ್ದರೂ ಅವು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು. ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳು ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದು ತೇವಾಂಶದೊಟ್ಟು ಅಧಿಕವಾಗಿರುವಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೊಜೋವಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಜಲಸಂಕ್ರಮಣ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿನೊಮೈಸೀಟುಗಳು ಕಂಡುಬರುವುದು ತೀರ ಅಪರೂಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

5°C ಕಡಮೆ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಹಾಗೂ 30°C ಅಧಿಕ ಉಷ್ಣಾಂಶವಿದ್ದಾಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಜಟಿಲವಟಿಕೆಯು ಪರಿಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಲಘು ಬೇಸಗೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಮದರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಉಷ್ಣತೆಯು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇಹಪೋಷಕ ಕೋಶಗಳು ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಮದರದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಗಿ, ಕೇವಲ ಬೀಜಕಣಗಳು ಮತ್ತಿತರ ಉಳಿಕೆ ರಚನೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುತ್ತದೆ.

ಆರ್ಕ್ಟ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಬೆಚ್ಚನೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಡೆಗೆ ಬರಬರುತ್ತ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಂಖ್ಯಿಕವಾಗಿ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳು ಪ್ರಧಾನಭಾಗವಾಗಿದ್ದರೂ, ಒಟ್ಟಿನ ಸಸ್ಯಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಭಾಗ ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಚೆರ್ನೊಜೆಮ್, ಚೆರ್ನೊಮೆಲ್ ಮತ್ತು ಕಂದು ಮಣ್ಣು(ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಮಣ್ಣು)ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಿಂಡ್ರ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಮೆ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ಸಿನೊಮೈಸೀಟುಗಳೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.

ಬಹು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದವರಾದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಉದಾಹರಣೆ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಉಪ್ಪಾಂಶವು ಹೆಚ್ಚುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಿಸೋಫಿಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಮಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಈ ದಂತದಲ್ಲಿ ಥರ್ಮೋಫಿಲಿಕ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಾದವರಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರಬಹುದು.

ಮುಸ್ಲಿಮರಾದ ತೇವಾಂಶವು ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ. ಅವುಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆಯು ಕುಗ್ಗುತ್ತದೆ. ಜೀವಿಯು ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ. ಮುಸ್ಲಿಮರಾದ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗಾಲ ರೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಾಂದ್ರತೆಯು ಹೆಚ್ಚುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಸ್ಲಿಮರಾದ ಗಾಳಿ ಹಾಗೂ ಮುಸ್ಲಿಮರಾದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಗಾಳಿಗಳ ನಿರ್ಧಾನ ವಿವರಣೆಯೇ ಕಾರಣ. ಕೆಲವು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಅಧಿಕ ಇಂಗಾಲ ರೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಾಂದ್ರತೆಗೆ ಜನ್ಮ ಹೊಂದಿ ಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಅಂಥವುಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಮುಂದುವರಿದ ಬಹುದು. ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನ್ಮವ್ಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ವಾಯುವರತೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಾಯುಪರತೆಗೆ ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಅವುಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆಯು ಮುಸ್ಲಿಮರಾದ ಅಳಿ ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ ಕವಮಯಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಶಿಲೀಂಧ್ರ. ಅಕ್ಕಿನೊಮ್ಮೆಸಿಟುಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋಜೋಹಗಳು ಮುಸ್ಲಿಮರಾದ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದು, ಅಳಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಾದ ಅಪ್ಪಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇಖ್ರವಾಗಿ ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಡಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಸಿದುಹೋದ ಅವುಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ (ಫೋಡ್‌ಜೋಲ್) ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಮಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಶೇಖರವಾಗುವ ಕೆಲವು ವಲ್ಲಿ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಮುಸ್ಲಿಮರಾದ ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಹಾಗೂ ಕಾಲಿಕ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಸದೃಶವಾಗಿರುವ ಚೆನೋಜೆಮ್. ಚೆಸ್ಪಾನ್ಮ್ ಮತ್ತು ಕಂದು ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಮೇಲ್ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಫೋಡ್‌ಜೋಲ್ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಮೇಲ್ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬಸಿದುಹೋದ ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಶೇಖರವಾಗುವ ಬಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸಾವಯವ ಉಳಿಕೆಗಳು ಸೇರಿದ ಮಣ್ಣು ಸೆಲ್ಲುಲೋಸ್ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕವಾಗಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳೇ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ಸಮುದಾಯವಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಇತರ ಸಾವಯವ ದ್ರವ್ಯವು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಸಾವಯವ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರೋಟೀನ್, ಲಿಗ್ನಿನ್, ಫಿನಾಲ್ ಮತ್ತು ಮೇಣಗಳ ಪಾಲಿಮರ್‌ಗಳ ಅಸ್ಪಟಿಕ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಹ್ಯೂಮಸ್ಸು. ಇದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬಹುಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದಾಗೂ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಾವಕಾರವಾಗಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ(ಕೆಳಗಿಳಿಸುವ) ಜೀವಿಗಳಿವೆ. ಇವು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇರುಜನಿತ(ಇದ್ದಲ್ಲುಟ್ಟಿದ) ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಸ್ಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ತೀರ ಕೆಳ ಹುಟ್ಟುವಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಜೈಮೋಜಿನಸ್ ಎಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಸ್ಯವರ್ಗವಿದೆ. ಇವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾವಯವ ಉಳಿಕೆಗಳು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿವಂತೆಲ್ಲ ಥಟ್ಟನೆ ಹೆಚ್ಚು ಚಟುವಟಿಕೆಯುಳ್ಳವಾಗುತ್ತವೆ. ಸ್ಯೂಡೊಮೊನಾಸ್ ಮತ್ತು ಸಕ್ಟರಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಜೈಮೋಜಿನಸ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ.

ಮರಳುಗಾಡು ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವ ಬಂಡೆಗಳ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿಯ ಮೊದಲ ವಸಾಹತುಗಳೆಂದರೆ ಶೈವಲ, ಶಿಲಾಪಲ್ಲು ಮತ್ತು ಪಾಚಿಗಳು. ಇವು ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿಮಾಡುತ್ತವೆ; ಆ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಮತ್ತು ಏಕಾಣುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ತಟಸ್ಥ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳು ಪ್ರಧಾನ ಸಸ್ಯವರ್ಗವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದು ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಮತ್ತು ತಟಸ್ಥವಿನ್ ಕ್ಷಾರತೆಯುಳ್ಳ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿನೋಮೈಸೀಟುಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಮಣ್ಣು ಪಾರ್ಶ್ವದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಬಗೆಗಳಲ್ಲಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಮಣ್ಣಿನ ವಿವಿಧ ಆಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ತೇವಾಂಶ, ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಆದ್ದು ಜನಕಾಂಶಗಳಿಂದ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಿನ ವಿವಿಧ ಆಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ವಿವಿಧ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಣ್ಣಿನ ಆಳದಲ್ಲಿಯ pH ಬದಲಾವಣೆಯು ಅಷ್ಟೇನೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ.

ಅಧ್ಯಾಯ 4

ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳು

ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು 5 ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು. ಅವುಗಳೆಂದರೆ: (1) ಏಕಾಣುಜೀವಿ(ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯ)ಗಳು (2) ಅಕ್ಕಿನೊಮ್ಮೆಸೀಟುಗಳು (3) ಶಿಲಿಂಧ್ರಗಳು (4) ಪ್ರೋಟೊಜೊವ (5) ಶೈವಲಗಳು. ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳು ಇತರವುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಒಂದು ಗ್ರಾಮ್ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಸಾವಿರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅನೇಕ ಶತಕೋಟಿಗಳಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಣೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಅಂದಾಜುಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯ ಸಾಕಣೆಯಿಂದ, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅವುಗಳ ನಿಜವಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಿಸಿ ವೃದ್ಧಿಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಒಂದೇ ವಿಧವಾದ ಆಹಾರವು ಎಲ್ಲ ವಿಧದ ಏಕಾಣುಗಳಿಗೆ ಹಿಡಿಸುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಗೆಯ ಜೀವಿಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಬಗೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಆಹಾರವನ್ನೂ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳ ಜೈವಿಕಗಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಅಂದಾಜುಮಾಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಬರ್ರಿಸ್(1867) ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಸುಮಾರು ದಶ ಲಕ್ಷದ ದಶಲಕ್ಷದ ದಶಲಕ್ಷ(ಟ್ರಿಲಿಯನ್) ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳು ಒಂದು ಗ್ರಾಮ್ ತೂಗುತ್ತವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಆ ಏಕಾಣುಗಳ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಎಣಿಸಿ, ಸುಮಾರು 1 ಗ್ರಾಮ್ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ 2 ಶತಕೋಟಿ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಇರುತ್ತವೆಂದು

ಗೊತ್ತುರಾದದ್ದು. ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಗ್ರಾಮ್ ದುಗ್ಗಿನ ತೂಕದಲ್ಲಿ, ಏಕಾಣುಜೀವ ಕೋಶಗಳು 1.0.2 ಗ್ರಾಮ್‌ಗಳಷ್ಟು ತೂಕವಿರುತ್ತವೆಂದಾಯಿತು. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೆಕ್ಕೇರ್ ಅಳದ ದುಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ 4000 ಕಿ.ಜಿ.ಗಳಷ್ಟು ಜೀವಕೋಶಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಬಹುತೇಕ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಪರಿಮಿತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕೇವಲ ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕವಿಲ್ಲದೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಭಾಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ತಟಸ್ಥವಾಗಿರಬಹುದು. ಟ್ರೈಫಿನೈಲ್ ಟೆಟ್ರಾಜೋಟಿಯಮ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ವಿಧಾನದಿಂದ ಅವು ಅಮೃತಜನಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಇಂಗಾಲಾಮ್ಲವನ್ನು ಹೊರಬಿಡುವ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಸ್ಯಜಗತ್ತಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಒಂದೊಂದೇ ಗುಂಪಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಉಸಿರಾಟ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜುಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ. ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಉಸಿರಾಟ ಚಟುವಟಿಕೆಯು (ಇದನ್ನು ಟೆಟ್ರಿ ಅಪಕರ್ಷಣದಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು.) ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸದೃಶವಾಗಿದ್ದಿತು(ಇದನ್ನು ಪೆಪ್ಟೋಸ್ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸಿದೆ), ಆಮ್ಲ pHಯುಕ್ತ ಮರಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆಯು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸದೃಶವಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಸಿನೋಮೈಸೀಟುಗಳು ಇದ್ದರೂ ಅವುಗಳ ಉಸಿರಾಟ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಉಸಿರಾಟ ಸಾದೃಶ್ಯತೆಗೆ ಅಕ್ಸಿನೋಮೈಸೀಟುಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಅರಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೆಪ್ಟೋಸ್ ಸೇರಿಸದೆ ಇದ್ದ ಬಹುತೇಕ ಮಣ್ಣಿನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಮಾಡಿದಾಗ, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಯಾವುದೇ ಗುಂಪಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಅವುಗಳ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸಾದೃಶ್ಯತೆ ಕಂಡುಬರಲಿಲ್ಲ.

ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪರಿಮಿತಗೊಳಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಇಂಗಾಲ ತಳಪಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ಖನಿಜ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು. ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಏಕಾಣುಜೀವಿ ಸಸ್ಯವರ್ಗಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಆದಕಾರಣ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಶಕ್ತಿದಾಯಕ ತಳಪಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಭೇದ ಅಥವಾ ಗುಂಪಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಚೋದಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಹಠಾತ್ತಾಗಿ ಮೊದಲುಮಾಡುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಹುದುಗುಜೀವಿ(ಜೈವೋಸಸ್)

ಗಳೆಂದು ಹೆಸರು. ಈ ರೀತಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತೋರಿಸದಿರುವವುಗಳಿಗೆ ಇರುಜನಿತಜೀವಿ(ಆಬೊಕ್ಸೊನಸ್)ಗಳೆಂದು ಹೆಸರು. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಈ ಇರುಜನಿತಜೀವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುಕಡಮೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪೋಷಕದ್ರವ್ಯಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಗುಂಪಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಳೆಯಲಾಗದೆ ಹ್ಯಾಮಸ್ಸನ್ನು ಆಹಾರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಮಣ್ಣಿನ ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಾವಕಾಶಗತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತವೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಗುಂಪಿಗೆ ಆಥ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್, ನೊಕಾರ್ಡಿಯ ಪ್ರಥೇದಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಬೇಸಿಡಿಯೊ ಮೈಸಿಟ್ಸ್ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಸೇರುತ್ತವೆ. ಹುದುಗು ಜೀವ ಸಸ್ಯವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟಿರಿಯಾ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೊಮೈಸೆಸ್ ಪ್ರಥೇದಗಳು ಮತ್ತು ರಕರ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಗುಂಪುಗಳು ಸೇರುತ್ತವೆ. ಇವು ಸೆಲ್ಲುಲೋಸ್‌ಯುತ ಹಾಗೂ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಯುತ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ನಿರವಯವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಕೂಡಲೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.

ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕುವ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳ ಜಾತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಗುಣ ವಿಶೇಷಗಳು ಇಂತಿವೆ : ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೊಮೈಸೆಸ್, ಕ್ಲಾಂಟೊಮೈಸೆಸ್ ಮತ್ತು ಥರೊಬ್ಯಾಕ್ಟಿರಿಯಾ ಇವು ಗಿಡ್ಡ, ಗ್ರಾಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಬೀಜಕಣರಹಿತ, ವಾಯು ಪರ ಹಾಗೂ ದಂಡಾಕೃತಿಯವು. ಮೊದಲನೆಯದು ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೊಮೈಸೆಸ್ ನೀಲಿಹಸುರು ಮಿಶ್ರಕಿರಣ ಸ್ವರಣ ವರ್ಣಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಪ್ರಥೇದಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಎರಡನೆಯ ಕ್ಲಾಂಟೊಮೈಸೆಸ್ ಅನೇಕ ಸಸ್ಯರೋಗಕಾರಕ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳನ್ನೂಳಗೊಂಡಿದೆ. ಥರೊಬ್ಯಾಕ್ಟಿರಿಯಾ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಧಕವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳು ಸೇರುತ್ತವೆ. ರೈಜೋಬಿಯಂ ಇವು ವಾಯುಪರ, ಬೀಜಕಣರಹಿತ, ದಂಡಾಕೃತಿಯವು. ಇವು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳ ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟುಗಳನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ನೈಟ್ರೊಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ನೈಟ್ರೊಸೊಮೈಸೆಸ್ ಇವೆರಡೂ ಸಾರಜನಕ ಸ್ಪಿರಿಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ. ಆಗ್ರೊಬ್ಯಾಕ್ಟಿರಿಯಂ, ಕ್ರೋಮೊಬ್ಯಾಕ್ಟಿರಿಯಂ, ಆಕ್ಸೊಮೈಸೆಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಾವೊಬ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಇವೆಲ್ಲಾ ಬೀಜಕಣರಹಿತ, ವಾಯು ಪರ, ದಂಡಾಕೃತಿಯವು; ಕೆಲವು ಐಚ್ಛಿಕ ನಿರ್ವಾಯುಪರ ಜೀವಿಗಳು.

ಮೈಕ್ರೊಕಾಕಸ್ ಮತ್ತು ಸಾರ್ಸಿನ್-ಇವು ಗ್ರಾಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಗೋಳಾಕಾರ ಕೋಶಗಳು ಅಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ; ಆದರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗುರ್ತಿಸಬಲ್ಲ ಪೊಟ್ಟಣಗಳಂತೆ ಇರುತ್ತವೆ.

ಆರ್ಥೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ನಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯ ಗುಂಪು—ಇವು ಗ್ರಾಮ್‌ಪೇರಿಯಬಲ್ ದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಕಾಯ್ಡ್ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಕೋಶಗಳು ಕ್ರೋಮಾಟಿನ್(ಪಾಲಿಫಾಸ್ಫೇಟ್) ಹರಳುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

ಬ್ಯಾಸಿಲ್ಲಸ್ : ವಾಯುಪರ ಇಲ್ಲವೇ ಐಚ್ಛಿಕ, ನಿರ್ವಾಯುಪರ, ಬೀಜಕಣ ಉತ್ಪಾದಕ, ಗ್ರಾಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ದಂಡಾಕೃತಿಯವು.

ಕ್ಲಾಸ್ಟಿಡಿಯಂ, ನಿರ್ವಾಯುಪರ, ಬೀಜಕಣ ಉತ್ಪಾದಕ, ಗ್ರಾಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ದಂಡಾಕೃತಿ ಮತ್ತು ದೊಣ್ಣೆಯಾಕಾರದಕೋಶಗಳು.

ಮೈಕೊಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ, ನೊಕಾರ್ಡಿಯ ಮತ್ತು ಸ್ಟೆಪ್ಟೊಮೈಸಸ್ ಇವುಗಳು ಕೋಶಗಳು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕವಲುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಉದ್ದವಾಗಿರುವ ತಂತು(ದಾರ)ಗಳಂತಿರುವ ಕವಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ತಂತುಗಳು ಮಿಂಡ ಬೀಜಕಣಗಳು ಮತ್ತು ಕೊನಿಡಿಯಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿಮಾಡುತ್ತವೆ. ನೊಕಾರ್ಡಿಯ ಮತ್ತು ಸ್ಟೆಪ್ಟೊಮೈಸಸ್‌ಗಳು ತಂತುಯುಕ್ತ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳು. ಅವು ಕವಲಾದ ತಂತು ಜಾಲ ಮತ್ತು ಕೊನಿಡಿಯಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಅವು ಕೆಲಮಟ್ಟಿಗೆ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ರೂಪಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಆರ್ಟಿನೊಮೈಸೀಟುಗಳು ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳ ಸತ್ತಭಾಗ(ಅವಶೇಷ)ಗಳು, ಬೇರುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಬೇರುಗಳ ಮೇಲ್ಮೈ ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣುಪಾರ್ಶ್ವದುದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಶೇಖರವಾಗಿರುವ ವಲಯಗಳು ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾನಗಳಾಗಿವೆ.

ಕಡಮೆ ತೇವಾಂಶವಿರುವಾಗ, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಗ್ಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೂ ಅಮೋನೀಕರಣ ಮತ್ತು ಇಂಗಾಲದ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಂಥ ಕೆಲವು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು, ನೆಲವು ಒಣಗಿ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶವು ಕಡಮೆಯಾಗಿ ಅವು ಬಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ನೆಲ (ಮಣ್ಣು)ವು ಒಣಗಿದಂತೆಲ್ಲ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಬರುತ್ತದೆ; ಆದರೆ ನೆಲ(ಮಣ್ಣು)ವನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ಹಸಿಮಾಡಿದಾಗ ಅಮೋನೀಕರಣ, ಸಾರಜನಕ ಸ್ಫುರಿಕರಣ, ಗಂಧಕ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ಇತ್ಯಾದಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ

ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೂ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಣ್ಣು ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಮುಂದೆ ಅವನ್ನು ಬದ್ಧಮಾಡಿದರೆ ಅವು ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ; ತೇವಾಂಶವು ಕಡಮೆಯಿದ್ದಾಗ ಅನೇಕ ಮಣ್ಣು ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳು ಬೀಜಕಣಗಳು, ಪೂತಿಕೋಶಗಳು ಪತ್ತಿತರ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ. ಅಜಟೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪೂತಿಕೋಶಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟಿರಿಯಾ ಬೀಜಕಣಗಳು ಒಣಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ವರೆಗೆ ಉಳಿಯಬಲ್ಲವು; ಆದರೆ, ಇಂಥ ತೀವ್ರ ಬರ(ಒಣಮಣ್ಣಿನ) ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಆಶ್ರಯದಾತ ದ್ವಿವಳಧಾನ್ಯಬೆಳೆಯು ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ರೈಷೋಬಿಯಾಗಳು ಜೀವಿಸಲಾರವು. ಕೆಲವು ದೇಹಪೋಷಕ ಕೋಶಗಳು ಬರಗಾಲವಂಥ ಬೇಸಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಸೆಲವು ಒಣಗಿಹೋಗಿದ್ದರೂ ಗುಂಪುಗುಂಪಾಗಿ, ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಲವು ಕಣಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ತಿಳಿ ವ್ಯವಾಂಶದ ಪೊರೆಗಳಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಉಳಿಯಬಲ್ಲವು.

ವಾಯುಪರ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳಿಗೆ ತೇವಯುಕ್ತ ಮಣ್ಣು ಅನನುಕೂಲಕರ; ಏಕೆಂದರೆ, ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಾಡುವಿಕೆಯು ಕಡಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜಮೀನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಸಿದುಹೋದ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಆಮ್ಲಜನಕ ಕೊರತೆಯು ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿಯೂ ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ಆಮ್ಲಜನಕ ಹಾದುಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಕ್ಷಾರಿ ಸಸ್ಯಬೇರುಗಳಿಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮಣ್ಣಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ವಿಸರಣೆ ಕಡಮೆಯಾಗುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಆಮ್ಲಜನಕಕ್ಷಾರಿ ಸಸ್ಯಬೇರು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದಲೂ ಕೊರತೆಯುಂಟಾಗಬಹುದು. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ರಂಧ್ರಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿಯೂ ಆಮ್ಲಜನಕ ಕೊರತೆಯುಂಟಾಗಬಹುದು. ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರಗಳು ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಅವು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ರಂಧ್ರಗಳ ನಡುವೆ ವಾಯುವಿಸರಣೆಗೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ.

ಗಾಳಿಯು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಚಾರವಾಗಬಲ್ಲ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ, ಮಣ್ಣಿನ ಪಾರ್ಶ್ವದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಾಯುಪರ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳು ಹರಡಿರುತ್ತವೆ. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಿರ್ವಾಯುಪರ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ(ಮೈಕ್ರೊಸ್ಕೋಪಿಕ್)ಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ನೈಟ್ರೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಸ್ಯಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅವು ಬಸಿದುಹೋಗದಿದ್ದರೆ ಅವು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಶೇಖರವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುತ್ತದೆ.

ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಐಚ್ಛಿಕ ನಿರ್ವಾಯುಪರ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ತದ್ಭ್ರಮ ಜೀವಾವಧಿ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನಿರ್ವಾಯುಪರ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಅತೀದ ತೇವಾಂಶವುಳ್ಳ ದುಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ದುಡುಗುವಿಕೆ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳು. ಸಬ್‌ಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಗಾಲ ದೈ ಅಕ್ಸೈಡ್ ಅಪಕರ್ಷಕ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ಟಿಡಿಯಗಳು ಪ್ರಧಾನವಾಗಬಹುದು. ದುಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಆಹಾರಗಳು, ಆಲೋಹಾಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೈನ್‌ಗಳು. ಜಲಜನಕ ಮತ್ತು ಮಿಥೇನ್ ಅನಿಲಗಳು ಹಾಗೂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್‌ಗಳಂಥ ಅಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಪಡುವ ಸಾವಯವ ಸಂಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳು ಶೇಖರವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳು ದುಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ 4-10 ಹರದಿನವರೆಗೂ pHತವೆಯಬಲ್ಲ ಹಾವರೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳೂ ಆದ್ದು ವೈದೇಶ್ಯ ಇಲ್ಲದ. ಕಡಮೆಯೂ ಇಲ್ಲದ ತಟಸ್ಥ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಏಕಾಣುಜೀವಿ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಮಂದರೆ, ಬೈಜೆರೀಕಿಯವಂಥ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳು pHನ್ನು 3ರವರೆಗೂ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವು. ಥಯೊಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಥಯೊಆಕ್ಸಿಡಾನ್ಸ್ ಎಂಬ ಏಕಾಣು ಜೀವಿಗಳು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಮೆ ಮಟ್ಟದ pHತಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವು. ದುಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳಷ್ಟು ಅಮ್ಲಮಣ್ಣು ಸಹಿಷ್ಣುಗಳಲ್ಲ.

ಬಹುತೇಕ ದುಣ್ಣು ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳಿಗೆ ದುಣ್ಣಿನ ಉಷ್ಣಾಂಶವು 25° ರಿಂದ 35° C ಇದ್ದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೇಲ್ವಿದರವನ್ನುಳಿದಂತೆ ಕೆಳ ಪದರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣಾಂಶವು ಕಂಡುಬರುವುದು ಅಪರೂಪ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದುಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳ ಬೇರುಗಳ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಉಷ್ಣಾಂಶವು ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಹಿತಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಉಷ್ಣಾಂಶವು ಅಧಿಕವಿದ್ದಾಗ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳು ಒಣಗುತ್ತವೆ. ಆದಕಾರೂ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಪರಿಣಾಮವು ಪರೋಕ್ಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣಾಂಶವು ಇಳಿಯುವುದರಿಂದ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳ ಜಟಿಲವಟಿಕೆಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪರಿಮಿತವಾಗುತ್ತವೆ.

ಕಡೆಯದಾಗಿ, ದುಣ್ಣಿನಲ್ಲಿಯೇ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಅಂತಃ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಇತರ ಗುಂಪಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಅಂತಃಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೈಟ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ನೈಟ್ರೊ

ಸೊಪೊನಾಸ್‌ಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ನೈಟ್ರೋಸೊಪೊನಾಸ್ ಎಂಬುವು ತಮಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಶಕ್ತಿದಾಯಕ ತಳವಿಗಾಗಿ ಅಮೋನಿಯಾಕಾರಕಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಅವರಣಸ್ಥಾನ ಯಶಸ್ವಿನ ಮಾದರಿ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧದ ಯಶಸ್ವಿನ ಇನ್ನೂ ಸಂಕೀರ್ಣ ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದರೆ ಸಾಸಿಯದ ಪದಾರ್ಥದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ. ಒಂದು ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಅಹಾರವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಅನೇಕ ಜೀವಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುವಾಗ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಹೊಂದಿ ಉಳಿದವು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಪ್ರತಿ ಜೈವಿಕಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿಮಾಡಿ, ಇತರವುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಆಯಾ ಗುಂಪುಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಅಹಾರವಿಶೇಷಗಳು ಒಂದೇ ವಿಧವಾಗಿ ಅವರಣಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದ್ದರೆ ಆಗ ಅನೇಕ ಗುಂಪುಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಜೊತೆಜೊತೆಯಾಗಿ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಅಹಾರದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಅಹಾರವನ್ನು ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇರಬಲ್ಲವು. ಅಂಥ ಒಂದು ಅವರಣಸ್ಥಾನದ ಮಾದರಿಯ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದರೆ ಬೇರಿನ ಮೇಲ್ಮೈ. ಬೇರಿನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಏಕಾಣುಜೀವಿ ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಅನೇಕ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ ತ್ತವೆ. ಬೇರುಸೃದನಿ ಮತ್ತು ಬೇರು ಪೊರೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಗಬಗೆಯ ಸಕ್ಕರೆಗಳು, ಅಪ್ಯೂನೋ ಆಮ್ಲಗಳು, ವಿಟಮಿನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಕಾರಕಗಳು ಇರುತ್ತವೆ; ಅದುನರಿಂದ, ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಅಹಾರಾಂಶಗಳು ಬೇಕಿರುವುದರಿಂದ ಒಂದೇ ಅಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹಿಂದೆಯೇ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳೆಂದರೆ ಆರ್ಥೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ - ಕೊರಿನಿಬ್ಯಾಕ್ಟಿರಿಯಂ-ಮೈಕೊಬ್ಯಾಕ್ಟಿರಿಯಂ ಗುಂಪಿನವು. ಫಲಕ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳಾಗಿವೆ. ಮೊದಲ ಎರಡು ಜಾತಿಗಳು ಪ್ಲಿಯೊಮಾರ್ಫಿಕ್ ಗ್ರಾಹ್-ದೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಕಾರಕ್ಕೆ ಕೋಶಯುಕ್ತ, ಚಿಕ್ಕ ಮತ್ತು ದಕ್ರ ದಂಡಾಕೃತಿ; ಉದ್ದ ದಂಡ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಕಮಲಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ದಂಡಗಳಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಎರಡನೆಯ ಬದು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪುಗಳೆಂದರೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಬ್ಯಾಸಿಲ್ಲಸ್ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಮತ್ತು ಆಕ್ಟಿನೊ ಮೈಸೀಟಿಗಳು. ಟಂಫ್ರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಒಡಿದು ಮರಳಾಗಾದಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳ ದರದಿ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಂದ ಏಕಾಣುಜೀವಿ ಬೀಜಕಣಗಳು ಒಟ್ಟು ಏಕಾಣುಜೀವಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಶೇಕಡಾ 1-38ರಷ್ಟು ಭಾಗವಿರುತ್ತವೆಂದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸ್ಯೂಪೊ ಸೊನಾಸ್, ರೈಜೋಬಿಯಂ, ನೈಟ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್, ನೈಟ್ರೋಸೊಪೊನಾಸ್, ಅಮಟೊ

ಬ್ಯಾಕ್ಟೆರ್ ಪ್ರಭೇದಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳು ಕಡಮೆ ಸಂಖ್ಯೆ (ಒಟ್ಟು ಏಕಾಣು ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 10ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಮೆ)ಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಅವರೆ, ಇವುಗಳನ್ನೇ ಬಹಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಸ್ಯಪೋಷಕಾಂಶ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವ್ಯವೇಂದ್ಯ ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವುದೇ ಕಾರಣ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅಜಟೊಬ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ಗಳು ಕಡಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಂದ ಅವು ಉಷ್ಣವಲಯದ ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಬೆಳೆಗಳ ಬೇರುಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವುದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲುಗಳು, ಕಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಹಾರಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದಲೂ ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆತಿದೆ. ಸ್ಯೂಡೊಮೊನಾಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಸಾಂಟೊಮೊನಾಸ್‌ಗಳು ಇತರವುಗಳಿಗಿಂತ ಬೇರು ವಲಯದ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕರಾಂಗಯುತ ಮಿಕ್ರಿಯಾಸ್ ಪರೋಪಜೀವಿಗಳು ಕ್ಸಾಂಟೊಮೊನಾಸ್, ಸ್ಯೂಡೊ ಮೊನಾಸ್, ಅಜಟೊಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕೋಲಿಫಾರಂ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇದ್ದುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪರೋಪಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಡೆಲ್ಲೊ ಮಿಕ್ರಿಯೊ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವು ಬದ್ಧ ಪರೋಪಜೀವಿಗಳಾಗಿರುವಂತೆ ತೋರಿಬಂದು ಇವುಗಳನ್ನು ಅಶ್ರಯದಾತ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳ ಕರಗು ಮಡ್ಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಆಕ್ಸಿನೋಮೈಸೀಟುಗಳು

ಆಕ್ಸಿನೋಮೈಸೀಟುಗಳು ಗ್ರಾಮ್ ಇಸಿಟಿವ್ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳು. ಅವು ಕವಲು ತಂಪುಜಾಲಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇವು ಖಂಡಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆಗೊಂಡು ಇಲ್ಲವೆ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆಗೊಂಡು ಕೊನಿಡಿಯಗಳೆಂಬ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬೀಜಕಣಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಇವರಿಂದಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಆಕ್ಸಿನೋಮೈಸೀಟುಗಳನ್ನು ಶಿಲಿಂಧ್ರಗಳೆಂದೇ ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಅವುಗಳ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೇಟಿಕ್ ಕೋಶಸಂಯೋಜನೆ, ಕೋಶಭಿತ್ತಿ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ, ಪ್ರತಿಜೈವಿಕಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ಷಣೆ, ಬಿಡಿತಂತುಗಳ (ಸುಮಾರು ಒಂದು ಮೈಕ್ರಾನ್) ತೆಳುಗಾತ್ರಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳೆಂದು ಸ್ಥಿರಪಡಿಸಿದೆ.

ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಆಕ್ಸಿನೋಮೈಸೀಟುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲಿನವು ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೊಮೈಸಸ್ ಮತ್ತು ನೊಕಾರ್ಡಿಯ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲೋ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯೆಯವು ಮಾತ್ರ ಮೈಕ್ರೊಮಾನೋಸರ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಜೀವ್ಯಣುವರ್ಧಕ ಸಾಧನದ

ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ನೋಡಾಡಿಯಗಳು ಒಂದು ಸಮುದಾಯವಾಗಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡಿತ್ತಿದ್ದು, ಮುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಪುಡಿಪುಡಿಯಾಗಬಿಡುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ತಂತುಜಾಲ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಘಟಕಗಳಾಗಿ ಎಂದರೆ ದಂಡಾಕೃತಿ ಕೋಶಖಂಡಗಳಾಗಿ ಒಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೊಮೈಸಸ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಚರ್ಮದಂತಿರುವ ಸಮುದಾಯವಾಗಿ ಸೇರಿ, ಜೀವ್ಯಣುವರ್ಧಕ ಸಾಧನದ ಮೇಲ್ಮೈಯ ಮೇಲೆ ಗುಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತವೆ. ತಂತುಜಾಲಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದ್ದು ಪುನರ್ವಿಭಜನೆಗೊಂಡು ಕೊನೆಯ ಸಂಪಳಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮೈಕ್ರೊಮಾನೋಸ್ಕೋಪದಲ್ಲಿ ತಂತುಜಾಲವು ತಳಪಡೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದು ಕೊನೆಯಿರುವ ಚಿಕ್ಕಚಿಕ್ಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮತಂತುಗಳಿಗೆ ಲಘುವಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.

ಅಕ್ಟಿನೊಮೈಸೀಟುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಬಹಳ ನಿಧಾನ. ಅವುಗಳನ್ನು ಜೀವ್ಯಣುವರ್ಧಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದಾಗ ವಾಹತುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಏಕಾಣುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಪಕ್ವವಾಗಿ ಅವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ನಿಧಾನವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದಾಗಿ, ಹಿಂದಿನ ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯುಂಟುಮಾಡದವೆಂದು ಉಪೇಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು. ವಾಕ್ಸ್‌ಮನ್ 1940ರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟಿನೊಮೈಸೀಟುಗಳು ಔಷಧಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರತಿಜೈವಿಕಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿಮಾಡಬಲ್ಲವೆಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಮೇಲೆ, ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಅವುಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣುಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲುವಾದರು.

ಸಂಖ್ಯಾಬಲದಲ್ಲಿ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳ ಅನಂತರ ಅಕ್ಟಿನೊಮೈಸೀಟುಗಳೇ ಮುಂದಿನವಾಗಿವೆ. ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಾಕಣೆಮಾಡಿ ಎಣಿಸಿದರೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ್ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ 10⁵ ರಿಂದ 10⁶ ಸಹಸ್ರ ಅಕ್ಟಿನೊಮೈಸೀಟುಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನವೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಪ್ರಾಯಶಃ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಸಂಖ್ಯೆಯು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಮೂಲಗಳಾಗಿ ತಂತುಖಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಕೊನೆಯಿರುವವಾಗಿರುವುದೇ ಆಗಿದೆ. ಮಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಕಲುಕುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ತಂತುಗಳು ಸಣ್ಣ ತುಕಡಿಗಳಾಗಿ ಒಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಾಕಣೆಮಾಡಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಜೀವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೊಚ್ಚಿರಬಹುದು. ಅಧಿಕ pH ಉಳ್ಳ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಒಟ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟಿನೊಮೈಸೀಟುಗಳು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಒಣ ಕ್ಷಾರಯುತ ಗೋಡುಮಣ್ಣಿದ್ದು ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥಗಳೂ ಸಮೃ

ದ್ದವಾಗಿದ್ದು ಮಲ್ಲುಗಾಡಲು ಮಣ್ಣಿನಂತೆ ವಿನಿಮಯ ಕ್ಷಾರಾಂಶಗಳು ಪುಷ್ಕಳವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಮಣ್ಣು ಆಕ್ಸಿನೊಮೈಸೀಟುಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೈಸಗಿಕ ವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಒಟ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿನೊಮೈಸೀಟುಗಳ ಪ್ರಮಾಣವು ಶೇಕಡಾ 10-74 ಭಾಗವಿರುತ್ತದೆ. ಪೀಟ್ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ವೀರನಿಂತ ಮತ್ತು ತೇವಭರಿತ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ 5ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಮೆ pH ಇರುವ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಒಟ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮಸಸ್ಯಗಳ ಶೇಕಡಾ 10 ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಕಡಮೆಯಿರುತ್ತವೆ.

ಇಳಿಮುಖ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣಾಂಶಗಳಿಂದ ಆಕ್ಸಿನೊಮೈಸೀಟುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಪ್ರಚೋದಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು ಒಣ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಭಾಗವನ್ನಾಕ್ರಮಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ಮರಳುಗಾಡಿನ ವಾತಾವರಣ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತವೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಉತ್ತರಧ್ರುವದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಕಡೆ ಉಷ್ಣಾಂಶವು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಅಧಿಕ ವಾಗುತ್ತ ಬರುತ್ತದೆ. ಟಂತ್ರ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಶೇಕಡಾ 1-2 ಭಾಗವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ; ಚೆರ್ನೊಜೆಮ್, ಜೆಸ್ಪ್ಸೊನಿಟ್ ಮತ್ತು ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 30-40 ಭಾಗವಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಗುವಳಿ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಹೊಸ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿನೊಮೈಸೀಟುಗಳು ಸಾಗುವಳಿಯಾದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿಗಿಂತ ತೀರ ಕಡಮೆಯಿರುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಉತ್ತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿಯಾಡುವುದೇ ಇವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿರಬಹುದು. ಹೊಸದಾಗಿ ಉತ್ತ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿಯಾಡುವುದರಿಂದಾಗಿ ಹೊರಹುವ ಮಣ್ಣಿನ ವಾಸನೆಯು ಆಕ್ಸಿನೊಮೈಸೀಟುಗಳ ಬೀಜ, ಜಟುಪಟಿಕೆಯ ಸೂಚನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಿನ ವಾಸನೆಗೆ ಕಾರಣ ಅಸಿಟೇಟುಗಳು, ಆಲ್ಡಿಹೈಡುಗಳು ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಗಳಂಥ ಸುಗಂಧಉತ್ಪಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ; ಅಲ್ಲದೆ. ಆಕ್ಸಿನೊ ಮೈಸೀಟುಗಳ ಬೀಜಕಣ ಉತ್ಪಾದಕ ರೂಪಗಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ B- ವಲಯ(ಆಳಪದರ) ಕ್ಕಿಂತ A-ವಲಯ(ಮೇಲ್ಪದರ)ದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇದೂ ಸಹ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಪದರದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿಯಾಡುವುದರಿಂದಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ.

ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿನೊಮೈಸೀಟುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೊಮೈಸಸ್ ಶೇಕಡಾ 70ರಷ್ಟು ಭಾಗವಿರುತ್ತವೆ. ನೊಕಾರ್ಡಿಯ ಶೇಕಡಾ 10-30ರಷ್ಟು ಇರುತ್ತವೆ. ಮೈಕ್ರೊಮಾನೊಸ್ಕೋರ ಒಟ್ಟು ಆಕ್ಸಿನೊಮೈಸೀಟುಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 10ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಮೆ ಇರುತ್ತವೆ; ಅದೂ ಬಹುವಾಗಿ ಮಿಸೊಥಿಲಿಕ್ ಪ್ರಭೇದವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಥರ್ಮೋಫಿಲಿಕ್ ಮೈಕ್ರೊಮಾನೊಸ್ಕೋರಗಳು ಮೂಲತಃ

ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ವಿಭಜನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಗೊಬ್ಬರ ರಾಶಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಸಾಧಾರಣ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಅಕ್ಕಿನೊಮ್ಮೆಸೀಟುಗಳು ಸಾವಯವ ಮಾಧ್ಯಮ ಜೀವಿಗಳು. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಬಹುಪಾಲು ಅಕ್ಕಿನೊಮ್ಮೆಸೀಟುಗಳು ವಾಯುಪರ ಜೀವಿಗಳು. ಇವಕ್ಕೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಬಲ್ಲ ಶರ್ಕರಪಿಷ್ಟಗಳ ಸ್ಥಾನ ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯವಾದರೂ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಮೂಲ ಹೆಮಿಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್‌ಗಳು, ಕೆರಾಟಿನ್ ವಸ್ತುವಿಶೇಷವುಳ್ಳ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಗೊರಸುಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಂಬುಗಳಂಥ ಪ್ರಾಣಿ ಉಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೀಟಗಳ ಚಿಪ್ಪುಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಕೈಟಿನ್ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿರುವ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಶರ್ಕರಪಿಷ್ಟಗಳ ಮೇಲೂ ಜೀವಿಸುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೊಮೈಸಸ್ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಫ್ರೆಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಅಮ್ಮಿನೊ ಆಮ್ಲಗಳನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾರಜನಕಮೂಲವಾಗಿರುವ ಪದಾರ್ಥವೆಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಂಗಾಲಮೂಲವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಾರಜನಕ ಮೂಲವಾಗಿ ಅಮೋನಿಯಾ ಲವಣಗಳು ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯ. ಕೆಲವು ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೊಮೈಸಸ್ ಗಳು, ನೈಟ್ರೇಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬಮೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಾರಜನಕಮೂಲವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತವೆ.

ಅಕ್ಕಿನೊಮ್ಮೆಸೀಟುಗಳ ಬೆಳೆದಣಿಗೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫೋಸ್ಫೋರಿಯಂ, ಹ್ಯಾನ್ಫೋರಿಯಂ, ಸಕು(ಜಿಂಕ್), ಕಬ್ಬಿಣ, ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಲವಣಾಂಶಗಳೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವುದು ಅದರಲ್ಲಿ. ಆದರೆ, ಈ ವಿನ್ಯಾಸಶಿಲೆಗಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸುಣ್ಣದ ಅಂಶವನ್ನು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಅಕ್ಕಿನೊಮ್ಮೆಸೀಟುಗಳ ಬೆಳೆದಣಿಗೆಯು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ pH ಮಟ್ಟವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಜೆನ್ನಾಗಳಾಯಾಸವಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿನೊಮ್ಮೆಸೀಟುಗಳ ಆಹಾರ ಪೋಷಕಾಂಶ ಇತರ ಸಾವಯವ ಮಾಧ್ಯಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಗಿಂತ ತೀರ ಸರಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವು ಬಾಣ್ಣು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಳಸುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಕಣೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲೂ ಜೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಕುಸ್ಟರ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಾಪೆಕ್-ಪಾಕ್ಸ್, ಸಾಕಣೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಂಥ ಕೆಲವು ಆಯ್ದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಅಕ್ಕಿನೊಮ್ಮೆಸೀಟುಗಳ ಬೆಳೆದಣಿಗೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಅಕ್ಕಿನೊಮ್ಮೆಸೀಟುಗಳು ಹ್ಯೂಮಸ್‌ಗಳ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಕಿನೊಮ್ಮೆಸೀಟುಗಳು ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ

ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಭೂಮಿಯ ಕೆಂದುಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಅವು ಹ್ಯೂಮಸ್ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಗಳಾಗಿರುವುದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವೈಪ್ಪೋಮೈಸಸ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಜೀರ್ಣ ತೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ದಟ್ಟ ಕಂದುಬಣ್ಣದ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಈ ವಸ್ತುಗಳು, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಹ್ಯೂಮಸ್ ಅಂಶವಾದ ಹ್ಯೂಮಿಕ್ ಆಮ್ಲದಂತೆಯೇ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಸ್ವೈಪ್ಪೋಮೈಸಸ್‌ಗಳು ಹ್ಯೂಮಸ್ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಗಳೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಂಬಲ ದೊರಕುತ್ತದೆ. ನೊಕಾರ್ಡಿಯಾಗಳು ಸಾವಯವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಭಿನ್ನವೃತ್ತಿಯ(ಹೆಟೆರೋಸೈಕ್ಲಿಕ್) ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಸಾವಕಾಶ ಹ್ಯೂಮಿಕ್ ಆಮ್ಲ ವಿಭಜನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುತ್ತವೆ. ಆಕ್ಸಿನೊಮೈಸೀಟುಗಳು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹೊಸ ಸಾವಯವ ಉಳಿಕೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳಂತೆ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವು ಈ ಹೊಸ ಉಳಿಕೆವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಂತರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತವೆ: ಇದರಿಂದ, ಅವು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಮತ್ತು ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ; ಅವು ಸಾವಯವ ವಸ್ತುಗಳ ವಿಭಜನೆಯ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಸಾಹತುಗಳಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, ಸಾವಯವ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೊಳೆಯದೆ ಇರುವ ವಸ್ತುಗಳ ವಿಭಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರವಹಿಸುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕ್ಸಿನೊಮೈಸೀಟುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೊಕಾರ್ಡಿಯವನ್ನು ತಟಸ್ಥವಾದ ಕ್ಷಾರಯುಕ್ತ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುಜನಿತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಸ್ಯವರ್ಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಕಡಮೆ ಫಲವತ್ತಾದ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿನೊಮೈಸೀಟುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ; ಏಕೆಂದರೆ, ಅಂಥ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅರೆ ಶುಷ್ಕ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ತೇವಾಂಶವು ಕಡಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಆಕ್ಸಿನೊಮೈಸೀಟುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ: ಏಕೆಂದರೆ, ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳಿಗೂ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ತೇವಾಂಶವು ಬೇಕಿರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಆಕ್ಸಿನೊಮೈಸೀಟುಗಳು pH ಕೊರತೆಯ ಸಹಿಷ್ಣುಗಳಲ್ಲ. ಅವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೋಡ್‌ಜೋಲ್ ಮಣ್ಣುಗಳಂಥ ಆಮ್ಲ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ; ಆದರೆ, ಲವಣ ಸಮೃದ್ಧ ಸೊಲೊನಿಟ್ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಪುಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆಮ್ಲ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಸುತಾನವೃದ್ಧಿಯಾಗಲು ಅಸಮರ್ಥವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ವೈಪ್ಪೋಮೈಸಸ್ ಕೊಳಕಳೆಗಳೆಂದಾಗುವ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಕೊಳೆರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರ. ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ನಾಟಮಾಡಲಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ಅಮ್ಲೀಕರಿಸುವುದರಿಂದ ಕೊಳೆರೋಗ

ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಮಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಅಮೋನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟನ್ನು ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಹಾಕುವುದರಿಂದ pH ಕಡಮೆಯಾಗಿ ಅಕ್ಟಿನೊಮೈಸೀಟುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಗ್ಗುತ್ತದೆ.

ಗೊಬ್ಬರದ ಗುಂಡಿಗಳು, ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಗುಡ್ಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕಿರುವ ಹಸುರುಗೊಬ್ಬರಗಳ ವಿಭಜನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಪಸಹಿಷ್ಣು ಅಕ್ಟಿನೊಮೈಸೀಟುಗಳ ಕ್ರಿಯೆಯು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೊಮೈಸಸ್‌ಗಳ ಅನೇಕ ಪ್ರಭೇದಗಳು ವೈದ್ಯಕೀಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರತಿಜೈವಿಕಗಳನ್ನು, ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಮಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬೆದ್ಯವಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುದುಗುವಿಕೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಬಲ್ಲವು. ಅವು ಮಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಈ ಪ್ರತಿ ಜೈವಿಕಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆಯೇ ಹೇಗೆಂಬುದು ಸಂದೇಹಾಸ್ಪದ. ಹೀಗೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪ್ರತಿಜೈವಿಕಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದರ ಅಸಮರ್ಥತೆಗೆ ಕಾರಣ ಪ್ರೋಷಕದ್ರವ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ, ಇತರ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಜೈವಿಕಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿಮಾಡಿದರೂ, ಮಣ್ಣಿನ ಕಲಿಲಗಳ ಸುತ್ತ ಅನಿಲಗಳ ಮಂದಗಚ್ಛಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ಹೀಗೆ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಪ್ರತಿಜೈವಿಕಗಳ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇತರ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಂದ ಅವು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದೇ ಕಾರಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು

'ಮಣ್ಣು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು' ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ನಿಖರವಾದ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ. ಈ ಪದವನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಣ್ಣು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಕುರಿತ ಬಹುತೇಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳೆಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದುದಾಗಿವೆ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಜೀವಪರಿಸ್ಥಿತಿಸಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಜೀವರಸಾಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಕುರಿತ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸ್ಥೂಲವಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿಲ್ಲ.

ಏಕಕೋಶಕ ಯೀಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊರತು ಮಿಕ್ಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳೆಲ್ಲ ತಂತುಮಯವಾದವು. ಇವುಗಳಿಗೆ, ತಂತುದಾರಗಳೆಂದು ಹೆಸರು. ಇವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕವಲುಗಳಾಗಿವೆ ಒಟ್ಟಿಗೇನೇರಿ, ದೇಹಪೋಷಕ ತಂತುಜಾಲವಾಗುತ್ತವೆ. ತಂತುಜಾಲಗಳು ಜೀರ್ಣಕಾರಕ(ಪೋಷಕಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ) ರಚನೆಗಳಾಗಿವೆ. ಇವು ಜೀವಕಣ

ಗಳಿಂದ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ: ಬೀಜಕಣಗಳನ್ನು ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಲಿಂಗ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಮಾಡಬಹುದು. ಸೈಸಿಗಿಕವಾಗಿ ಲೈಂಗಿಕ ಬೀಜಕಣ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವುದು ಅಪರೂಪ. ನಿರ್ಲಿಂಗ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಬೀಜಕಣಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಸಕ್ರಿಯ ತಂತುದಾರ ತುಣುಕುಗಳೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಜೀವ ಶಿಲೀಂಧ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು.

ತಂತುದಾರಗಳು ಒವೆಯುವುದರಿಂದ ಬೀಜಕಣದಂಥ ಅಥ್ರೋಬೀಜಕಣ (ಅಥ್ರೋಸ್ಪೋರ್) ಶೇರಿರಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅತಿಮುಖ್ಯ ನಿರ್ಲಿಂಗ ರೀತಿಯ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯು ಬೀಜಾಣುದಾನಿ ಬೀಜಕಣಗಳು ಮತ್ತು ಕೊನಿಡಿಯ ಗಳಿಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಬೀಜಾಣುದಾನಿಯು ಬೀಜಕಣಗಳು ಬೀಜಾಣುದಾನಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಚೀಲದಂತಹ ವಸ್ತುವಿನೊಳಗೆ ಆಡಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಚೀಲದಂತಹ ಬೀಜಾಣುದಾನಿಯನ್ನು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಬೀಜಾಣುದಾನಿ ಓಡಿಕೆಗಳೆಂಬ ತಂತುದಾರಗಳಾಧರಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಕೊನಿಡಿಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗ್ಧವಾಗಿ ಕೊನಿಡಿಯೊ ಓಡಿಕೆಗಳೆಂಬ ತಂತುದಾರಗಳು ಧರಿಸಿರುತ್ತವೆ. ನಿರ್ಲಿಂಗ ಬೀಜಕಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಪಾಯುಗಳಾಗಿದ್ದು ಬದುಕಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯಬಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ನಿರೋಧಕ ರಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ರಚನೆಗಳೆಂದರೆ ಕ್ಲಮಿಡೋ ಬೀಜಕಣಗಳು, ಸ್ಪೈರೋಟಿಯ ಮತ್ತು ರೈಜೊಮಾರ್ಫಗಳು. ಕ್ಲಮಿಡೋ ಬೀಜಕಣಗಳು ದಪ್ಪಭಿತ್ತಿಯುಳ್ಳ ಉಬ್ಬಿದ ಕೋಶಗಳಾಗಿದ್ದು ತಂತುದಾರಗಳದ್ದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲವೇ ತಂತುದಾರಗಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುತ್ತವೆ. ಸ್ಪೈರೋಟಿಯದಲ್ಲಿ ತಂತುದಾರಗಳು ಪರಸ್ಪರ ನಿಕಟವಾಗಿ ಹೆಣೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ರೈಜೊಮಾರ್ಫಗಳು ದಪ್ಪ ಹುರಿಯಂಥ ಶರೀರಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅನೇಕ ತಂತುದಾರಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ರೂಪಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ತಂತುಗಳು ವಿಭಾಗಿತವಾಗಿದ್ದು, ಲೈಂಗಿಕ ಬೀಜಕಣಗಳು(ಅಸ್ಪೋ ಬೀಜಕಣಗಳು) ಅಸ್ಕಸ್ ಎಂಬ ಚೀಲದಂಥ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಅಸ್ಕೊಮೈಸೀಟುಗಳು ಎಂಬ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಂತುಗಳು ವಿಭಾಗಿತವಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಲೈಂಗಿಕ ಬೀಜಕಣಗಳು ಮಾದರಿಯ ಉ ಬೀಜಕಣ (ಉಸ್ಪೋರ್) ಇಲ್ಲವೇ ಎರಡು ಭಿನ್ನ ಕಣಬೀಜ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಯುಗ್ಮ ಬೀಜಕಣಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಫಿಕ್ಸೊಮೈಸೀಟುಗಳೆಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಭಾಗಿತ ತಂತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಲೈಂಗಿಕ ಬೀಜಕಣಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸದಿರುವ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್(ಡ್ಯುಟರೊಮೈಸೀಟು) ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಯಾವ ತರಹದ ಬೀಜಕಣಗಳನ್ನೂ ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇವಕ್ಕೆ ಮೈಸೀಲಿಯ ಸ್ಟೆರಿಲಿಯ (ಬಂಜೆನಾಳಗಳು) ಎಂದು ಹೆಸರು.

ಬಸಿದಿಯೊ ಮೈಸೀಟುಗಳೆಂಬ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪಿನ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಸಿದಿಯೊ ಬೀಜಕಣಗಳನ್ನು ಬೆಸಿದಿಯ ಎಂಬ ದಂಡಾಕಾರದ ರಚನೆಗಳು ಧರಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಇತರ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾದವುಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ರೊಮೈಸೀಟು (ಚಾರು ಬೂಷ್ಟು)ಗಳು ಎಂದು ಹೆಸರು. ಇವು ತಮ್ಮ ಜೀವನಚಕ್ರದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಕಾಲ ಅವಿಭಜಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತವೆ. ಇವು ಬೀಜಕಣಗಳ ಮೇಲೆ ಜೀವಿಸುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಾಕಣೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಬೆಳೆಸಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಪಡಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳಿಗಿಂತ, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಿಸುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ : ಆಗತಾನೆ ತೆಗೆದ ಮಣ್ಣು ಭಾಗಗಳು, ಆಗತಾನೆ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ಮಣ್ಣಿನ ಹಂಚೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಮಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಹುಗಿದಿರುವ ಜಾರುಗಾಜಿನ ತುಂಡುಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಅವು ಇದ್ದಂತೆಯೇ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಹಾದಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣು ದಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾದಂತೆ, ಅವುಗಳ ರಚನೆಯಲ್ಲಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನೂ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ: ಆದರೆ, ಈ ವಿಧಾನಗಳು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಬಗೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇನೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಗಳಲ್ಲಿ 'ಮಣ್ಣು ಮಾರ್ಪಾಟಿಕರಣ ಫಲಕ ವಿಧಾನ'ದಿಂದ ಎಂದರೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಗಾಜಿನ ತುಂಡುಗಳ ಮೇಲಿರಿಸಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕ ಯಂತ್ರಗಳಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಬೀಜಕಣಗಳಾಗಿ, ಗುರುತಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅವು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಯಾವರೀತಿ ಇರುತ್ತವೆ-ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ದೇಹಪೋಷಕ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಬೀಜಕಣಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆಯೋ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಧಾನವು ಬೀಜಕಣೋತ್ಪಾದಕ ವಲ್ಲದವುಗಳಿಗಿಂತ ಬೀಜಕಣಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿಮಾಡುವ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರ. ಬೆಸಿದಿಯೊಮೈಸೀಟ್ ಪರ್ಗದ ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಮಿಕ್ರೊಮೈಸೀಟ್ ಪರ್ಗದ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಇವೆರಡೂ ಫಲಕವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಮಾದರಿ ತೆಗೆಯುವಾಗ, ತಂತುರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಬಹಳಷ್ಟು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣು ಮಾರ್ಪಾಟಿಕರಣ ಫಲಕ ಮಾದರಿ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ

ಮಾಡುವ ಪರಿಮಾಣ ಅಂದಾಜಿನಿಂದ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ದೊರಕುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಪದೇ ಪದೇ ಮಾದರಿ ತೆಗೆದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯವುಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಹಂತವು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೊರತೆಗಳೂ ಇವೆ. ಮಣ್ಣು ಮಾರ್ಪಾಟೀಕರಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೊದಲೆ ಮಣ್ಣು ಮಾದರಿಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಲೆಸಿದಾಗ ಮೇಲಿನ ತಿಳಿಯಾದ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ಉಳಿಕೆ ಎಂದು ಕೈಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಅನೇಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಜಾತಿಗಳು ಕೈಬಿಟ್ಟುಹೋಗುತ್ತದೆ.

ಮಣ್ಣು ಮಾರ್ಪಾಟೀಕರಣ ಫಲಕ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಮಾಧ್ಯಮವು ಆಯ್ಕೆಯಾದಾಗರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಫಲಕದಲ್ಲಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳೂ ಇಡಿಕಿರಿಯುತ್ತವೆ. ಫಲಕಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಆದ್ದೀಕರಿಸುವುದರಿಂದ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳ ಬೆಳೆದಾಗೆಯನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಬಹುದು. pHನ್ನು 5.0ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲವೇ ಬಣ್ಣಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಜೈವಿಕಗಳಂಥ ಏಕಾಣುಜೀವಿ ಬಂಧಕಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಮಾರ್ಪಿನ್ ರವರ ಪೆಪ್ಟೋನ್-ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ರೋಸ್ ಬೆಂಗಾಲ್-ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೊಮೈಸಿನ್ ಜೇವ್ಯಾನ್‌ರ್ದರ್ಥಕ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಜೈವಿಕಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮ.

ವಾರ್ಕುಪ್ ಎನ್ನುವವರು ಈ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣು ಫಲಕ ವಿಧಾನ (ಸಾಯಿಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೆಥಡ್) ರೂಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಮಾರ್ಪಾಟೀಕರಣ ಫಲಕ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿಯೆ ಎಷ್ಟೋ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಹರಿಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಡಿಪ್‌ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಹುದುಗಿಸಿ, ಫಲಕಮಾಧ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ತೆಳ್ಳಗೆ ಹರಪಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಮಣ್ಣಿನ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಜೀವಿಯಾಗಿ ಅವನ್ನು ತೆಳ್ಳಗೆ ಹರಪುವುದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಯಾವ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಪ್ರಭೇದವನ್ನೂ ಉಳಿಸುವಂತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಾಗ್ಯೂ ಕೆಲವು ವಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು, ಶೀಘ್ರ ಬೆಳೆದಾಗೆಯು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ದೇಹವ್ಯಾಪಕ ತಂತುದಾರಗಳಿಂದ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಬೀಜಕಣಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಇಲ್ಲವೇ ಇತರ ತಟಸ್ಥ ಬೀಜಕೋಶಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಮಣ್ಣು ಘನವದಾರ್ಥಗಳು. ಸ್ವದಗಳು ಮತ್ತು ಅನಿಲಗಳು ಕೂಡಿದವು ಒಂದು ವೈವಿಧ್ಯಪೂರ್ಣ ವಸ್ತು. ಮಣ್ಣು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ವಿವರಿಸುವಾಗ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳಿರುವ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿಯೆ ವಿನಿಮಯಗಳು, ಸಾಮಾನ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು, ಸಣ್ಣ ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡ ಕಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣು ವಿಂಗಡಣೆ ವಿಧಾನದೊಂದು ವಸರು. ಮಣ್ಣನ್ನು ಜರಡಿ ಹಿಡಿಯುವಿಕೆ, ನೀರನ್ನು ಹೀರಿ ದೊಡ್ಡ, ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರಾಪಗಮನ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಅದರ ರಾಸಾಯನಿಕ ಘಟಕಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕದಿಂದ ಅಧ್ಯಯನಿಸಿ ಇದು ಸಾಕಾರಿ ವಿಧಾನದಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಿನ ವಿವಿಧ ರಾಸಾಯನಿಕ ಘಟಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ತಂತು ಮತ್ತುತರ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ತತ್ಸ ಸಾಕಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ಅವುಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಕುಪ್ಪಿನ ಮಣ್ಣುಪ್ಪಲಕ ವಿಧಾನದಿಂದಲೂ ಮಣ್ಣಿನ ವಿವಿಧ ಘಟಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ, ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾದ ವಿಧಾನವು ಈ ಹಿಂದೆ ಇತರ ಯಾವುದೇ ವಿಧಾನದಿಂದಲೂ ಕಂಡುಬಾರದಿದ್ದ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ.

ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನವು ಮಿಶ್ರ ತಳವುಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಕ ಆಹಾರವಾಗಿ ಬಳಸಿ, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಿಶ್ರ ಗುಣಿತ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ಮಾಸವಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ರೋಗಕಾರಕವಾದ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಏಕಾಣುವಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಕಾಗದದ ಪಟ್ಟಿಗಳು, ಸೆಲೋಫೇನ್ ಪಟ್ಟಿ, ಹತ್ತಿಬಟ್ಟೆಯ ಚೂರುಗಳು ಮತ್ತುತರ ಸೆಲ್ಲುಲೋಸ್ ಯ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲುಲೋಲಿಟಿಕ್ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ವಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಕಾಲ ಬಳಿಕ, ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದು ಸೆಲ್ಲುಲೋಲಿಟಿಕ್ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದ್ವಯದಾತ ಸಸ್ಯಗಳ ಅಂಗಾಂಶಗಳು, ಕೈಟಿನ್ ಎಂಬ ವಸ್ತುವುಳ್ಳ ಕೀಟಗಳ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೆರಾಟಿನ್ ಬುಳ್ಳ ವಸ್ತುಗಳ ಕೊಂಬು. ಗೋರಸು ಹಾಗೂ ಕೂದಲುಗಳನ್ನು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಸ್ಯರೋಗಕಾರಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಟಿನ್ ಹಾಗೂ ಕೆರಾಟಿನ್ ಎಂಬ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಡಗಿಸುವ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಆಕರ್ಷಕ ಆಹಾರವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಕಂಡುಬರುವ ಅನೇಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಹುವಾಗಿ ಮಣ್ಣು ದುರ್ಬಲೀಕರಣ ಫಲಕ ವಿಧಾನದ ಅಧ್ಯಯನ ದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಫಲಕ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಮಾಸ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವನ್ನು ಉಳಿಕೆ ಮಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದುಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಜೀವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆವರಣಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಸಹ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವು ಗಳಲ್ಲಿ ಶಂಕುಕಾಯಿ (ಕೋನಿಫರಸ್) ಮತ್ತು ನಿತ್ಯದರಿವರ್ಣಿ ಮರಗಳು ಬೆಳೆಯುವ ಕಾಡುಗಳ ಮಣ್ಣು, ಪೀಟ್ ಮಣ್ಣುಗಳು, ಕೊಳೆ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮಣ್ಣುಗಳು. ಮರಳು ಗುಡ್ಡಗಳು ಮತ್ತಿತರ ಮರಳುಗಾಡು ಮಣ್ಣುಗಳು, 'ತಂಪು' ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳ ಮಣ್ಣುಗಳು, ಉಳುಮೆಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಉಳುಮೆ ಮಾಡದ ಭೂಮಿಯ ಮಣ್ಣುಗಳು ಸೇರುತ್ತವೆ. ಇದರಂತೆ, ಕೆಲವು ಜಾತಿಯ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಪ್ರಪಂಚದ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವಂತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅಂಥ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಆಸ್ಪರಜಿಲ್ಲಸ್, ಆಲ್ಪರ್ನೇರಿಯ, ಬಾಟ್ರಿಟಿಸ್, ಸಿಫಲೊಸ್ಟೊರಿಯಂ, ಕ್ಲಾಡೊಸ್ಟೊರಿಯಂ, ಫ್ಯುಸೇರಿಯಂ, ಮ್ಯಾಕರ್ ಪೆನಿಸಿಲ್ಲಿಯಂ, ರೈಜೊಪಸ್, ಟ್ರೈಕೊಡೆರ್ಮ, ವರ್ಟಿಸಿಲ್ಲಿಯಂ ಮತ್ತು ಜೈಗೋರಿಂಕಸ್ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿವೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯೀಸ್ಟ್, ಫಂಗೈ ಇಂಫರ್ಫೆಕ್ಟೈ ಮತ್ತು ಮೈಸೀಲಿಯ ಸ್ಟೆರೈಲಿಯ ಪ್ರಭೇದಗಳೂ ಸೇರಿವೆ. ಗಿಲ್‌ಮನ್ ಎಂಬುವನು 170 ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ 690 ಮಣ್ಣು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭೇದಗಳು ಪೆನಿಸಿಲ್ಲಿಯಂ, ಆಕ್ಲಿಯ, ಆಸ್ಪರ್ ಜಿಲ್ಲಸ್, ಮ್ಯಾಕರ್, ಕೀಟೋನಿಯಂ, ಮಾರ್ಟಿಯರೆಲ್ಲ, ಪಿಥಿಯಂ, ಫ್ಯುಸೇರಿಯಂ, ಮಾನೊಸ್ಟೊರಿಯಂ ಮತ್ತು ಸಾಪ್ರೊಲಿಗ್ನಿಯ ಎಂಬ 10 ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಅಸ್ಟೊಮೈಸೀಟ್ ಮತ್ತು ಮೈಸೀಲಿಯ ಸ್ಟೆರೈಲಿಯ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ; ಆದರೆ, ಒಂದೂ ಬೆಸಿಡಿಯೊಮೈಸೀಟ್ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಅಭ್ಯಸಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲಾದ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಭಾಗ ಆಸ್ಪರ್ಜಿಲ್ಲಸ್, ಆಲ್ಪರ್ನೇರಿಯ, ಕೀಟೋನಿಯಂ, ಫ್ಯುಸೇರಿಯಂ, ಮ್ಯಾಕರ್, ಪೆನಿಸಿಲ್ಲಿಯಂ ಮತ್ತು ರೈಜೊಪಸ್ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದುವಾಗಿದ್ದವು.

ಮಣ್ಣು ವಿಂಗಡಣೆ ತಂತ್ರದಿಂದ. ಇನ್ನಾವ ವಿಧಾನದಿಂದಲೂ ಗುರುತಿಸಲಾಗದಿದ್ದ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಇರುವಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಒಫಿಯೊಬೊಲಿಸ್ ಗ್ರಾಮಿನಿಸ್ ಮತ್ತು ರೈಜೊಕ್ಟಾನಿಯ ಸೊಲಾನಿ ಎಂಬ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ತಂಡದವರುಗಳು. ಒಫಿಯೊ ಶಿಲೀಂಧ್ರದ ಉಪಜೀವಕಗಳು ಮತ್ತು ಫೈಕೋಲಿಯಂ ಶಿಲೀಂಧ್ರದ ಕ್ಲಾಮಿನೂ ಬೀಜಕಣಗಳು ಸಾವಯವ ವಸ್ತುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಮೈಸಿಲಿಯ ಸ್ಟೆರಿಲಿಯ ಮತ್ತು ಬೆಸಿದಿಯೊ ಮೈಸಿಟುಗಳ ತಂಡದವರ ತುಕಡಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಣ್ಣು ಮಾರ್ಪಾಟಿಕರಣ ಫಲಕ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವೆಂದು ಬಿಡುವ ಭಾರ ವಿಘನಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತವೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಮಣ್ಣನ್ನು ಜರಡಿಹಿಡಿದು ವಿಂಗಡಿಸಿದಾಗ ಎಂಪೊಗಾನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲೇರೋಟೀಯಗಳ ಜೈಗೋಕಾರ್ಪ್ (ತಂತು ಹೇಗೆಯಲ್ಲಿ ಯುಗ್ಮ ಬೀಜಕಣಗಳ ಸಂಗ್ರಹ) ಸಂಧ ದೊಡ್ಡ ರೋಗಿಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು. ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ, ಸೊಯೋಬೀಸ್, ಸಜ್ಜೆ, ರಾಗಿ, ಅಲಸಂದೆ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಗಿಡಗಳ ಬೇರು ವಲಯದ ಮಣ್ಣನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಜಾಲಿಸಿದಾಗ, ಎಂಪೊಗಾನಾಸಿಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದವು. ಇದರಿಂದ, ಬೆಳೆಸಸ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಸಂಬಂಧವಿರುವುದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

ಅಯ್ಯ ತಂತ್ರದಿಂದ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ, ಈಗಿನವರೆಗೂ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕದೆ ಇದ್ದ ಅನೇಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಕೆರಾಟಿನ್ ವಸ್ತು ವಿಶೇಷವಿರುವ ಕೊವಲು, ಗೊರಸು ಮತ್ತು ಕೊಯುಗಳನ್ನು ಕೆರಾಟಿನ್ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕರಗಿಸುವ ಕೆಲವು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ರೈಟಿನ್ ವಸ್ತು ವಿಶೇಷವುಳ್ಳ ಕೀಟಗಳ ರಕ್ತಗಳನ್ನು ಕ್ರೈಟಿನ್ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕರಗಿಸುವ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿಮ್ಮೊ ಆಸ್ಟೇಸಿಯ(ಆಸ್ಟೊಮೈಸಿಟುಗಳು) ಗುಂಪಿನ ಕೆರಾಟಿನಾಲಿಟಿಕ್ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ವಿಧವಾದ ಚರ್ಮವ್ಯಾಧಿ(ದರ್ಮಟೊ ವೈಕೋಸಸ್)ಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಚರ್ಮ ವ್ಯಾಧಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ನಾಸ್ಕಜ್ಜೆಯ ಮತ್ತು ಅರ್ಥ್ರೊಪೆಸರ್ ಜಾತಿಯ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಬೇರ್ದಡಿಸಿ. ಗುರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೋರುವ ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ ಕುಬಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿರುವ ಕ್ರಿಯೂ ಸೋಟ್ ಎಂಬ ವಸ್ತುವಿಶೇಷವು ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಡೊಸ್ಟೊರಿಯಂ ಕೆಸಿನೀ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಬೇರ್ದಡಿಸಿ ಅಭ್ಯಸಿಸಲಾಯಿತು. ಹಿಂದೆ ಈ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಏರೋಪ್ಲೇನಿನ ಸೀಮೆಣ್ಣೆ ಹಾಕಿರುವ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಡದೆ

ಮುಕ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದುಂಟಾದರೆ ಏಕೋಪ್ಪೇಸಿನ ಇಂಥಾನ ಪೃಥ್ವಿಯ ನಾಶಕ್ಕೆ ಎದೆಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕಂಡುಬಂತು. ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಮಿನಲ್‌ವಿಡ್ಯಾಲಿಯದ ಸಸ್ಯರೋಗಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾದ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ದುಃಖನಲ್ಲಿರುವ ರೋಗಕಾರಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಬಿಡಿಯುವುದಲ್ಲದೆ, ಇನ್ನೂ ಇತರ ಅನೇಕ ಪಕ್ಷುಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಿ ಪಾಳುಮಾಡುವ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲೂ ಈ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ರೋಗಸೋಂಕಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುವ ಬತ್ತವ ಕಡ್ಡುಗಳನ್ನು ಆಹಾರವಾಗಿ ಬಳಸಿ ದುಃಖನಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಂದಾಜು ಹಾಗೂ ಬತ್ತದ ಬೆಳೆಗೆ ಕುಂದು ಎಲೆಚುಕ್ಕೆ ರೋಗದನ್ನು ಬರಿಸುವ ಪಲ್ವಿಂತೋಸ್ಪೋರಿಯಂ ಒರೈಜೀ ರೋಗಕಾರಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದೇ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಗೆ ತಗಲುವ ಪೈನಾಪ್ಪಲ್ ರೋಗಕಾರಕ ಸಿರಾಟೊಸಿಪ್ಪಿಸ್ ಪ್ಯಾರಡಾಕ್ಸ್ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಅಭ್ಯಸಿಸಲಾಯಿತು. ಥೆಯಲವಿಯುಪ್ಲಿಸ್ ಬಾಸಿಕೊಲ ಶಿಲೀಂಧ್ರವನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಗಡ್ಡರಿ ಜೂರುಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಮಕ ಆಹಾರವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಯಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ಫೈಟಾಪ್ಲೊರ ಸಿನ್ನಮೋನಿಗೆ ಅನಾನಸು ಹುಣ್ಣಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು, ರೈಸಾಕ್ಟಾನಿಯ ಸೊಲಾನಿ, ಫೈಸೇರಿಯಂ ಕಲೋರಮ್ ಮತ್ತು ಕರ್ಟ್ ಲೇರಿಯ ರಾಮೋಸ್ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳಿಗೆ ಗೋಧಿ ಪೈಸಿನ ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಮಕ ಆಹಾರವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.

ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಬೆಳೆವಣಿಗೆಗೆ ಸತ್ತ ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ತಳಪಡಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಲಭ್ಯಸಾಧ್ಯ ಪಕ್ಷುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಸಾವಯವ ಉಳಿಕೆ ಪಕ್ಷುಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಲೇ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಫೈಮೊಜಿನಸ್ ಗುಂಪಿನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೆನಿಸಿಲ್ಲಿಯಂ, ಟ್ರೈಕೊಡೆರ್ಮ, ಅಸ್ಪರ್ಜಿಲ್ಲಾಸ್, ಫೈಸೇರಿಯಂ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕರ್ ಜಾತಿಗಳ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಈ (ಫೈಮೊಜಿನಸ್) ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಬಹುಶೇಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಅಮೋನಿಯಂ ಲಯಂಗಣ ಮತ್ತು ನೈಟ್ರೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಾರಜನಕಮೂಲವಸ್ತುವನ್ನಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಕಾರ್ಬೊ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ವಸ್ತುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕದ, ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಬೆಳೆವಣಿಗೆಗೆ ಸಾರಜನಕವು ಕಡಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಸಾರಜನಕವು ಸೂಕ್ಷ್ಮಕೋಶದ ಬಳಗದ ಸೇರಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂಗಾಲ : ಸಾರಜನಕ ಪ್ರಮಾಣವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತ ಅಂದರೆ, ಕ್ರಮವಾಗಿ 30:1 ಮತ್ತು 15:1 ಆದಾಗ ನಿಶ್ಚಲತೆ ಹಾಗೂ ವಿವಿಜೀಕರಣ ಪ್ರಮಾಣವೆರಡೂ ಸುಮಾರು ಸಮಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 15:1

ಪ್ರಮಾಣಿತವೂ ಕಡಮೆಯಾದಾಗ, ಸಾರಜನಕವು ವಿನಿಜೇಕ್ರತವಾಗಿ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಸಸ್ಯಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎಷ್ಟೋಮೇಳೆ, ಕೆಲವು ಲೀಂಥೈಟ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್‌ವಾಹಕವಿರುವ ಆಹಾರವು ಇದ್ದಾಗ, ಕಡಮೆ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಬಳಸುವುದಕ್ಕೂ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸಾಕಣೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಲೀಂಥೈಟ್ ತಂತುಜಾಲದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 5 ರಷ್ಟು ಸಾರಜನಕವಿರುತ್ತದೆ. ಮರದ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಹಾಗೂ ಇಂಗಾಲ-ಸಾರಜನಕ ಪ್ರಮಾಣವು 500:1 ರಿಂದ 1000:1 ಅಂತರದಲ್ಲಿರುವ ಲೀಂಥೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 0.2 ರಷ್ಟು ಸಾರಜನಕವು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. ಆಹಾರದ ಇಂಥ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ, ಲೀಂಥೈಟ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾರಜನಕ ಜೀವ ದ್ರವ್ಯಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತಂತುಜಾಲದಲ್ಲಿರುವ ಸಾರಜನಕದ ಪುನರ್ಬಳಕೆಯಿಂದ ಪಾಲಿಸಿ ಕೊಂಡು ಬರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ: ಅದಲ್ಲದೆ, ಸಾರಜನಕವು ತಂತುಜಾಲದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಿಕ್ ಆಮ್ಲವಿರುವ ಭಾಗವೆಡೆ ಸೇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಇದರಿಂದ ಇಂಗಾಲ: ಸಾರಜನಕ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು 25:1 ರಿಂದ 1600:1 ಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ, ಆಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಿಕ್ ಆಮ್ಲದಲ್ಲಿರುವ ಸಾರಜನಕವು ಶೇಕಡಾ 4.1 ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 25 ಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆಂದು ಕಂಡುಬಂತು (ಗ್ರಿಫಿನ್, 1972.)

ಲೀಂಥೈಟ್‌ಗಳ ಬೆಳೆವಣಿಗೆಗೆ ಇಂಗಾಲ ಮತ್ತು ಸಾರಜನಕವಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವು ಖನಿಜಾಂಶಗಳೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಖನಿಜಾಂಶಗಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೊರತೆಯ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ರಂಜಕ ಮತ್ತು ಗಂಧಕಾಂಶಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇಲ್ಲದಿರುವುದಾಗಿ ಲೀಂಥೈಟ್‌ಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಕೊರತೆಯಾಗುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಜೈವೋಜೆನ್ಸ್ ಲೀಂಥೈಟ್‌ಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು ತಿಳಿದಿವೆ. ಆದರೆ ಮ್ಯೂನಿಕ್ ಆದ್ದು, ಲಿಗ್ನಿನ್ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಾಲದವರೆಗೂ ಕೊಳೆಯದೆ ಇರುವ ತಳಿಪದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಜೀವಿಸುವ ಬೆಸಿಡಿಯೊ ಮೈಸೀಟ್ ಲೀಂಥೈಟ್‌ಗಳ ವಿಚಾರ ಬಹಳ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಈ ಲೀಂಥೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಇರುವಂತಹ ಜೀವಿಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.

ಲೀಂಥೈಟ್‌ಗಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಿದ ವಾತಾವರಣವಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ವಾತಾವರಣವು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಿಸಿದಾಗ ಸುಪ್ತಾವಸ್ಥೆ (ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆ)ಗೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಲೀಂಥೈಟ್‌ತಂತುಜಾಲಗಳು ಸಕ್ರಿಯ

ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಸ್ಥಿತಿಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಸಕ್ರಿಯ ತಂತುಗಳು ಜೀವಕಣರಸದಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದು, ಬಣ್ಣವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ತಂತುಗಳು ಪೊಳ್ಳಾಗಿದ್ದು, ಉಸಿರುಹೋದ ಸೈಕಲ್ ಟ್ಯಾಬಿನಂತೆ ತಪ್ಪಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ವಾರ್ಯುಪ್ ಎಂಬುವನು ಗೋಧಿಯ ಹೊಲದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 23ರಷ್ಟು ತಂತುನಾರಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದು, ಆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬೆಳೆಉಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಉಳುಮೆಮಾಡಿದಾಗ ಶೇಕಡಾ 75ರಷ್ಟು ತಂತುಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದುದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಂತುಗಳು ಅಲ್ಪಕಾಲಿಕ ಬದುಕಿನವು; ಆದರೆ, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕಾಲ ಬದುಕುಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾದ ಇತರ ರಚನೆಗಳೆಂದರೆ ರೈಜೊಮಾರ್ಫ್, ಆರ್ಥ್ರೊಬೀಜಕಣಗಳು(ಇವು ಶಿಲೀಂಧ್ರತಂತು ಒಡೆಯುವಿಕೆಯಿಂದಾದವು), ಕ್ಲಮಿಡೊ ಬೀಜಕಣಗಳು, ಸ್ಪೋರೋಷಿಯ ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ವಿವರಿಸಲಾದ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಲೈಂಗಿಕ ಬೀಜಕಣಗಳಾಗಿವೆ.

ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ತಳಪಡಿಗಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿದ್ದು, ಇತರ ವಾತಾವರಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸಹ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವಾಗ ಕೊಳೆತಿನಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಸಹ ದುಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಳಿಕೆಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಉಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಬೇಕಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಂಶಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ವಲಸೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಳಿಕೆಗಳು ವಿಭಜನೆಗೊಂಡಂತಹ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲವೇ ಇನ್ನೊಂದು ಬಗೆಯ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಉನ್ನತಿಗೆ ಬರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಸ್ಯ ಉಳಿಕೆಗಳಿದ್ದಾಗ, ಉಪ್ಯೋಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಜೈವೋಪ್ಯೋಷಣಗಳು(ಎರಡೂ ಫಿಕ್ಸೋಮ್ಯೋಷಣಗಳು) ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಹಾಗೂ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಪಿಷ್ಟಗಳಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟು(ರರ್ಕರಪಿಷ್ಟ) ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನಲ್ಲದೆ ಬೇರೇನನ್ನೂ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ 'ಸಕ್ಕರೆ' ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಬಳಿಕ ಹ್ಯೂಮಿಕೋಲ, ಪಾಟ್ರಿಯೊಟ್ರಿಕಂ, ಕೀಟೋನಿಯಂ ಮತ್ತು ರೈಜೊಕೊನಿಯಂ ಜಾತಿಗಳ ಪ್ರಭೇದಗಳೇ ಮುಂತಾದ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್‌ಲ ಯಕ(ಸೆಲ್ಯುಲೋಲಿಟಿಕ್) ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಪ್ರಧಾನವಾಗುತ್ತವೆ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕಡಮೆಯಾದಂತೆ, ನಿಧಾನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ವರೂ ಲಿಗ್ನಿನ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯೂಮಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಅನಂತರ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್‌ಲ ಯಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಸೆಲ್ಯುಲೋಸನ್ನು ಸರಳ ಕರಗುವ ಸಕ್ಕರೆಗಳಾಗಿ ಪಾರ್ವರಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಕ್ಕರೆ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಪ್ರಧಾನವಾಗಬಹುದು.

ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜಾತಿಯ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಪರಸ್ಪರಾನು ಕೂಲತೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವಿಸಬಹುದು; ಇಲ್ಲವೇ ಅವು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರತಿವಿಷ್ಣುವಾಗದಿಂದ ವಿದುರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದೇ ತಳವಡಿ, ಪರೋಪ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಪರಭಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಜೀವಿಗಳ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿವಿಷ ವಸ್ತುಗಳ ಲಕ್ಷಣ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ವಿರೋಧಿ ಇಲ್ಲವೇ ಕಡಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಾದ ವಸ್ತುಗಳೆಂದು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವುದಾದರೆ ಅಷ್ಟು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಎಲ್ಲ ವಿರೋಧಿ ಪರಿಣಾಮಗಳೂ ಪ್ರತಿಜೈವಿಕವಾದವು ಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಧಿಕ ಸಾಂದ್ರತೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾಗ, ಕೆಲವು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಬಗೆಯ ಪರಿಣಾಮ ವುಂಟಾದಾಡುತ್ತವೆಂದು ಹೇಳಲಾದ ವಸ್ತುಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಇತರ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಹೇಳು ಟುಮಾಡುವ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕುರಿತು ತಿಳಿಯಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಆಧಾರಗಳೆಲ್ಲ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮೂಳಕೆಯೊಡೆಯುವಿಕೆ ಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ರೂಪರಚನೆ, ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ತಂತುಗಳ ಲಯನ ಮತ್ತು ಸಾವು, ಮೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೀಜಕಣದಲ್ಲಿಯ ಮೂಳನಳಿಕೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಸತ್ತಯುಕ್ತ ಮಣ್ಣುಸಾರ ಮತ್ತು ಹರಡಿದ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅಪಲೋಕಿಸುವುದನ್ನು ಅಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲಾದ ಬಹುತೇಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯ ವಾತಾ ವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಜೈವಿಕಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿಮಾಡುತ್ತವೆ; ಆದರೆ, ಅವು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ಪತ್ತಿಸೂಡುವುದೇ ಎಂಬುದು ಸಂದೇಹಾಸ್ಪದ.

ಇತರ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಂದ ಲಯನಗೊಂಡ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ತಂತುದಾರಗಳು ನಾಶ ವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಸ್ವತಃ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿನೊಮ್ಮೈಸೀಟುಗಳ ಶಿಲೀಂಧ್ರೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಟಿರಿಯಾ, ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೊಮೈಸೀಟಾ ಮತ್ತು ಸ್ಪೈರೈಲಾ ಮೈಸೀಟಾ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಶಿಲೀಂಧ್ರೀಯವೆಂದು ತೋರಿಬಂದಿದೆ. ಹೆಲ್ಮಿಂಥೋಸ್ಟೊ ರಿಯಂ ಸಟ್ಕೆವಿಮ್, ರೈಜೊಕ್ಲೋನಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಕೊಲ, ಫ್ಯುಸೇರಿಯಂ ಸೊಲಾನಿ ಮತ್ತು ಫ್ಯುಸೇರಿಯಂ ಫೇಸಿಯೋಲೈಗಳು ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿನೊಮ್ಮೈ ಸೀಟುಗಳ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಪರೋಪಜೀವನ ಎಂದರೆ, ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಬೇರೆ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಪರೋಪಜೀವನ ನಡೆಸುವುದು ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಪಿಪ್ಪೊಸಿಫಲಿಸ್ ಮತ್ತು ಸಿನ್‌ಸಿಫಲಿಸ್ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು, ಮ್ಯೂಕರೇಲ್ ಜಾತಿಯ ಮೇಲೆ ಪರೋಪಜೀವಿಗಳಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಪೆನ್‌ಸಿಲ್ವಿಯಂ ವರ್ಮಿಕ್ಯುಲೇಟಮ್ ಎಂಬುದು ರೈಚೊಕ್ಟೋನಿಯ ಸೊಲಾನಿ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಪರೋಪಜೀವಿಯಾಗಿದ್ದು, ರೈಚೊಕ್ಟೋನಿಯದ ತಂತುದಾರಗಳ ಬದುಕುಳಿಯುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕುಂದಿಸಿದ್ದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಪರೋಪಜೀವನ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದರೂ, ಪರೋಪಜೀವಿಯಿಂದ ಪೀಡನೆಗೊಳಗಾದ ಅತ್ರಯದಾತ ಶಿಲೀಂಧ್ರದ ಸಾಮಗ್ರಿ ಪರೋಪಜೀವಿಗಳೇ ಕಾರಣವೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದಾದರೂ ಕಾರಣವಿದೆಯೋ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಕಷ್ಟ.

ಒಂದು ತಳೆಪಡಿಯನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವ ಎರಡು ಇಲ್ಲವೇ ಅನೇಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರಿಸಿದಾಗ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮರ್ಥವಾದುವು ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಹೊರದೂಡುತ್ತವೆ. ಇದೊಂದು ವಿಧವಾದ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಬಟ್ಟರ್ ಶಿಲೀಂಧ್ರಪೀಡಿತವಾದ ಗೋಧಿಯ ಹುಲ್ಲುಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಫಲವತ್ತಾದ ಗೋಧಿಯ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹೂಳಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕರ್ನುಲೇರಿಯ ರಾಮೋಸ ಶಿಲೀಂಧ್ರವು ಒಫಿಯೊಬೋಲಿಸ್ ಗ್ರಾಮಿನಿಸ್, ಹೆಲ್ಮಿಂತೋಸ್ಟೊರಿಯಂ ಸಚ್ಚಿವಮ್ ಇಲ್ಲವೇ ಫ್ಯುಸೇರಿಯಂ ಕಲೋರಮ್ ಗಳಿಗಿಂತ ಗೋಧಿ ಕಾಂಡದ ಮೇಲೆ ವಲಸೆಪೂಡುವುದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬೇರುಸೋಂಕು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಣ್ಣಿನ ಮೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಕೃಷಿವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸಸ್ಯರೋಗಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಪಾಟೀಲ ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರು ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿನ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತಟ್ಟೆಯಾಕಾರದ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿನ ಗದ್ದೆಯ ನಾವೆಯದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಆಹಾರವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಸಿರಾಟೊಸಿಸ್ಪಿಸ್ ಪ್ಯಾರಡಾಕ್ಸ್ ಎಂಬ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಈ ಹೂಳಿಟ್ಟ ಕಬ್ಬಿನ ತುಂಡುಗಳಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗಿ ವಲಸೆ ಬಂದವು. ಈ ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ಗೋಧಿಯ ಹುಲ್ಲುಕಡ್ಡಿ ಅಥವಾ ಕಬ್ಬಿನ ತುಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುವ ಹರವು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದುವು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಎರಡು ಜಾತಿಯ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಮಾತ್ರ ಈ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ವಲಸೆಬಂದುವು.

ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ನಡುವಣ ವಿರೋಧಿ ಅಂತಃಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದರೆ ಪರಭಕ್ಷಣೆ. ಈ ಬಗೆಯ ಅಂತಃಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪರಭಕ್ಷಕವು

ಸ್ವತಂತ್ರ ಜೀವಿಯಾಗಿದ್ದು ತನ್ನ ಬೀಟಿಯನ್ನು ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಆಹಾರಮೂಲವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಭಕ್ಷಿಸುವುದು ಅಪರೂಪ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಮಣ್ಣುಜೀವಿಗಳನ್ನು ಭಕ್ಷಿಸುವ ಪರಭಕ್ಷಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಬಗೆಯ ಪರಭಕ್ಷಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಫಿಕ್ಸೊಪೈಸೀಟಾಗಳು ಮತ್ತು ಫಂಗಿ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟೈಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಅಥ್ರೋಬಾಟ್ರಿಸ್ ಕಾನಾಯ್ಡ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ತಂತುಜಾಲ ಕುಣಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆಮಟೋಡಾಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದು ನಿಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ, ನೆಮಟೋಡಿನ ಜೀವಕೋಶದ ರಸವನ್ನು ಹೀರಿ, ಪೋಷಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು, ಅಮೀಬವನ್ನು ಭಕ್ಷಿಸುವುದೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಕೂಡುಜೀವಿತನ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರಾವಲಂಬನಗಳು ವಾಸ್ತವ ಅಂತಃಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೊರಲಿನ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿಲೀಂಧ್ರವು ಮತ್ತೊಂದು ಶಿಲೀಂಧ್ರದ ಸಹವಾಸ ಇಲ್ಲವೇ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಃಪ್ರತಿಕಿ ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ಎರಡೂ ಜೀವಿಗಳೂ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ, ಜೀವಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಆವರಣ ನಿರ್ವಾಹಣ ಮಾಡುವಿಕೆಯು ಕೂಡುಜೀವಿತನಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಂಪರ್ಕದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಮುಂಗಾಮಿ ವಲಸೆಯ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಆಕ್ರಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಸರಳ ಪದ್ಧತಿಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಉಪ ವಲಸೆಯ ಶಿಲೀಂಧ್ರ (ಇನ್ನೊಂದು ಬಗೆಯ ಶಿಲೀಂಧ್ರ)ಗಳಿಗೆ ಅಹಾರವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿ ವಲಸೆಬರಲು ಸರವಾಗುತ್ತದೆ.

ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಭೌತಿಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಹಾಗೂ ಆ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಅ ಮೂವರೂವು ಮತ್ತೊಂದು ಬಗೆಯ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಜೀವಾಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವಂತೆ ಬದಲಾವಣೆಗೊಳ್ಳುವುದು ಕೂಡುಜೀವಿತನದ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಆಸ್ಮೊಫಿಲಿಕ್ ಯೀಸ್ಟ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ಬೆಳೆದುಬೆಳೆಯುವ ಸಕ್ರೇ ದ್ರಾವಣದ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಕಡಮೆಮಾಡಿ ಅಂಥ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಕಡಮೆ ಆಸ್ಮೊಫಿಲಿಕ್ ಯೀಸ್ಟ್‌ಗಳು ಬೆಳೆಯಲು ಅವಕಾಶಮಾಡುತ್ತವೆ (ಇದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕೂಡಿಜೀವಿತನದ ಮಾದರಿಯ ಉದಾಹರಣೆಯೇನಲ್ಲ).

ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಜಾತಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಪರಸ್ಪರಾವಲಂಬನ ಸಹವಾಸವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ

ಹೆಚ್ಚು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಜೀವಿಗಳ ನಡುವಣ (ಮೈಕೋರೈಜಲ್) ಹಾಗೂ ಶಿಲಾವಲ್ಕಗಳಲ್ಲಿಯಂತೆ ಶೈವಲ ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ನಡುವಣ ಸಹವಾಸಗಳು ಕೂಡುಜೀವಿತನದ ಮಾದರಿಯ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ.

ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಬಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಮುಖ್ಯ ಬಾಹ್ಯ ಅಂಶಗಳೆಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥದ ಮಟ್ಟ, ಅದರ ಮುಖ್ಯ ತೇವಾಂಶ. ಉಷ್ಣಾಂಶ, ಆಮ್ಲಜನಕ ಪ್ರಮಾಣ. ಪೋಷಕ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರುವ ಬೆಳೆಗಳಾಗಿವೆ. ಸಾವಯವ ಉಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಸುರುಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಪೋಷಕ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ತತ್ಪಲವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಸಾವಯವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಂತೆಲ್ಲಾ ಅದರಿಂದ ಅಕರ್ಷಣೆಗೊಂಡು ಬರುವ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳೆಂದರೆ ಆಸ್ಪರ್ಜಿಲ್ಲಸ್, ಪೆನಿಸಿಲ್ಲಿಯಂ ಟ್ರೈಕೋಡೆರ್ಮ್, ಫ್ಯುಸೇರಿಯಂ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಕರ್ ಪ್ರಭೇದಗಳಾಗಿವೆ.

ಆಮ್ಲ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿನೊಮೈಸೀಟುಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಷ್ಟೇನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಥಲ್ಲಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮಣ್ಣಿಗೆ ಅಮೋನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟನ್ನು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಆಮ್ಲತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ; ಇದರಿಂದ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಅಂಥ ಭೂಮಿಗೆ ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಕುಗ್ಗುತ್ತದೆ.

ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತೇವಾಂಶ ವಿರುವುದು ಅವಶ್ಯ. ಒಣಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಬೀಜಕಣಗಳು ಮತ್ತಿತರ ವಿಶ್ರಾಂತ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಅತೀವ ತೇವಾಂಶಮುಟ್ಟುವಿದ್ದಾಗ ಅವುಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಿಂತು ಸಂಖ್ಯೆಯು ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವು ಪಾಯುವ ಜೀವಿಗಳಾಗಿರುವುದೇ ಆಗಿದೆ; ಅತೀವ ತೇವಾಂಶವಿರುವಾಗ ಮಣ್ಣಿನ ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಾಂದ್ರತೆಯು ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಕಡಮೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಇಂಗಾಲ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆ ಇರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತವೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಫೈಟಾಫ್ಲೋರ ಸಿನ್ನಮೋನಿ ಮತ್ತು ಫೈಟಾಫ್ಲೋರ ಸಿಕ್ತ್ರಾಫ್ಲೋರ. ಫ್ಯುಸೇರಿಯಂ, ಟ್ರೈಕೋಡೆರ್ಮ್ ಕೊನಿಂಗಿ, ಫೈತಿಯಂ ಡಿಪರ್ಯಾನಮ್ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಮುಂತಾದವು ಇಂಗಾಲ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡಿನ ಹೆಚ್ಚು ತೀಕ್ಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಬಹುತೇಕ ಮಣ್ಣು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಮಿಸೋಫಿಲಿಕ್‌ಗಳಾಗಿವೆ. ಆಸ್ಟರ್‌ಜೆಲ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೈಕೋಡೆರ್ಮ ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸಿಲಿಂಡ್ರೊಕಾರ್ಪಸ್, ಮ್ಯಾಕರ್ ಪೆನಿಸಿಲ್ಲಿಯಂ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಡೊಸ್ಟೋರಿಯಂ ಇವುಗಳ ಕೆಲವು ಪ್ರಭೇದಗಳು 5°C. ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಬಿಸಿಲುಗಾಲದ ಬಿಸಿಲಿನ ರುಳಕಕ್ಕೂ ಚಳಿಗಾಲದ ಚಳಿಗೂ ತಡೆಯಲಾರದೆ ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಕುಗ್ಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುತ್ತದೆ.

ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಜಮೀನಿನ ಮೇಲಿರುವ ಬೆಳೆಯ ಮೇಲೂ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಜಾತಿಯ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಸಸ್ಯಗಳ ಬೇರುದ್ಯವಷ್ಟೆಯಿಂದಲೇ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿತವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತವೆ. ಆಸ್ಟರ್‌ಜೆಲ್ಲಸ್ ಫ್ಯೂಸಿ ಗೇಟಿಸ್ ಶಿಲೀಂಧ್ರವು ಓಟ್ಸ್‌ಧಾನ್ಯದ ಬೇರುವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೆನಿಸಿಲ್ಲಿಯಂ ಫ್ಯುನಿಕುಲೋಸಂ ಮುಸುಕಿನ ಬೋಳದ ಬೇರುವಲಯ: ಇನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಮಣ್ಣು ಪ್ರೋಟೋಜೋವ

ಪ್ರೋಟೋಜೋವಗಳು ಏಕಕೋಶೀಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಾಗಿವೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಕೋಶದಿವಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೋಜೋವ ಮನುಷ್ಯನ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರೋಪಜೀವಿಗಳಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತವೆ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರೋಟೋಜೋವ ಗುಂಪುಗಳು ಇರುವಂತೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಸಾರ್ಕ್ಯೂಡಿನ್ ವರ್ಗದವು ಅಮೀಬದಂತೆಯೇ ಇದ್ದು ತಮ್ಮ ಕೋಶರಸದೂಡಿಕೆಯಿಂದಲೇ ದುಸಿವಾದಗಳ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ಸಿಲಿಯೋಫೇರ ವರ್ಗದವು ಸಿಲಿಯಗಳಿಂಟು ಅಸೇಕ ಕೂದಲಿನಂಥ ರಚನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ಮಾಸ್ಸಿಗೊಫೇರ ವರ್ಗದವು ಕಶಾಂಗಗಳಿಂಟು ಉದ್ದವಾದ ಚಾವಟಿಯಂಥ ರಚನೆಗಳಿಂದ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ.

ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೋಟೋಜೋವಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಸವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ಸಾವಯವ ಮತ್ತು ನಿರವಯವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಎಂದರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಾಸ್ಸಿಗೊಫೇರ(ಕಶಾಂಗಿ)ಗಳು ಸ್ಪೈರೊಮೊನಾಸ್, ಸ್ಪ್ಯಾಗೊಮೊನಾಸ್, ಟೆಟ್ರಾಮೈಟಸ್, ಅಯ್‌ಕೊಮೊನಾಸ್, ಸಿರೊಮೊನಾಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಿಲಿಯಯುಕ್ತವಾದವು. ಬ್ಯಾಂಟಿಯೊಫೇರ, ಕಾರ್ಲಿಡಿಯಂ, ಕಾಲ್ಪೋಡ, ಪಾರ್ಸಿಪೆಲ್ಲ ಇತ್ಯಾದಿ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ಕ್ಯೂಡಿನ್‌ಗಳು

ಅಮೀಬ, ಬಯೋಮಿಕ್ಸ್, ಎನ್‌ಸೈಲಿಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೊಸ್ಟೈಲ ಇತ್ಯಾದಿ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣು ಪ್ರೋಟೋಜೋವುಗಳನ್ನು ಕುರಿತ ಬಹುತೇಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಅಚ್ಚು ಪ್ರಾಣಿ ರೂಪಿ (ಪೋಲೋಜೋಯಿಕ್)ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಪ್ರಾಣಿರೂಪಿ (ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ಆಹಾರಿ) ಪ್ರೋಟೋಜೋವುಗಳಿಗೆ ಜೀವಸತ್ವಗಳು, ಅದ್ಭುತ ಅಮ್ಮಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಘಟಕಗಳಂಥ ಸಂಕೀರ್ಣ ವಸ್ತು ಅದೃಶ್ಯಕತೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವು ಆಹಾರವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ಕೋಶಗಳಿಂದ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಣ್ಣು ಪ್ರೋಟೋಜೋವುಗಳೆಲ್ಲ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳನ್ನು ಆಹಾರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜೀವಿಸುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಜಾತಿಗಳ ಕೆಲವು ಪ್ರೋಟೋಜೋವುಗಳು ಅದೃಶ್ಯ ವೈದಲಾಹಾರಿ ಜೀವಿಗಳು. ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೋಜೋವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಫಲಕಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಏರೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏರೋಜೆನಸ್ ಎಂಬ ಏಕಾಣುಜೀವಿಯನ್ನು ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಆಕರ್ಷಕ ಬೇಟೆಯಾಗಿ ಇಡಬೇಕು. ಕೊಳೆತನ(ಪ್ರವರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಸಾವಯವ ಮತ್ತು ನಿರವಯವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಆಹಾರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ) ಪ್ರೋಟೋಜೋವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಶಾಂಗಿಗಳು ಕೊಳೆತನಗಳಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುತ್ತದೆ.

ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೋಟೋಜೋವುಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಚಲನೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತೇವಾಂಶವಿರುವುದು ಅದೃಶ್ಯ. ಒಣಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೋಜೋವುಗಳು ಪ್ರತಿ ಕೋಶಗಳಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಕಡಮೆ ತೇವಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅಮೀಬ ಅಥವಾ ಸಿಲಿಯುಯುಕ್ತವಾದವುಗಳಿಗಿಂತ ಕಶಾಂಗಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಹಿಷ್ಣುಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರೋಟೋಜೋವುಗಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 25ರಿಂದ 40ರವರೆಗೆ ಲವಣಾಂಶಗಳನ್ನು ತಡೆದು ಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವು. ಆದರೂ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಲವಣಾಂಶವು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತ ಬಂದಂತೆಲ್ಲ, ಅವುಗಳ ಸಂತಾನೋದ್ವೃತ್ತಿಯು ಕುಂದಿ, ಮುಂದೆ ಪ್ರಾತಿಕೋಶಗಳಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ.

ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೋಟೋಜೋವುಗಳು pH ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚುಕಡಮೆಯಾದರೂ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಬಹಳ ರುಬ್ಬುವಾಗ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಣೆಮಾಡಿದಾಗ pH 5.5ರಷ್ಟು ಕಡಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಹಾಗೂ 9ರಷ್ಟು ಅಧಿಕವಿದ್ದಾಗಲೂ ಸಂತಾನ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ pH 6ರಿಂದ 8 ಇರುವ ಸುರಕ್ಷಿತ ನೆಲೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತವೆ. ಜಿಯೋಪಿಕ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರೋಪಿಕ್ನೆಲ್‌ಗಳ ಕೆಲವು ಪ್ರಭೇದಗಳು pH 8ರಿಂದ 9 ಇದ್ದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯು

ತ್ತದೆ. ಸೆಂಟ್ರಿಫುಜ್‌ಗಳ ಇತರ ಕೆಲವು ಪ್ರಭೇದಗಳು pH 5ರಲ್ಲಿ ಜೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತವೆ.

ಪ್ರೋಟೋಜೋವುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯುವರ ಜೀವವ್ಯವಸ್ಥಾಪರಿಣಾಮವೇ ನಿಯಮ. ಆದರೆ ಅಕ್ಯಾಂತಮೂಲದ ಕೆಲವು ಪ್ರಭೇದಗಳು ಬಹಳ ಕಡಮೆ ಅಮ್ಲಜನಕವಿದ್ದರೂ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವು.

30°C. ಉಷ್ಣಾಂಶವು ಪ್ರೋಟೋಜೋವುಗಳ ಜೀವವ್ಯವಸ್ಥಾ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ಸಂತಾನಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ. ಉಷ್ಣಾಂಶವು 35°Cಯಿಂದ 40°C. ಇದ್ದರೆ, ಅವು ಸತ್ತಿಹೋಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಪೂತಿಕೋಶಗಳು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವು. ದುಣ್ಣನ್ನು 60°C ಉಷ್ಣಾಂಶಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದರೆ, ವೇದ ಸ್ವಾಹಕ ಕೋಶಗಳು ಸತ್ತಿಹೋಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಪೂತಿಕೋಶಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಪೂತಿಕೋಶಗಳನ್ನು ನೋಂದಿರುವ ಪ್ರೋಟೋಜೋವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಅಂದಾಜುಮಾಡಲು ಇವೊಂದು ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ.

ಒಂದು ಗ್ರಾಮ್ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ 10,000ರಿಂದ 1,00,000 ಪ್ರೋಟೋಜೋವುಗಳು ಇದೆಯೆಂದು ಅಂದಾಜುಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವೋದಿಸ್ತ(ಜಲಕಣ)ಗಳಿಗಿಂತ ಕಶಾಂಗಿಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಸಿಲಿಯಯುಕ್ತವಾದವು ಬಹಳ ಕಡಮೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಪೂತಿಕೋಶ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ ಹೆಚ್ಚುವಾರು ಪ್ರೋಟೋಜೋವುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಬಹುತೇಕ ವ್ಯವಸಾಯದ ಅಂಗೈ ಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರೋಟೋಜೋವುಗಳ ಜೈವಿಕ ಗಾತ್ರ 5g/m² ಮಾತ್ರ ಇರಬಹುದು. ಕಾಡುಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಇದು 20g/m² ಇರಬಹುದು. ಪ್ರೋಟೋಜೋವುಗಳು ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಳದರದಲ್ಲಿಗಿಂತ ಮೇಲ್ದರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತವೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೋಜೋವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಗೊಬ್ಬರವಾಹಿನಿ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ವಾಹಿನಿ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೋಜೋವುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಗೊಬ್ಬರವಾಹಿನಿ ಜಮೀನುಗಳು ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳು ಅಧಿಕಗೊಳ್ಳಲು ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರೋಟೋಜೋವುಗಳ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಇದೊಂದು ರೀತಿಯ ಪರೋಕ್ಷ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೋಜೋವುಗಳ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕುರಿತ ಏಕೈಕ ಅಧ್ಯಯನವು ಏಕಾಣುಜೀವಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೋಜೋವುಗಳ ನಡುವಣ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕುರಿತುದಾಗಿದೆ. ಪ್ರೋಟೋಜೋವುಗಳು ಏಕಾಣುಜೀವಿಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧ

ವಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಬರಡು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಏಕಾಣುಜೀವಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೋಜೋವಗಳನ್ನು ಒಳಸೇರಿಸಿದಾಗ ಏಕಾಣುಜೀವಿ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ; ಅದರಲ್ಲೂ ಅವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗಿಂತ ಕಶಾಂಗಿಗಳಿದ್ದಾಗ ಏಕಾಣುಜೀವಿ ಸಂಖ್ಯೆಯು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಗ್ಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೋಜೋವಗಳು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏಕಾಣುಜೀವಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತವೆಯೆಂದು ಇದೇನೂ ಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲ.

ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೋಟೋಜೋವಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಸಂಖ್ಯೆಯವು ಜೀವಕಾಣುಜೀವಿಗಳು. ಇವರಿಂದ ಪ್ರೋಟೋಜೋವಗಳು ಸಹ ಸಾವಯವಪದಾರ್ಥ ವಿಭಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವುದೆಂಬುದು ಸೂಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಆಹಾರವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವ ಪ್ರೋಟೋಜೋವಗಳು ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯ ಕೋಶಸಾರಜನಕವನ್ನು ಆಮೋನಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜಿಸಬಹುದು. ಏಕಾಣುಜೀವಿಕೋಶಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ ಸಿರಿಯೆಯುಕ್ತ ಪ್ರೋಟೋಜೋವಗಳು ಕೇವಲ ಆರುಗಂಟಿಗಳೊಳಗೆ, ಸೇವಿಸಿದ ಏಕಾಣುಜೀವಿ ಕೋಶಸಾರಜನಕವನ್ನು ಆಮೋನಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜಿಸುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಶೈವಲಗಳು

ಶೈವಲಗಳು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಭೂವಾಸಿಗಳಾಗಿ ಹಂಚಿಹೋಗಿವೆ. ಅವು ಮಣ್ಣುಗಳು, ಮರಳು ದಿಣ್ಣೆಗಳು, ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲಂಚಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಶೈವಲಗಳು ಏಕಕೋಶಿಕೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಮುದಾಯವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸೂಕ್ಷ್ಮತಂತುರೂಪದವರೆಗಿರುತ್ತವೆ. ಸಮುದಾಯ ರೂಪವು ಕೋಶಿಕೆಗಳ ವಿಭಜನೆಯಾಗಿ ಅವು ಲೋಳೆಯಂತೆ ಮುಚ್ಚೆಯಾಗಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡುವುದರಿಂದಾಗುತ್ತವೆ. ಮೇಲ್ನುಟ್ಟಿದ ಶೈವಲಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಶವಿಭಜನೆಯು ವಿಘಟಿತ ಕಣವಿಭಜರೂಪವಾಗಿದ್ದು ನೀಲಿಹಸುರು ಶೈವಲದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಕಣವಿಭಜನೆಯೋಗಿ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ನೀಲಿಹಸುರು ಶೈವಲವು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳನ್ನೇ ಹೋಲುತ್ತದೆ: ಆದರೆ, ಅವು ಜನಕವನ್ನು ಹೊರವಿಡುವ ಸಸ್ಯರೀತಿಯ ದ್ವಿತೀಯೋಪಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ; ಜೀವಾವರಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಮೇಲ್ನುಟ್ಟಿದ ಶೈವಲಗಳಂತೆಯೇ ಅದೇ ಬಗೆಯ ಸ್ಥಳಾವರಣಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುತ್ತವೆ.

ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಶೈವಲಗಳನ್ನು 4 ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವು ಕ್ಲೋರೊಫೈಸಿ ಅಥವಾ ಹಸುರು ಶೈವಲ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೊಫೈಸಿ ಅಥವಾ ಡೈಯಾಟಂ

ಗಳು ಕ್ಷಾಂತೋಘೈಸಿ ಅಥವಾ ಹಳದಿಹಸುರು ಶೈವಲಗಳು ಮತ್ತು ಸಯಾನೋಘೈಸಿ ಅಥವಾ ನೀಲಿಹಸುರು ಶೈವಲಗಳು. ಮೇಲ್ಕಟ್ಟಿದ ಶೈವಲಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲೈಂಗಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ : ಆದರೆ, ನೀಲಿಹಸುರು ಶೈವಲದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ನಿರ್ಲಿಂಗ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಚಲಬೀಜಕಣಗಳು, ಅಚಲ ನೇರಬೀಜಕಣಗಳು ಮತ್ತು ಅಕ್ಟಿನೆಟ್ ಎಂಬ ವಪ್ಪ ಭಿತ್ತಿಯ ಅಚಲ ಬೀಜಕಣಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ: ಇವೆಲ್ಲವೂ ದ್ವಿವಿಧಗಳಾದಿವೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ತಟಸ್ಥವಾಗಿ ಬಹಳಕಾಲ ಸುಪ್ತಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಟಿನೆಟ್ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮತಂತುಗಳು ಹಾರ್ಮೋಗೋನಿಯವೆಂಬ ಕೆಲವೇ ಕೋಶಗಳುಳ್ಳ ಉದ್ದ ತಂತುಗಳಾಗಿ ಒಡೆದು ಸಂತಾನೋತ್ಪಾದನೆಯಾಗುವುದೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸುವ ನೀಲಿಹಸುರು ಶೈವಲಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮತಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕವಚಕೋಶಗಳೆಂಬ ರಚನೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಕೋಶಗಳು ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಸ್ಥಾನಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣವು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ನಿರ್ವಾಯುಪರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಆದಕಾರಣ ಸೂಕ್ಷ್ಮತಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಮ್ಲಜನಕ ಹೊರಹಾಕುವ ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಕ ಕೋಶಗಳಿಂದ ಕವಚಕೋಶಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಶೈವಲಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡುವ ಇತರ ನೀರು ಶೈವಲಗಳಿಗಿಂತ ತೀರ ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರವಿರುತ್ತವೆ. ಆದಕಾರಣ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಕಣೆ ಮಾಡುವುದಾಗಲೀ ಗುರುತಿಸುವುದಾಗಲೀ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯ ವಿಚಾರ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕವು ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯ ಸಾಕಣೆ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಕಾರಣ ಜೀವಾವರಣ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಣ್ಣು ಶೈವಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟೇನೂ ಅಭ್ಯಸಿಸಿಲ್ಲ. ಮಣ್ಣು ಶೈವಲ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅಂದಾಜುಮಾಡುವ ಮುಖ್ಯ ವಿಧಾನಗಳೆಂದರೆ, ಮಣ್ಣು ದುರ್ಬಲೀಕರಣ ಫಲಕವಿಧಾನ, ಹರಿದ್ವರ್ಣಕವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಅದರ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆಯ ನಿರ್ಧಾರ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ನೇರ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಣೆಗಳಾಗಿವೆ.

ಮಣ್ಣು ದುರ್ಬಲೀಕರಣ ಫಲಕವಿಧಾನದಿಂದ ವಿವಿಧ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಹೊರಬಂದಿವೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಬಹುತೇಕ ಶೈವಲಗಳು ಸಾಕಣೆ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಒಕ್ಕೂಡಿಕೆಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಂಡು ಸಮಾನ ತೂಗುಕಣಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮತಂತುಗಳು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಚೂರಾಗಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಶಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತವೆ; ಇವು

ಫಲಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ವಲಸೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಎರಡನೆಯ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಅಸಿಟೋನ್ ಸೇರಿಸಿ ಹರಿತ್ತನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ; ಅದರ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆಯನ್ನು ವರ್ಣ ಮಾಪಕದಿಂದ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಬಲ್ಲ ಹ್ಯಾಮಿಕ್ ಆಮ್ಲದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಸಹ ಅಸಿಟೋನಿನಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಹರಿ ದ್ವರ್ಣ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆಯ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ; ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ವಿಧಾನದಿಂದ ಶೈವಲಗಳ ಜೈವಿಕತಾಕ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಯುವುದೇ ಹೊರತು ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮೂರನೆಯ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ದುಣ್ಣನ್ನು ನೀರಿ ನಲ್ಲಿ ಕದಡಿ, ನೇರವಾಗಿ ಅವನ್ನೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಲೂ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಬಗೆಯ ಶೈವಲಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಉಳಿದ ಮಣ್ಣು ಶೈವಲಗಳೆಲ್ಲ ಇತರ ಜಲಶೈವಲಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಅತಿ ಸಣ್ಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಪೆಟ್ರಿ ತಳಿಗೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ತಗಲುವಂತೆ, ಬಹಳ ತೆಳ್ಳಗಿರುವ ಗಾಜಿನ ಬಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹತ್ತಿದಂತಿರುವ ಗಾಜಿನ ಬಿಲ್ಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಶೈವಲ ಸಸ್ಯಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ; ಇವು ಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ ತೆಗೆದು ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ, ವಿವಿಧ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಾಜಿನ ಬಿಲ್ಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುವ ಶೈವಲಗಳ ಅನೇಕ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಹುದು.

ಶೈವಲಗಳು ಬೆಳಕನ್ನು ಶಕ್ತಿಮೂಲವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಇಂಗಾಲ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ಇಂಗಾಲಮೂಲವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವಲ್ಲದೆ ಸಣ್ಣಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಖನಿಜ ಪೋಷಕದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಬಗೆಯ ಆಹಾರಸೇವನೆಯ ಸರಳತೆಯಿಂದಾಗಿ ಶೈವಲಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ವಾತಾವರಣ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಎಂದರೆ, ಮರಳು ಕಾಡು, ಮರಳು ಗುಡ್ಡ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಹ ವಲಸೆ ಬಂದು ಜೀವಿಸಬಲ್ಲವು. ಅವು ಸಸ್ಯಗಳೂ ಮತ್ತು ಇತರ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳೂ ಜೀವಿಸ ಲಾಗದಿದ್ದ ಭೂವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ವಲಸೆಯಾದ ಜೀವಿಗಳು. ವಾಸದ ನೆಲೆ ಯಲ್ಲಿ ಆಸರೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಅನನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದಷ್ಟೂ ಆ ವಾತಾವರಣದ ಜೀವಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶೈವಲಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಹೆಚ್ಚು ಅಲ್ಪಕಾಲಿಕ (ಕ್ಷಣಿಕ ಬಾಳ್ವೆ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ) ಜೀವಿಗಳು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದಾಗ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಅನನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಗ್ಗುತ್ತವೆ. ಈ ಗುಂಪಿಗೆ ಕ್ಲ ಮಿಡೊ ಮೊನಾಸ್, ಯೂಗ್ಲಿನ, ಫೇಕಸ್, ಟ್ರಿಕಿಲೊಮೊನಾಸ್, ಇವೇ ಮುಂತಾದ ಜಾತಿಗಳ

ಶೈವಲಗಳು ಸೇರುತ್ತವೆ. ಇವು ನೀರು ನಿಂತ ಜಾಗು ಪ್ರದೇಶದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ನಾಸ್ಟಾಕ್, ಫಾರ್ಮಿಡಿಯಂ, ಕ್ರೋಕಾಕ್ಸ್, ಅಫಾನೋಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಲಿಂಡ್ರೊಸಿಸ್ಟಿಸ್ ಜಾತಿಗಳ ನೀಲಿಹಸುರು ಶೈವಲಗಳು ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾದ ಮಳೆ (ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ಮಣ್ಣುಗಳು), ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಬೇಸಗೆಯ ಝಳ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲದ ತಂದಿಗಳನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಶೈವಲಗಳಿಗೆ ಲೋಳೆಯ ಕವಚವಿದ್ದು ಅದು ಈ ಎಲ್ಲ ವಾತಾವರಣ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಬಗೆಯ ಕವಚವಿಲ್ಲದ ಡಯಾಟಂಗಳು ಚಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದು ತಂಪಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ, ಮಣ್ಣು ಕಣಗಳ ಸುತ್ತಲಿರುವ ನೀರಿನ ಪೊರೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಮಣ್ಣು ಶೈವಲಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಶೈವಲಗಳ ನಡುವಣ ಅಂತಃಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಜೀವಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಅವುಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಅಷ್ಟೇನೂ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಕ್ಲೋರೊಕಾಕ್ಟಂ, ಸ್ಪೈಕೊಕಾಕ್ಟಸ್, ನಾವಿಕುಲ, ನಿಚಿಯ ಮುಂತಾದ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕೆಲವು ಪ್ರಭೇದಗಳು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಾಕಾಯ್ಡ್ ಶೈವಲಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ನಸುಲ ಪ್ರಭೇದದ ಪ್ರೋಟೊಜೊವಗಳು ಶೈವಲಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಇತರ ಶೈವಲಗಳಿಗಿಂತ ಸಯಾನೊಬ್ಯಾಟ(ನೀಲಿಹಸುರು ಶೈವಲ)ಗಳನ್ನು ದನಗಳು ಮೇಯುವುದು ಕಡಮೆ. ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಶೈವಲಗಳನ್ನು ಸೋಂಕುತ್ತವೆ. ಬೈಟ್ರಿಡಿಯೇಸಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಫಿಕ್ಸೊಮೈಸಿಟಿಸ್ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು, ಶೈವಲಗಳಿಗೆ ರೋಗಕಾರಕಗಳಾಗಿವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ಶೈವಲಗಳಿಗೂ ಸಹ ವಿಷಾಣುಗಳು ಸೋಂಕುತ್ತವೆ. ಲಿಂಗ್ವಿ ಪ್ಲೆಕ್ಸೋನೀಮ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮಿಡಿಯಂ ಎಂಬ ಎರಡು ಶೈವಲ ಪ್ರಭೇದಗಳಿಂದ ಶೈವಲ ವಿಷಾಣುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಶೈವಲಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹವಾಸಿಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವು (ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳು) ಶೈವಲಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಲೋಳೆಯ ಕವಚಪದರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ, ಕೇವಲ ಶೈವಲಗಳನ್ನೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ಸಾಕಣೆಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಗಾಲದಂಶ ಸಾಕಣೆ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಶೈವಲಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ಕಲುಷಿತ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳು ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತವೆ.

ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಶೈವಲ ಸ್ವರೂಪವು ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್‌ಗಳಷ್ಟು ಅಂತರದಲ್ಲಿಯೇ ಅನೇಕ ಶೈವಲ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಸ್ಪೈಟೊನೀಮ ಎಂಬ ಕಷ್ಟ ಶೈವಲ ಸಮುದಾಯವು ಮಿಸೋಟೇನಿಯಂ ಎಂಬ ಮಸಕು ಹಸುರು ಬಣ್ಣದ ಶೈವಲ ವಸತಿ ಹಾಗೂ ರಿವಲೇನಿಯ ಮತ್ತು ನಾಸ್ಟಾಕ್ ಶೈವಲಗಳ ಗೋಳಾಕಾರ ವಸತಿಗಳ

ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇತರ ಸೂಕ್ಷ್ಮತಂತುಯುಕ್ತ ಸೈನೋಫೈಟ ಶೈವಲಗಳು ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಅನೇಕವೇಳೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟುಗಲ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಯೂಗ್ಲಿನ(ಹಸುರು ತುಕಡಿಗಳು) ಮತ್ತು ಜೈಗೋಗೋನಿಯಂ(ಉದಾ ತುಕಡಿಗಳು) ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಇದೇ ಶೈವಲವು ಮಣ್ಣಿನಮೇಲೆ ಹರಡಿದ ಕಪ್ಪು ಹಾಳೆಯಂತೆ ಕಂಡುಬರಬಹುದು; ಫಾರ್ಮಿಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಕೊಲಿ ಯೆಸ್ ಮುಂತಾದ ನೀಲಿಹಸುರು ಶೈವಲಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮತಂತುಗಳ ಬೆರಕೆಯಿಂದ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಪೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮಣ್ಣುಶೈವಲಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆದಿಲ್ಲ.

ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವಿಮಯಕ್ರಾರಯುಕ್ತ ಗೋಡುಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಕೋಕಾಕ್ಸಸ್. ಹಾರ್ಮಿಡಿಯಂ, ಯೂಲೊತ್ರಿಕ್ಸ್(ಹಸುರು ಶೈವಲ). ಅಪಿಲ್ಲಟೋರಿಯ, ಫಾರ್ಮಿಡಿಯಂ. ಅಫಾನೋಥೀಸಿ ಮತ್ತು ನಾಸ್ತಾಕ್(ನೀಲಿಹಸುರು ಶೈವಲ)ಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತಂತುಗಳು ಮತ್ತು ಡೈಯಾಟಂಗಳ ವಸತಿಗಳೂ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರಬಹುದು. ಪೀಟ್ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಕಾಕ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲಿಯೋಕ್ಯಾಪ್ಸ(ನೀಲಿಹಸುರು ಶೈವಲ) ಹಾಗೂ ಫ್ರಸ್ಟೂಲಿಯ ಜಾತಿಗಳ ಡೈಯಾಟಂಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು. ಶೈವಲಗಳು ಮಣ್ಣಿನ ಭೌತಿಕ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಹಾಗೂ ಜೈವಿಕ ಗುಣಧರ್ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ಪ್ರಭಾವದ ಅಧ್ಯಯನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶೈವಲ ಸ್ಥಳಾವರಣಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಲ್ಲ. ಶೈವಲಗಳು ಕಲ್ಲುಬಂಡೆಗಳ ಶಿಥಿಲೀಕರಣ ನಿಯೋಗಿಗಳಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದಾರ್ಥ ಉತ್ಪಾದಕಗಳಾಗಿ ಮಣ್ಣು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಶೈವಲಗಳು ತಮ್ಮ ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಹೊರಬಿಡುವ ಮೂಲಕ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿಯಾಡಲು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ತಾವು ಉತ್ಪತ್ತಿಮಾಡುವ ಹೇರಳ ಲೋಳೆಯಂಥ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ರಂಧ್ರಮಯವಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಲೋಳೆಸ್ರಾವವು ಕೆಳಪದರಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಬಿಡಬಹುದು; ಇದರ ಕೆಳಪದರದಲ್ಲಿ ಇಂಗಾಲ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡಿನ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಕಡಮೆಮಾಡಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಲೋಳೆಸ್ರಾವದ ಪನರವು ಮಣ್ಣನ್ನು ತೇವಯುಕ್ತವಾಗಿರಬಹುದು. ಎಂದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಜನುಗುವಿಕೆಗೆ ಹಾನಿತಟ್ಟದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಆವಿಯ ಮೂಲಕ ನೀರು ನಷ್ಟವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಶೈವಲಗಳು ನೆಲೆಯಾಗಿರುವ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೆಯಾಗುವುದು ಕಡಮೆ. ಮಣ್ಣು ಒಣಗಿದಂತೆ ಶೈವಲ ಪರೀಗಳು ಸುರುಚಿಕೊಂಡು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿಹೋಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಶೈವಲ ಗಳು ವಿತರಣೆಯಾಗಿ ಹೊಸ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ನೆಲೆಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸೈನೋಫೈಟಗಳಿಗೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿಸುವ ಅಸದೃಶ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ. ಶೈವಲಗಳ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಲೋರೊಫೈಟಗಳು ಪಾಲಿಸಾಕಾರೈಡ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್‌ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಶೈವಲಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಕಾರಕಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿಮಾಡುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಶೈವಲಗಳು ಇತರ ಜೀವಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕುರಿತುಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರತಿಜೈವಿಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವಿಪ ಕೊಬ್ಬು ಅವಶ್ಯಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿಮಾಡಬಹುದು.

ಶೈವಲಗಳು ಮಣ್ಣುಕೊಚ್ಚಣೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಮಣ್ಣು ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸಿಂಗ್ (1950) ಸೈನೋಫೈಟಗಳು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ (ಉಸರ್)ದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಾರ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನಾಸ್ತಾಕ್‌ಗಳೇ ಪ್ರಧಾನ ಶೈವಲಗಳಾಗಿವೆ. ಅವು ಆ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿಯ ಸಾವಯವವಸ್ತು ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಶೇಕಡಾ 30 ರಿಂದ 38ರಷ್ಟು ಸ್ಥಿರೀಕೃತ ಸಾರಜನಕದಿಂದ ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಸಿದವು.

ನೀಲಿಹಸುರು ಶೈವಲಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಭೂವಾಸ ಸ್ಥಳಾವರಣ

ನೀಲಿಹಸುರು ಶೈವಲಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತದೆ; ಉಷ್ಣವಲಯದಲ್ಲಿ ತಟಸ್ಥದಿಂದ ಕ್ಷಾರತೆಯ ಹರವಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಪ್ರತಿಗ್ರಾಂ ಮಣ್ಣಿಗೆ 20,000ದಿಂದ 50,000ದವರೆಗೆ ಇರಬಹುದಾಗಿದೆ. ಶುಷ್ಕ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶದ ತಂತ್ರ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ 10,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇರಲಾರದು.

ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾಸ್ತಾಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕಡಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇತರ ಆಸಿಲ್ಲ ಟೋರಿಯ ಲಿಂಗ್ಸ್, ಫಾರ್ಮಿಡಿಯಂ, ಸ್ಪಿಗೊನಿಮ ಮತ್ತು ಡೈಕೊಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಜಾತಿಗಳ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಮುಖ್ಯ ಭೂವಾಸಿಗಳಾಗಿವೆ. ಫಲವತ್ತಾದ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನಾಸ್ತಾಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೈಟೋನಿಮ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯ ಶೈವಲಗಳಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ತಿಳಿಯಾದ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಳಿಮಾಡದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೀಲಿಹಸುರು ಶೈವಲಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಸಾಗುವಳಿಯಾದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡ್ರೊಸ್ಪರ್ಮಂ ಮತ್ತು

ಅನಬೇನ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಉಳುಮೆಯಾಗದ ತೇವಯುಕ್ತ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಜ್ಜೆರೆಲ್ಲ ನಾಸ್ಪಾಕ್, ಟಾಲಿಪಾಥ್ರಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ವೆಟೋನಿಮ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಜೌಗಾದ ಸಾಗುವಳಿರಹಿತ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಅನಬೇನ ವೇರಿಯಬಿಲಿಸ್ ಹಾಗೂ ಕಾಲೋಥ್ರಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಮತ್ತು ನಾಸ್ಪಾಕ್ ಮಸ್ಕೊರಂಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಬತ್ತದ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ, ಉಷ್ಣವಲಯದ ಶುಷ್ಕ ಮತ್ತು ಉಷ್ಣ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ನೀಲಿಹಸುರು ಶೈವಲಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಶುಷ್ಕ ಕೊಚ್ಚಿಕೆಯಾದ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮರಳುಗಾಡು ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಶೈವಲ ಮತ್ತು ಶಿಲಾವಲ್ಯಗಳ ಹೆಕ್ಕಳಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬತ್ತದ ಬೆಳೆಯ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀಲಿಹಸುರು ಶೈವಲಗಳು ಪ್ರಧಾನ ಶೈವಲವರ್ಗವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸಿಂಗ್ (1961) ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಬತ್ತದ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೀಲಿಹಸುರು ಶೈವಲಗಳ ಅನೇಕ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಪನೋಥಿಸಿ, ಮೈಕ್ರೊಕಾಲೆನ್ಸ್, ಅಲೊಸಿರ, ಸ್ಕ್ವೆಟೋನಿಮ, ನಾಸ್ಪಾಕ್ ಮತ್ತು ಸಿಲಿಂಡ್ರೋಸ್ಪರ್ಮಂ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಮಳೆಗಾಲದ ಪ್ರಾರಂಭಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದವು. ಮುಂದೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕೆಸರುಮಾಡಿ ಕಲೆಸಿದಮೇಲೆ ಮೈಕ್ರೊಕಾಲೆನ್ಸ್, ಅನಬೇನ, ಸಿಲಿಂಡ್ರೋಸ್ಪರ್ಮಂ, ಟಾಲಿಪಾಥ್ರಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫಿಜ್ಜೆರೆಲ್ಲಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡವು. ಅಲೊಸಿರ ಫರ್ಟಿಲಿಸ್ಸಿಮ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಶೈವಲ ಪ್ರಭೇದವಾಗಿದ್ದು, ಅದು ತುಂಬ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಯಿತು. ಇದು ಮುಂದೆ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಒಣಗುತ್ತ ಬಂದಂತೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಪದರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ, ತೆಳುವಾದ ಜಿಲ್ಲೆನಿನ್ನಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿತು.

ನೀಲಿಹಸುರು ಶೈವಲಗಳ ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಉಪಯೋಗ ಪಡೆಯಲು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿಷ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಣೆಮಾಡಿ ಬತ್ತದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಸೇರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅಲೊಸಿರ ಫರ್ಟಿಲಿಸ್ಸಿನಿಯ ಮತ್ತು ಟಾಲಿಪಾಥ್ರಿಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸಿಸ್‌ಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬೆಳೆಸಿ, ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ರೀತಿ ಶೈವಲಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಬತ್ತದ ಇಳುವರಿಯಲ್ಲಾದ ಹೆಚ್ಚಳದ ದಾಖಲೆಗಳು ಶೇಕಡಾ 5ರಿಂದ 30ರ ಹರವಿನವರೆಗಿದೆ.

ಶೈವಲಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಳಕು ಮುಕ್ತಮಾಜೀವಿಗಳು; ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಬೆಳಕಿಲ್ಲದೆಯೇ ಸಾಪಯವ ಮುಕ್ತಮಾಜೀವಿಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಅಂಥವು ತೇವ ವಿರುವ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿಯುಡಬ್ಬ, ರಂಧ್ರಮಯವಾದ, ಸುಣ್ಣಯುಕ್ತ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ವಿಪುಲವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಶೈವಲಗಳು ತಟಸ್ಥದಿಂದ ಕ್ಷಾರತೆಯುಳ್ಳ ತೇವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಪ್ರಾಯಶಃ ಸಿಂಗ್ (1950) ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಉತ್ತರ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀಲಿಹಸುರು ಶೈವಲಗಳು ಬೆಳೆದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣುಶೈವಲಗಳು ಶುಷ್ಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾದವು. ಒಣಹವೆಯಲ್ಲಿ ಶೈವಲಗಳು ಒಣಗಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗುತ್ತವೆ; ಆದರೆ, ಮಳೆಗಾಲ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಕೂಡಲೇ ಅವು ಸಂತಾನವೃದ್ಧಿಗೊಂಡು ವಿಪುಲವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಶೈವಲಗಳು ತಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತಂತುಗಳನ್ನು ನಿಕಟವಾಗಿ ಹೊಡೆಗೊಂಡು ಸಂದರ್ಶಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೋರ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಲೋಳೆಯ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗಳಿಂದ ಅತೀದ ಶುಷ್ಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಡೆದುಕೊಂಡು ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಶೈವಲ ಲೋಳೆಯು ತನ್ನ ಗಾತ್ರಕ್ಕಿಂತ 10-15 ಪಟ್ಟು ನೀರನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಶೈವಲಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ; ಏಕೆಂದರೆ, ಶುಷ್ಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯು ಅಲ್ಪಕಾಲದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಿದ್ದು ನೀರಾಪೂರೈಕೆಯು ಪರಿಮಿತವಾಗಬಹುದು. ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶೈವಲಗಳು ಜೀವದ್ರವ್ಯ ಪರಿಣಾಮ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಶೈವಲ ಲೋಳೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕ ತೇವಾಂಶ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಶೈವಲಗಳು ಒಣಹವೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಶೈವಲಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವಿಕೆಯ ಒಂದು ಉಪಯುಕ್ತ ಪರಿಣಾಮವು ಇದರಿಂದಾಗಿಯೇ ಇರಬಹುದು.

ಅಧ್ಯಾಯ 5

ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಾಣುಗಳು

ವಿಷಾಣುಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮಮಾಪಕ ಯಂತ್ರದಲ್ಲೂ ಕಾಣದಿರುವಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಕಣಗಳು. ಅವು ಅಕೋಶಿಕ ಜೈವಿಕ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಜೀವಿಗಳು ಒಳಗೆ ಕೇಂದ್ರಕಾವ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಸುತ್ತಲು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಲೇಪನ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅವು ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಡಿಎನ್‌ಎ ಅಥವಾ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಗಳಲ್ಲೊಂದು ಕೇಂದ್ರಕಾವ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಸ್ಯವಿಷಾಣು ಗಳು ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಯನ್ನೂ ಪ್ರಾಣಿವಿಷಾಣುಗಳು ಡಿಎನ್‌ಎಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ; ಆದರೆ, ಈ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಆವಾದಗಳಿಲ್ಲವೆಂತಲ್ಲ. ಇವು ಬದ್ಧ, ಒಳಕೋಶೀಯ ಪರೋಪಜೀವಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಮನುಷ್ಯ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಸಸ್ಯಗಳು, ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳನ್ನು ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಖಂಡಿಸುತ್ತವೆ. ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಮತ್ತು ಶೈವಲ ಸೋಂಕುಕಾರಿ ವಿಷಾಣುಗಳು ಇವೆ. ಅವು ಅತಿಥೇಯ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಸೋಂಕಿ. ಅದರ ಆಹಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಆ ಕೋಶ ವನ್ನು ಲಯಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಷಾಣುಸೋಂಕುಕೃತ್ತಿದ ಕೋಶವೊಂದರಲ್ಲಿ 10ರಿಂದ 100 ರವರೆಗೆ ಈ ವಿಷಾಣುಕಣಗಳಿರಬಹುದು. ಏಕಾಣುಗಳನ್ನು ಸೋಂಕುವ ವಿಷಾಣು ಗಳಿಗೆ ಏಕಾಣುಜೀವಿ ಭಕ್ಷಕಗಳೆಂದು ಹೆಸರು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಕೇವಲ ಭಕ್ಷಕ ಗಳೆಂದೂ ಕರೆಯುವುದುಂಟು. ವಿಷಾಣುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅತಿಥೇಯಾಪೇಕ್ಷಿ ಗಳು. ಅನೇಕವಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅತಿಥೇಯವಿದ್ದರೆ, ಉಳಿದವು ಅನೇಕ ಅತಿಥೇಯಗಳನ್ನು ಸೋಂಕಬಹುದು.

ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ವಿಷಾಣುಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ; ಆದರೆ, ಇವು ಗಳನ್ನು 'ಮಣ್ಣು ವಿಷಾಣುಗಳು' ಎಂದು ಕರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಬಹುತೇಕ ವಿಷಾಣುಗಳಲ್ಲಿ

ಕೆಲವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಸಸ್ಯಗಳು, ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗೋತ್ಪತ್ತಿಯುಂಟುಮಾಡುವ ವಿಷಾಣುಗಳು ಮಾಣ್ಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಖನಿಜ ಕಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಪದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಮಂದಗಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಜೀವಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಂಥ ಜೈವಿಕ ಅತಿಘೇಯಗಳೊಳಗೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಬದುಕುತ್ತವೆ. ವಿಷಾಣುಗಳು ಮಾಣ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ಅತಿಘೇಯಗಳಿಲ್ಲದೆಯೇ ವಾಸಿಸಬಲ್ಲವಾಗಿದ್ದು ಸೋಂಕುಕಾರಕತೆಯನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲವರೆಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತವೆಯೆ ವಾದ ವಿದ್ವರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರದರ್ಶನವೇನೂ ಇಲ್ಲ.

ವಿಷಾಣುಗಳು, ಸೋಂಕುವಾಹಕಗಳು ಮತ್ತು ಅತಿಘೇಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿಲ್ಲ. ಮಾಣ್ಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಷಾಣುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಅತಿಘೇಯ ಏಕಾಣುಜೀವಿ ಪ್ರಭೇದಗಳಿದ್ದಾಗ ಏಕಾಣುಜೀವಿಭಕ್ಷಕ ವಿಷಾಣುಗಳಿರು ವುದು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ರೈಜೋಬಿಯಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುವ ಭಕ್ಷಕಗಳು ದ್ವಿದಳಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆಗಳಿರುವ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಆಕ್ಸಿನೊ ಮೈಸೀಟ್ ಪ್ರಭೇದಗಳಿರುವ ಮಾಣ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿನೋಭಕ್ಷಕಗಳಿರುವುದು (ಆಕ್ಸಿನೋಫೇವ್) ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಕೆ.ಎನ್. ಶೆಟ್ಟಿ ಬತ್ತದ ಬೆಳೆಗೆ ಆಗಲೇ ಏಕಾಣುಜೀವಿ ಕಾದಿಗೆರೋಗ ಹತ್ತಿದ್ದ ಬತ್ತದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರುಗಳಿಂದ ಕ್ಷಾಂತೋಮೊನಾಸ್ ಒರೆಚೆ ಗಳಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅನೇಕ ವಿಷಾಣು ಭಕ್ಷಕಗಳನ್ನು ಬೇರೈದಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮಾಣ್ಡಿನಿಂದ ಭಕ್ಷಕಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಬೇರೈದಿಸಿದರೂ, ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಷಾಣು ಭಕ್ಷಕಗಳಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅತಿಘೇಯಗಳಾಗಿರುವ ಏಕಾಣುಜೀವಿ ಪ್ರಭೇದಗಳು ವಿಪುಲವಾಗಿರು. ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ವಿಷಾಣುಭಕ್ಷಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಾಣ್ಡಿನಲ್ಲಿರುವ ರೋಗಕಾರಕ ಹಾಗೂ ರೋಗಕಾರಕವಲ್ಲದ ಅತಿಘೇಯ ಏಕಾಣುಜೀವಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕ್ರಮಗೊಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ವಿಷಾಣುಭಕ್ಷಕಗಳು ಗಣನೀಯ ಪಾತ್ರವಹಿಸುವುದೇ ಎಂಬುದು ಸಂದೇಹಾಸ್ಪದ. ಮಾಣ್ಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಸ್ಯ ರೋಗಕಾರಕಗಳನ್ನು ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕೃತಕ ಭಕ್ಷಕಗಳನ್ನು ಮಾಣ್ಡಿಗೆ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಜೈವಿಕವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಫಲವಾಗಿಲ್ಲ.

ಆಲ್ಪಿಡಿಯಂ ಬ್ರಾಸ್ಸಿಕೇಯಂಥ ಪೈಟಿಡಿಯ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಮಣ್ಣು ವಿಷಾಣುಗಳ ಸೋಂಕುವಾಹಕಗಳಾಗಿ ಲೆಬ್ಯೂಸ್ ಸೊಪ್ಪಿನ ಗಂಟುನಾಳರೋಗ, ಹೊಗೆಸೊಪ್ಪಿನ ಅಳಿಗೊಳಿತ(ನೆಕ್ರೋಸಿಸ್)ರೋಗ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುರಿತ

ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಂಥ ರೋಗಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತವೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಕ್ಲಿಫೇನೇನಿಯಂ, ಲಾಂಜೆಡೊರಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೈಕೊಡೊರಸ್ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಮಣ್ಣು ನೆಮಟೋಡುಗಳು ಹೊಗಸೊಪ್ಪು ಉಂಗುರಚುಕ್ಕೆರೋಗ, ಟೊಮೆಟೊ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆರೋಗ, ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಮೊಸೆಯಿಕ್ ರೋಗ, ಬಟಾಣಿಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಕಂದುರೋಗ ಮತ್ತು ಹೊಗಸೊಪ್ಪು ಕೊಳೆರೋಗಕಾರಕ ವಿಷಾಣುವಾಹಕಗಳೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಅನೇಕ ಮಣ್ಣು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಮತ್ತು ನೆಮಟೋಡ್ ಜೀವಿಗಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ವಿಷಾಣುಗಳಿಗೆ ಅತಿಥೇಯಗಳಾಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೋಂಕುವಾಹಕಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಏಕಾಣುಜೀವಿಭಕ್ಷಕಗಳು ಉಗ್ರ ಭಕ್ಷಕಗಳಾಗಿದ್ದು ಅತಿಥೇಯ ಏಕಾಣುಜೀವಿಯನ್ನು ಸೋಂಕಿ ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಅತಿಥೇಯ ಏಕಾಣುವನ್ನು ಸೋಂಕುವ ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿಗೊಂಡು ಅತಿಥೇಯ ಕೋಶವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸದಂತಹ ಉಗ್ರ ಭಕ್ಷಕಗಳೂ ಇವೆ. ಇವಕ್ಕೆ 'ಸೌದ್ವ್ಯ ಭಕ್ಷಕ'ಗಳೆಂದು ಹೆಸರು. ಇಂಥ ಸುಪ್ತ ಭಕ್ಷಕಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ(ಪ್ರೊಫೇಜ್) ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಥೇಯ ಕೋಶದ ಒಳಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿರುವ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಲಯಜನಕ ಏಕಾಣು ಜೀವಿಗಳೆಂದು ಹೆಸರು. ಇಂಥ ಭಕ್ಷಕಗಳು ಅಪರೂಪವಾಗಿ ನಿರಂತರ ಲಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿತಿ ಯನ್ನು ತಾಳಿ, ಅತಿಥೇಯ ಕೋಶದಿಂದ ಪರಿಪಕ್ವ ಭಕ್ಷಕಗಳಾಗಿ ಹೊರಬೀಳುವಾಗ ಅವು ತಮ್ಮ ವಂಶವಾಹಿಕ(ಜೀನೋಮ್)ದಲ್ಲಿ ಅತಿಥೇಯ ಕೋಶದ ವಂಶವಾಹಿಕ (ಜೀನೋಮ್)ದ ಸ್ವಲ್ಪಾಂಶವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಅವು ಪುನಃ ಅದೇ ಏಕಾಣುಜೀವಿ ಪ್ರಭೇದದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಭೇದವನ್ನು ಸೋಂಕಿದಾಗ, ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಅತಿಥೇಯದ ವಂಶವಾಹಿಕ(ಜೀನೋಮ್)ವನ್ನು ಈ ಹೊಸ ಸೋಂಕಿತ ಕೋಶಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಇಂಥ ಭಕ್ಷಕಗಳು ಏಕಾಣುಜೀವಿಯ ಅದೇ ಪ್ರಭೇದಗಳ ವಿಭೇದಗಳ ನಡುವೆ ತಳಿ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಇಲ್ಲವೇ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಭೇದಗಳಲ್ಲಿಯ ವಿಭೇದಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಇಂಥ ತಳಿ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತೂರುಹಾಯಿಕೆ(ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಡಕ್ಷನ್) ಎಂದು ಹೆಸರು. ಈ ಬಗೆಯ ತೂರುಹಾಯಿಕೆಯಿಂದ, ಸ್ವೀಕಾರಕ ವಿಭೇದವು ಹೊಸ ಹುಟ್ಟುಗುಣಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಏಕಾಣು ಪ್ರಭೇದದ ವಿಭೇದಗಳ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲವೇ ಏಕಾಣುವಿನ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಿ ಪ್ರಭೇದಗಳ ವಿಭೇದಗಳ ನಡುವೆ ಅಂತಹ ವಂಶವಾಹಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಹೇಗೆಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣು ಏಕಾಣು ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ವಿಭೇದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ತೂರುಹಾಯಿಕೆ(ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಡಕ್ಷನ್) ವಿಷ್ಕರಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಲ್ಲ. ಉಗ್ರತೆಯಿಂದ ಸೌದ್ವ್ಯತೆ ಹಾಗೂ

ತದ್ವಿರುದ್ಧ ವಿಭೇದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಅನೇಕ ಸಸ್ಯರೋಗಕಾರಕ ಮಣ್ಣು ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಏಕಾಣುಜೀವಿ ವಿಭೇದಗಳು ಹೊಸ ಶಾರೀರಕ ಇಲ್ಲವೇ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಸಾಧುರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಏಕೆಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಅನುಕೂಲತೆ ಪಡೆಯುತ್ತವೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಇತರ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತವೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ಷಕಗಳ ಪಾತ್ರವು ಏನೆಂಬುದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅಭ್ಯಸಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕಾರಿನೆಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಡಿಫ್ಫೆರಿಯೇ ಉಗ್ರ ವಿಭೇದಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಜೀವಿವಶವನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅತಿಥೇಯ ಜೀವಕೋಶದ ವಂಶವಾಹಿಕದಲ್ಲಿ ಸುಷ್ಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಬೀಟ(ಪ್ರೊಫಾಜ್ ಬೀಟ) ಇರುವಿಕೆಯು ಜೀವಿವ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಜೀವಿವ ಉತ್ಪಾದನರಹಿತ ವಿಭೇದಗಳು ಅಂಥ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ(ಪ್ರೊಫಾಜ್) ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಸ್ಯರೋಗ ಕಾರಕ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭಕ್ಷಕಗಳ ನಡುವಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಅವಸ್ಥೆ(ಪ್ರೊಫಾಜ್) ಮತ್ತು ಉಗ್ರತೆಗಳ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸಿಲ್ಲ.

ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು

ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ನೆಮೆಟೋಡು, ಎರೆಹುಳು, ಚಪ್ಪಟೆಹುಳು, ಬಸವನ ಹುಳು, ಜರಿಗಳು, ಮಿಲ್ಲಿ ಪೀಡ್‌ಗಳು, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್‌ಟೈಲ್‌ಗಳು, ಮರಹೇನು, ಗಳು, ಗೆದ್ದಲ:ಗಳು, ಜೀರುಂಡೆಗಳು, ಇರುವೆಗಳು, ಪತಂಗಗಳು, ನುಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಜೇಡರಹುಳುಗಳು ಮುಂತಾದುವು ಸೇರುತ್ತವೆ. ಇವು ನೇರವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿಯಾಡುವಿಕೆ, ನೀರು ಬಸಿಯುವಿಕೆ, ಕಣರಚನೆ ಹಾಗೂ ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥ ವಿಭಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಬಸಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ ವೆಂದರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಕಸಕಡ್ಡಿ, ಎಲೆ ಮುಂತಾದ ಅದಶೇಷಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಳಪದರಕ್ಕೆ ಒಯ್ದು, ಮಿಶ್ರಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಬೆಳೆ ಉಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿನೊಡನೆ ಕೂಡುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಸಾವಯವ ಉಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ.

ಕೆಲವು ಮಣ್ಣು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ರೋಗವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಜಂತುಹುಳು(ನೆಮೆಟೋಡು)ಗಳು ಸಸ್ಯಜೀರುಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿ, ಬೇರುಗಂಟುಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ ಜೀರುಂಡೆಗಳು, ಇರುವೆಗಳು ಮತ್ತು

ಪತಂಗಗಳ ಮರಿಹುಳುಗಳು ಸಸ್ಯಬೀರುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ನೆಮೆಟೋಡುಗಳು, ನುಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್‌ಟೈಲ್‌ಗಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು, ಶೈವಲಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೋಜೋವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಸೂಕ್ಷ್ಮಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಣುಜೀವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕ್ರಮಗೊಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರವಹಿಸಬಹುದು.

ಗೆದ್ದಲುಹುಳುಗಳ ಮುಖ್ಯ ಆಹಾರ, ಸೆಲ್ಲುಲೋಸ್ ಪದಾರ್ಥಗಳು. ಗೆದ್ದಲುಗಳ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲುಲೋಸ್ ಉತ್ಪಾದಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಕಶಾಂಗಿ ಪ್ರೋಟೋಜೋವುಗಳು, ಗೆದ್ದಲು(ಗೆಜ್ಜಲು)ಗಳ ಕರುಳುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಗೆದ್ದಲುಗಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ತಂತುಗಳು, ಇರುಪ್‌ಗಳು, ಹುಂಬಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ನಿರುಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಹ ತಿನ್ನುತ್ತವೆ; ಆಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಬಿಲಿಠೋಡಿಕೆ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿಯಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಕೆಳಮಣ್ಣನ್ನು ಮೇಲ್ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಉಳಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ, ತನ್ಮೂಲಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ಜಟಿಲವೆಚ್ಚೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಜೀವಿಗಳು, ತಾವು ಆಹಾರವನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತವೆ; ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳು ವಿಕಾಣುಜೀವಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ತಕ್ಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಮಲಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಪುನಃ ಎರೆಹುಳುಗಳು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಅವು ಸಸ್ಯಗಳ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನೂ ಖನಿಜ ಮಣ್ಣನ್ನೂ ಜೀರ್ಣಿಸಿ ನುಣ್ಣಿನೆಯ ಕಣರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಹಾಕುತ್ತವೆ. ಈ ಕಣಗಳು ಅಮೋನಿಯ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇಂಥ ತಳಪಡಿಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ನೆಲೆಸುತ್ತವೆ. ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೃದು ಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಕ್ರಮಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚು ಗಡುಸಾದ ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಿಂದು ಜೀರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಬರುವ ಮಲರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಶಃ ನುಣ್ಣಿನೆಯ ಕಣಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಅನುವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿವರ್ಗ, ಮಧ್ಯಮ ಜೀವಿವರ್ಗ ಮತ್ತು ಹೆಜ್ಜೇವಿ ವರ್ಗ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವುಗಳ ಗಾತ್ರದ ಮೇಲೆ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕ ಯಂತ್ರದಿಂದ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಪ್ರೋಟೋಜೋವುಗಳು, ಚಿಕ್ಕ ನೆಮೆಟೋಡುಗಳು ಮತ್ತು ನುಸಿಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳು

200 ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರಿಗಿಂತ ಕಡಮೆ ಉದ್ದವಿರುತ್ತವೆ. ಬಹುತೇಕ ನೆಮೆಟೋಡುಗಳು, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್‌ಟೈಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ನುಸಿಗಳು 200 ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರುಗಳಿಂದ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಹರವಿನೊಳಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಪುಷ್ಯಪು ಜೀವಿಪರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಎರೆಹುಳುಗಳು, ಜರಿಗಳು, ಮಿಲ್ಲಿಪೀಡ್‌ಗಳು, ಬಸವನ ಹುಳುಗಳು ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ದವಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚೇವಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತವೆ.

ಅಧ್ಯಾಯ 6

ಸಾವಯವ(ಸೇಂದ್ರಿಯ)ವಸ್ತುಗಳ ವಿಭಜನೆ-ತಳಪಡಿಗಳ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಸ್ಯವರ್ಗಗಳು

ಕಿರಣ ಸ್ವಪೋಷಿತ(ಕಿರಣ ಮಾಧ್ಯಮಜೀವಿ), ರಾಸಾಯನ ಸ್ವಪೋಷಿತ(ರಾಸಾಯನ ಮಾಧ್ಯಮ ಜೀವಿ) ಹಾಗೂ ಸಾವಯವ ಮಾಧ್ಯಮ ಜೀವಿ(ಇತರ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸುವವು)ಗಳು ಮಣ್ಣಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಸಸ್ಯವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಎರಡು ಜೀವಿಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ತೂಡುವ ಜೀವಿಗಳು. ಮೂರನೆಯ ಸಾವಯವ ಮಾಧ್ಯಮ ಜೀವಿಗಳು ವಿಭಜನ ಕ್ರಿಯಾ(ಕೊಳೆಯಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ) ಜೀವಿಗಳು. ಕಿರಣ ಸ್ವಪೋಷಿತ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನ ಸ್ವಪೋಷಿತ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸೇಂದ್ರಿಯ ವಸ್ತುಗಳ ಶೇಖರಣೆಯಾಗುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿಲ್ಲ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಹುಪಾಲು ಸಾವಯವ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ಸಸ್ಯಗಳಿಂದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಸತ್ತ ಪ್ರಾಣಿ, ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಅವಶೇಷಗಳು ಮಣ್ಣಿನ ಕೊಳೆತಿನ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ತಳಪಡಿಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಸಸ್ಯ ಉಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲು ಲೋಸ್, ಹೆಮಿಸೆಲ್ಲುಲೋಸ್ ಮತ್ತು ಲಿಗ್ನಿನ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಕೋಶಭಿತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳ ಹೊರಚಿಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಕೈಟಿನ್ ಎಂಬ ವಸ್ತುವಿಶೇಷವಿರುತ್ತದೆ; ಇದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್, ಕೇಂದ್ರಕಾಮ್ಲ, ಕೊಬ್ಬುಪದಾರ್ಥ (ಲಿಪಿಡ್)ಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳು

ಪ್ರಾಣಿ ಅಂಗಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಬಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆಗಳು, ಸಕ್ಕರೆ ಆಮ್ಲಗಳು, ಅಮೈನೋಗಳು ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಫೇಟ್‌ಗಳು, ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾವಯವ ಆಮ್ಲಗಳು ಸಹ ಕೋಶದ್ರವದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಸರಿಯಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಈ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಇಲ್ಲವೇ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಆಕ್ರಮಿಸುತ್ತವೆ.

ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸರಳ ಸಾವಯವ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದ್ದು ಅನೇಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡರೂ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣ ವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಲಭ್ಯ ಸರಳವಸ್ತು ಪ್ರಮಾಣವು ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದೆ.

ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್, ಹೆಮಿಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್, ಕೈಟಿನ್, ಲಿಗ್ನಿನ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯೂಮಸ್‌ಗಳೇ ಸಂಕೀರ್ಣ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿವೆ. ಸಸ್ಯಾವಶೇಷದ ಬಹುಪಾಲು ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಸ್ಯಾವಶೇಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಹೆಮಿಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಮತ್ತು ಲಿಗ್ನಿನ್.

ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಎಂಬುದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಎಂಬ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಪಾಲಿಮರ್ ಸರಪಳಿಗಳು. ಅನೇಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು, ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿನೊಮೈಸೀಟುಗಳು ಸೆಲ್ಯುಲೋಸನ್ನು ಅದರ ಮೊದಲಿನ ಸರಳ ಸ್ವಭಾವದ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸುತ್ತವೆ. ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೊಮೈಸಿಸ್, ಸೆಲ್ಯುಲೋಮೊನಾಸ್, ಸ್ಟೆಪ್ಟೋಫೇಗ, ಕ್ಲಾಸ್ಟಿಡಿಯಂ, ಬ್ಯಾಸಿಲ್ಲಸ್, ನೊಕಾರ್ಡಿಯ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೊಮೈಸಿಸ್ ಹಾಗೂ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪರ್ಜಿಲ್ಲಸ್, ಟ್ರೈಕೋಡೆರ್ಮ, ಪೆನಿಸಿಲ್ಲಿಯಂ, ಕೀಟೋನಿಯಂ, ಆಲ್ಬರ್ನೇರಿಯಂ, ಫ್ಯುಸೇರಿಯಂ, ರೈಜೊಪಸ್, ಪರ್ಟಿಸಿಲ್ಲಿಯಂ ಮತ್ತು ಜೈಗೊರೈನಸ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸನ್ನು ಸರಳವಸ್ತುವಾಗಿ ದಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತವೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸನ್ನು ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು ಆಕ್ರಮಿಸಿ, ನೆಲೆಯಾಗುವ ಜೀವಿಗಳೆಂದರೆ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳೇ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲಿಗೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಪದಾರ್ಥಗಳ ವಿಭಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ.

ಹೆಮಿಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಎಂಬುದು ಯೂರೋನಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಗಳ ಪಾಲಿಮರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಸೈಲೋಸ್, ಅರಾಬಿನೋಸ್, ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೋಸ್ ಮುಂತಾದ 5 ರಿಂದ 6 ಇಂಗಾಲ ಸಕ್ಕರೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಬ್ಯಾಸಿಲ್ಲಸ್,

ಸೆಲ್ಲೊ ಬಿಬ್ಲಿಯೊ, ಕ್ಲಾಸ್ಟಿಡಿಯಂ, ಸ್ಟೆಟೋಫೇಗ ಮತ್ತು ಸ್ಯೂಡೊಮೊನಾಸ್ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಅನೇಕ ಏಕಾಣು ಪ್ರಭೇದಗಳು ಹಾಗೂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯೆಯ, ಫ್ಯುಸೇರಿಯಂ, ಟ್ರೈಕೊಡರ್ಮ, ಆಪ್ತರ್‌ಜೆಲ್ಲಸ್, ಕೀಟೋನಿಯಂ, ಹೆಲ್ಮಿಂಟೊಸ್ಟೋರಿಯಂ ಮತ್ತು ಪೆನಿಸಿಲ್ಲಿಯಂ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಹೆಮಿಸ್ಪೊರೋಸನ್ನು ಒಡೆದು ಸರಳವಸ್ತುವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತವೆ.

ಲಿಗ್ನಿನ್ ಎಂಬುವುದು ಸಂಕೀರ್ಣ ಪಾಲಿಮರ್. ಅದರ ಮೂಲರಚನೆ ಒಂದು ತರಹ ಸುಗಂಧಯುಕ್ತ ಅಲಿಫಾಟಿಕ್ ಪಕ್ಕ ಸರಪಳಿಗಳುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ. ಜಲವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸಿರಿಂಗಾಲ್ಡಿಹೈಡ್, ಪಿ-ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಬೆಂಜಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಮುಂತಾದ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದು ಈ ರೀತಿ ವಿಭಜನೆಯಾಗುವುದು ಬಹಳ ನಿಧಾನ. ಆಗಾರಿಕ್, ಗ್ಯಾನೊಡರ್ಮ, ಪಾಲಿಪೋರಸ್ ಪೊರಿಯ ಮತ್ತು ಕೊಪ್ರಿನಸ್ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ನೂಕಾರ್ಥಿಯ ಮತ್ತು ಬೆಸಿಡಿಯೋಮೈಸೀಟ್ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಲಿಗ್ನಿನ್ನನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುತ್ತವೆ.

ಕೈಟಿನ್ ಎಂಬ ವಸ್ತುವು ಮನ್-ಅಸಿಟ್ಟೇಟ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಅಮೈನಿನ ಪಾಲಿಮರ್. ಬ್ಯಾಸಿಲ್ಲಸ್, ಸ್ಟೆಟೋಫೇಗ ಮತ್ತು ಸ್ಯೂಡೊಮೊನಾಸ್ ಜಾತಿಗಳ ಏಕಾಣು ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಮಾರ್ಟಿಯೆರೆಲ್ಲ, ಟ್ರೈಕೊಡರ್ಮ, ಆಪ್ತರ್‌ಜೆಲ್ಲಸ್, ಗ್ಲಿಯೋಕ್ಲಾಡಿಯಂ, ಅಬ್ಲಿಡಿಯ ಮತ್ತು ಪೆನಿಸಿಲ್ಲಿಯಂ ಜಾತಿಗಳ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಕೈಟಿನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಾಗಿವೆ.

ಅನೇಕ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಮೇಣಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಕ್ಯಾಟಿನ್ ಎಂಬುದು ಜಟಿಲವಾದ ಲಿಪಿಡ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸಸ್ಯಗಳ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲ್ಮೈ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಸ್ಯಭಾಗಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಟಿನ್ ರಚನೆಯ ಅಣುವಿನಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಹ್ಲಗಳಿದ್ದು ಅವು 16 ರಿಂದ 18 ಇಂಗೂಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಮೇಣ ಇವೆಲ್ಲ ವಿಭೇದವಾಗಿ, ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಹ್ಲಗಳು ಮತ್ತು ಮನ್ಯಸಾರಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಅಜಟೊಬ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಬ್ಯಾಸಿಲ್ಲಸ್ ಸ್ಟೆಫ್ಟೊಮೈಸಸ್ ಜಾತಿಗಳ ಅನೇಕ ಏಕಾಣು ಪ್ರಭೇದಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಟಿಯೆರೆಲ್ಲ, ರೋಡೋಟೋರಿಯಂ ಮತ್ತು ಪೆನಿಸಿಲ್ಲಿಯಂ ಜಾತಿಗಳ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಮಾಡುವ ಪಿರೇಸ್‌ಗಳಿಂದವಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೆರಾಟಿನ್ ಎಂಬ ವಸ್ತುವು ಒಂದು ಜಟಿಲವಾದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟೈನಿನ ಡೈ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಬಾಂಧುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಡೈ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಬಾಂಧ್

ಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ನಿರೋಧಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆರಾಟಿನೊಮೈಸಸ್. ಟ್ರೈಕೊಫೈಟಾನ್ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೊಸ್ಪೊರಂ ಜಾತಿಗಳ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಕೆರಾಟಿನನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುತ್ತವೆ.

ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳು ಅಮೈನೊ ಆಮ್ಲಗಳ ಪಾಲಿಮರ್‌ಗಳು: ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಲ್ಲಸ್, ಸ್ಯೂಡೊಮೊನಾಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೆವೊಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಜಾತಿಗಳ ಅನೇಕ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳು ಪ್ರೋಟೀನನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುತ್ತವೆ.

ಪೆಕ್ಟಿನ್ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಬಗೆಯ ಹೆಮಿಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್. ಇದು ಸಸ್ಯ ಜೀವ ಕೋಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ತೆಳ್ಳರೆಯ ಬಂಧಕವಸ್ತುವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಗ್ಯಾಲೆಕ್ಟ್ಯುರೋನಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಪಾಲಿಮರ್. ಅನೇಕ ಸಸ್ಯರೋಗಕಾರಕಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಯೂಡೊಮೊನಾಸ್ ಎರ್ಮಿನಿಯಂ ಜಾತಿಗಳ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪರ್ಟಿಸಿಲ್ಲಿಯಂ ಮತ್ತು ಫ್ಯುಸೇರಿಯಂ ಜಾತಿಗಳ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಪೆಕ್ಟಿನ್ ವಸ್ತುವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುತ್ತವೆ; ಇದಲ್ಲದೆ, ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಲ್ಲಸ್, ಕ್ಲಾಸ್ಟಿಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಸ್ಟೆಫ್ಟೊಮೈಸಸ್ ಜಾತಿಗಳ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳೂ ಸಹ ಪೆಕ್ಟಿನ್ನನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುತ್ತವೆ.

ಪಿಷ್ಟವು 1-4 ಆಲ್ಡಿ ಸೇರಿದ ಗ್ಲುಕೋಸ್‌ಯುಕ್ತ ಪಾಲಿಮರ್. ಇದನ್ನು ಕ್ಲಾಸ್ಟಿಡಿಯಂ, ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಲ್ಲಸ್, ನೊಕಾರ್ಡಿಯಾ, ಸ್ಟೆಫೊಮೈಸಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯೂಡೊಮೊನಾಸ್‌ನ ಅನೇಕ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಹಾಗೂ ಆಪ್ಟರ್‌ಜಿಲ್ಲಸ್, ಫ್ಯುಸೇರಿಯಂ ಮತ್ತು ರೈಜೊಪಸ್ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಜಲವಿಶ್ಲೇಷಣಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.

ಹ್ಯೂಮಸ್ ಎಂಬುದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಾವಯವ ಉಳಿಕೆವಸ್ತುವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಲಿಗ್ನಿನ್, ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್, ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಮೂಲ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಿಂದ ಹೊರೆಯದ ಫಿನಾಲ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ಉತ್ಪರ್ಷಕ ಅಣುಸಾಲು ಗಟ್ಟಿವಿಕೆ (ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಪಾಲಿಮರೈಜೇಷನ್) ಯಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅನೇಕ ಇತರ ಜಟಿಲ ಸಾವಯವ ವಸ್ತುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಭಾಸವಾಗಿ ಸರಳ ರೂಪಕ್ಕೆ ವಿಭಜಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಸ್ಟ್ರೊಮೈಸೀಟ್ ಮತ್ತು ಬೈಸಿಡಿಯೊಮೈಸೀಟ್ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಹ್ಯೂಮಸ್‌ನ ಹ್ಯೂಮಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಭಾಗವನ್ನು ವಿಭಜಿಸುತ್ತವೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಮಾನವಕೃತ ದರಮಾಣುಗಳು ವಾಣ್ಜನ್ಯ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಇವು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಾಲವಿರುತ್ತವೆ; ಆದರೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ

ಗಳು ವಿಭಜಿಸಿ ಸರಳ ರೀತಿಗೆ ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಜಗ್ಗಿದ (ಜಟಿಲ) ಪರಮಾಣುಗಳೆಂದು ಹೆಸರು. ಅನೇಕ ಪೀಡನಾಶಕಗಳು, ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಜಕಗಳು ಅಂಥ ಪರಮಾಣುಗಳಾಗಿವೆ. ಕ್ಲೋರಿನ್‌ಯುಕ್ತ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್‌ಗಳು(ಆಲ್ಕೈನ್, ಡಿಡಿಟಿ). ಆರ್ಗನೋಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು(ಪಾರಾ ಥಿಯಾನ್), ಫಿನಾಕ್ಸಿ ಮೂಲಿಕಾನಾಶಕಗಳು (2, 4, 5 ಟಿ). ಫಿನ್ಯೆಲ್ ಯೂರಿಯ (ಡೈಯುರಾನ್). ಟ್ರಿಯಜೈನ್ ಮೂಲಿಕಾನಾಶಕಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಟಾನ್ ಮುಂತಾದುವು ಅಂಥ ಕೆಲವು ಸಂಯುಕ್ತವಸ್ತುಗಳಾಗಿವೆ. ಇವು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬಹು ಕಾಲದವರೆಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಇವು ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳ ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಸಸ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಉಪಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.

ಅಧ್ಯಾಯ 7

ಸಾವಯವ ವಸ್ತುಗಳ ವಿಭಜನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಮಿಣ್ಣು ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಸಾವಯವ ಮತ್ತು ನಿರಪಯವ ವಸ್ತುಗಳು, ನೀರು ಮತ್ತು ಅನಿಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆಪ್ರತಿಮ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನೊದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಇಂಗಾಲ ಮತ್ತು ಖನಿಜಾಂಶಗಳು ಪರಿಮಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಸಾವಯವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿ ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಆ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗಾಲ ಮತ್ತು ಖನಿಜಾಂಶಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉತ್ಪಾದಕಗಳಾದ ಸಸ್ಯಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಸಾವಯವ ವದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಅವುಗಳ ಆಹಾರ ಸೇವನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಪುನರುತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆಹಾರ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಗೆ 3 ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನ ವಾಗುತ್ತವೆ. 1) ಇವು ಕೋಶ ಸಂಶ್ಲೇಷಣ ಕಚ್ಚಾವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. 2) ಇವು ವಿವಿಧ ಕೋಶ ಸಂಶ್ಲೇಷಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ(ಇಂಧನ)ಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳೆಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ಕಣದಾನಿಗಳು. ಅದಕಾರಣ ಅವು ಅಪಕರ್ಷಿತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. 3) ಇವು ವಿದ್ಯುತ್ಕಣ ಸ್ವೀಕಾರಕ ಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ವಿದ್ಯುತ್ಕಣ ಸ್ವೀಕಾರಕಗಳಾದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ಕಣದಾನಿ ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಕರ್ಷಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ವಿದ್ಯುತ್ಕಣದಾನಿ ಸ್ವೀಕಾರಕ ಸಂಬಂಧವು ಅಪಕರ್ಷಕ-ಉತ್ಕರ್ಷಕ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉತ್ಕರ್ಷಕ-ಅಪಕರ್ಷಕ

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ಕೋಶಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಕೊಡುತ್ತವೆ. ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶ ಲಭ್ಯವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಶಕ್ತಿದಾಯಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಿರಣಸ್ವಪೋಷಿತ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಮೃತಿಸಂಶ್ಲೇಷಕ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಶೈವಲಗಳು ಬೆಳಕನ್ನು ಶಕ್ತಿಮೂಲವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಎರಡು ವರ್ಗದ ಜೀವಿಗಳಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳು ಬಹುವಾಗಿ ಜಲಾವರಣದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಭೂ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅವು ಅಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಶೈವಲಗಳು ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಂಗ್ರಾಹಕಗಳಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೀಲಿಹಸುರು ಶೈವಲಗಳು ಸಾರಜನಕ ಸ್ವೀಕಾರಕಗಳಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವುದು; ಆದರೆ, ಪೋಷಕಾಂಶ ಪುನರ್ ಸಂವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳೆಂದರೆ ಸಾವಯವ ಮತ್ತು ನಿರವಯವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ಅಪಕರ್ಷಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರಜನಕವು ತುದಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ಕಣ ಸ್ವೀಕಾರಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಯುಪರ ಉಸಿರಾಟವೆಂದು ಹೆಸರು. ನಿರವಯವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕಡಯ ವಿದ್ಯುತ್ಕಣ ಸ್ವೀಕಾರಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಾಯುಪರ ಉಸಿರಾಟವೆಂದೂ ತುದಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ಕಣ ಸ್ವೀಕಾರಕಗಳು ಸಾವಯವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಹುದುಗುವಿಕೆ ಎಂದೂ ಹೆಸರು.

ವಾಯುಪರ ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಇಲ್ಲವೇ ನಿರವಯವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ಕಣದಾನಿಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸಾವಯವ ತಳಪಡಿಯುಳ್ಳ ವಾಯುಪರ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗಾಲಾಂಶವು ಭಾಗಶಃ ಕೋಶಮಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಭಾಗವು ಇಂಗಾಲ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ವಾಯುಪರ ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ಇಂಗಾಲ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ನೀರು ಮುಖ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರವಯವ ಅಂಶಗಳು ಉಪಉತ್ಪನ್ನಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಖನಿಜಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವಿಕೆಗೆ ಖನಿಜೀಕರಣವೆಂದು ಹೆಸರು. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಳಪಡಿಯ ಕೆಲಭಾಗ ಇಂಗಾಲಾಂಶ ಮತ್ತು ಖನಿಜ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೋಶ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದೇ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿಶ್ಚಲೀಕರಣ. ಖನಿಜೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಿಶ್ಚಲೀಕರಣ ವೇಗವು ಸಸ್ಯಬೆಳೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಸ್ಯಪೋಷಕಾಂಶ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು

ನಿಶ್ಚಿತಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಖನಿಜೀಕರಣ ವೇಗವು ನಿಶ್ಚಲೀಕರಣಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ಖನಿಜ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಂಗ್ರಹಗೊಂಡು ಸಸ್ಯಬಳಕೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಶ್ಚಲೀಕರಣ ವೇಗವು ಖನಿಜೀಕರಣ ವೇಗಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾದರೆ, ಖನಿಜ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಶೋಷಣೆ ಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ನಡುವೆ ಪರಿಮಿತ ಖನಿಜಪೋಷಕಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಎಡಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳೇ ವಿಜಯಿಗಳಾಗಿ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಖನಿಜ ಪೋಷಕಾಂಶ ಪೂರೈಕೆಯು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ.

ನಿರವಯವ ತಳಪಡಿಯಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಾಯುಪರ ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ NH_4 , NO_2 , H_2S , S ಮತ್ತು S_2O_3 ಯಂಥ ಅಪಕರ್ಷಿತ ನಿರವಯವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ಯಣು ದಾನಿಗಳಾಗಿಯೂ ಇಂಗಾಲ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಂಗಾಲಮೂಲವಾಗಿಯೂ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಯೂ ತುದಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ಯಣು ಸ್ವೀಕಾರಕವು ಆಮ್ಲಜನಕವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಸ್ಯಪೋಷಕಾಂಶದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪಾಪತ್ವವುಳ್ಳ ಎರಡು ಗುಂಪಿನ ರಾಸಾಯನ ಸ್ವಪೋಷಿತ (ಕೆಮೊಲಿಥೊಟ್ರೋಫಿಕ್) ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳೆಂದರೆ ಸಾರಜನಕ ಸ್ವೀಕಾರಕ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಗಂಧಕ ಉತ್ಪರ್ಷಕ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳಾಗಿವೆ.

ಸಾವಯವ ತಳಪಡಿಯುಳ್ಳ ವಾಯುಪರ ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿಯೂ ಇನ್ನಿತರ ಪರಿಣಾಮಗಳೆಂದರೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಖನಿಜ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ. ಕೆಲವು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಲಯಕ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳು ಅಮೈನೊ ಆಮ್ಲಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅಮೈನೊ ಆಮ್ಲಗಳು ಉತ್ಪರ್ಷಕ ಮತ್ತು ಅನುತ್ಪರ್ಷಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಅಮೈನ್ ಕಳೆತಗೊಂಡು ಅಮೋನಿಯಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಧಕವುಳ್ಳ ಅಮೈನೊ ಆಮ್ಲವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಯೂರಿಯಾವು ಜಲವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೊಂಡು ಅಮೋನಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಂಗಾಲಾಮ್ಲವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಾವಯವ ಸಾರಜನಕ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು, ಪೆಪ್ಟೋನ್, ಆಕ್ಸೈಮ್‌ಗಳು ಮುಂತಾದುವನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಪೋಷಿತ ಸಾರಜನಕೀಕಾರಕಗಳಿಗಿಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಅಕ್ರಮಿಸುತ್ತವೆ. ಇಂಥ ಆಕ್ರಮಣದಿಂದ ಅಮೋನಿಯಾ, ನೈಟ್ರೈಟ್ ಮತ್ತು ನೈಟ್ರೇಟ್‌ಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಸಾವಯವ ರಂಜಕ ವಿಸ್ಫರ್‌ಗಳು, ಅನೇಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಜಲವಿಶ್ಲೇಷಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ನಿರವಯವ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ವಿದ್ಯುದ್ವಾಹಿಣಿಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ನಿರ್ವಾಯುಪರ ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ NO_3^- ಮತ್ತು SO_4^{2-} ಸಂಘ ನಿರವಯವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ತುದಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ಕಣ ಸ್ವೀಕಾರಕಗಳಾಗಿ ಬಳಕೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಸಾವಯವ ಮಾಧ್ಯಮ ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನ ಸ್ವಪೋಷಿತ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಈ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ತುದಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ಕಣ ಸ್ವೀಕಾರಕಗಳಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪರಮಾಣು ಸಾರಜನಕ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫೈಡ್‌ಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ.

ಹುದುಗುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಪರಮಾಣುಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ಕಣದಾನಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವೀಕಾರಕಗಳಾಗಿ ವಿರಡೂ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ನಿಖರ ನಿರ್ವಾಯುಪರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಾವಯವವನ್ನು ವಿಭಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇನೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹುದುಗುಕಾರಕ ಜೀವಿಗಳು ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ಉತ್ಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ; ಆಗ ಅನೇಕ ಸಾವಯವ ಆಮ್ಲಗಳು ಮತ್ತು ಮದ್ಯಸಾರಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸಾವಯವ ಆಮ್ಲಗಳು ಅನೇಕ ಕರಗಲಾಗದ ನಿರವಯವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಾದ ಫಾಸ್ಫೇಟ್‌ಗಳು, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಲವಣಗಳೇ ಮುಂತಾದವನ್ನು ಕರಗುಂಟೆ ಮಾಡಿ, ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಆಮ್ಲಗಳು ಕಬ್ಬಿಣ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ತಾಮ್ರ, ಸತು (ಜಿಂಕ್) ಇತ್ಯಾದಿ ಕೆಲವು ನಿರವಯವ ವಿದ್ಯುದ್ರಾಹಿ ಕಣಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಂಜಿಡಿಸಿ, ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡುತ್ತವೆ. ಸಾವಯವ ಆಮ್ಲಗಳು ಮುಖ್ಯ ಶಿಥಿಲೀಕರಣ ನಿಯೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳಿಂದಾಗಿ ಬಂಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳಿಂದ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖನಿಜ ಘಟಕಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಸಸ್ಯಬಳಕೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ.

ಇಂಗಾಲ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕ ವೃತ್ತ

ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇಂಗಾಲವು ಬಹು ಮುಖ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಅಂಗಾಂಶಗಳ ಒಣಗಿದ ಘನತೂಕದ ಆಧಾರದಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 40-50ರಷ್ಟು ಇಂಗಾಲವು ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ಇಂಗಾಲದ ಮೂಲವನ್ನು ಶೋಧಿಸಿದರೆ, ಕಡೆಗೆ ಅದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಇಂಗಾಲ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ (ಇಂಗಾಲವು ಸುಣ್ಣು ಕಲ್ಲು, ಆಮ್ಲಿತ ಶಿಲೆ, ಹವಳದ ದಿಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿತ್ತದೆ. ಲಿಗ್ನೈಟು ಮತ್ತು ಪೀಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಗಾಲ ಮೂಲಧಾತು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲದಲ್ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಇಂಗಾಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ. ಈ ಇಂಗಾಲವು ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಕ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಇಂಗಾಲ ಮೂಲವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ 0.03 ಫನಮಾನ

ದಷ್ಟು ಇಂಗಾಲದ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಉತ್ಪರ್ಷಿತ ರೂಪದ ಇಂಗಾಲ ವಾಗಿದ್ದು, ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಪಕರ್ಷಿತ ರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಸಸ್ಯಜೀವಿಗಳು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 90 ಶತಕೋಟಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಇಂಗಾಲ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜುಮಾಡಲಾಗಿದೆ(ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ 16 ಶತಕೋಟಿ ಟನ್‌ಗಳಷ್ಟು ಇಂಗಾಲವನ್ನು ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ). ಈ ವೇಗದಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣದ ಇಂಗಾಲ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟರೆ, ವಾತಾವರಣ ದಲ್ಲಿರುವ ಇಂಗಾಲ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ 20 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಬರಿದಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಇಂಗಾಲ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ಪುನಃ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿರುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಅಲಗಗಳ ವಹನದಿಂದಲೂ ಸಹ ಇಂಗಾಲ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಗಾಲ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳ ಉಸಿ ರಾಟ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಸಸ್ಯವರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ ಕೂಡ ಉಸಿರಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಆವಗಳಿಂದಾಗುವ ಇಂಗಾಲ ಕೊಡುಗೆ ಬಹಳ ಕಡಮೆ. ಇಂಗಾಲ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕಾದರೆ, ಜೊತೆಗೆ. ಅಮ್ಲಜನಕವೂ ಈ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು. ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ (ಇಂಗಾಲ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ) ಅಮ್ಲಜನಕವು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗು ತ್ತದೆ. ಉಸಿರಾಟ ಮತ್ತು ವಹನ ಕ್ರಿಯೆ (ಇಂಗಾಲ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಿಡುಗಡೆ)ಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಮ್ಲಜನಕ ಅವಕರ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲವು ಇಂಗಾಲ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗುವ ಜೈವಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ಅನೇಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಸಂಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ವಾಯುಪರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಶೇಕಡಾ 20-40ರಷ್ಟು ಇಂಗಾಲವನ್ನು ಅರಗಿಸಿಕೊಂಡು ಉಳಿದ ಭಾಗವನ್ನು ಇಂಗಾಲ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡುತ್ತವೆ. ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ತಳಪಡೆ ಇಂಗಾಲಾಂತದ ಶೇಕಡಾ 30-40 ಭಾಗವನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಂಗಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವದ್ರವ್ಯ ಪರಿಣಾಮಗೊಳಿಸಿ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಂಡು ಉಳಿದ ಭಾಗವನ್ನು ಇಂಗಾಲ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಬಿಡು ತ್ತವೆ. ವಾಯುಪರ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳು ಶೇಕಡಾ 5-10ರಷ್ಟು ಇಂಗಾಲವನ್ನು ಅರಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಮಿಕ್ಕದ್ದನ್ನು ಇಂಗಾಲ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ವಿಸರ್ಜಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳು ಸಾವಯವ ವಸ್ತುವಿನ ವಾಯುಪರ ವಿಭಜನೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಗಾಲ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ

ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿರ್ವಾಯುಪರ (ಹುದುಗುವಿಕೆ) ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಏಕಾಣು ಜೀವಿಗಳು ಕೋಶವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಜೀವದ್ರವ್ಯ ಪರಿಣಾಮಗೊಂಡ ತಳವಡಿಯ ಇಂಗಾಲದ ಶೇಕಡಾ 2-5 ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮಿಕ್ಕ ತಳವಡಿ ಇಂಗಾಲವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಾವಯವ ಆಮ್ಲಗಳು ಮತ್ತು ಮದ್ಯಸಾರ ಮುಂತಾದ ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಅಂಶವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತವೆ. ಹುದುಗುವಿಕೆ ಜೀವ ದ್ರವ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಅತ್ಯಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಂಗಾಲ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ಸಾವಯವ ವಸ್ತುಗಳು ಬಹುವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಮಲ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳ ಉಳಿಕೆಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಸ್ಯಗಳ ಉಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಸೆಲ್ಲುಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸಸ್ಯ ಉಳಿಕೆಯ ಒಣ ತೂಕದ ಶೇಕಡಾ 15ರಿಂದ 60ರಷ್ಟು ಭಾಗವಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಮಿಸೆಲ್ಲುಲೋಸ್ ಸಸ್ಯ ಉಳಿಕೆಯ ಒಣ ತೂಕದ ಶೇಕಡಾ 10ರಿಂದ 30ರಷ್ಟು ಲಿಗ್ನಿನ್ ಶೇಕಡಾ 5ರಿಂದ 30ರಷ್ಟು, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಶೇಕಡಾ 5ರಿಂದ 30ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಖನಿಜ (ಬೂದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಖನಿಜಾಂಶಗಳು) ವಸ್ತುಗಳು ಶೇಕಡಾ 1-13ರಷ್ಟು ಇರುತ್ತವೆ. ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತಾ ಬಂದಂತೆಲ್ಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ವಸ್ತುಗಳು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಖನಿಜಾಂಶಗಳು ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಬಂದು ಸೆಲ್ಲುಲೋಸ್, ಹೆಮಿಸೆಲ್ಲುಲೋಸ್ ಮತ್ತು ಲಿಗ್ನಿನ್ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಶೇಕಡಾ ಪ್ರಮಾಣವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.

ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರುವ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಾವಯವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಬಹುಮುಖ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಶಾಲಿಗಳು; ಎಂದರೆ, ಅವು ಅನೇಕ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಸಂಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುತ್ತವೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ತಳವಡಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೊಮೈಸೆಸ್ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಸಕ್ಕರೆಗಳು, ಅಮೈನೊ ಆಮ್ಲಗಳು, ಸಾವಯವ ಆಮ್ಲಗಳು, ಸುಗಂಧ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಮೇದಸ್ಸುಯುಕ್ತ ಸಂಯುಕ್ತವಸ್ತುಗಳಂಥ ಸಂಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳ ವ್ಯಾಪಕವನ್ನೇ ಬಳಸಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸೆಲ್ಲುಲೋಸ್‌ನೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಆಕ್ರಮಣಮಾಡುವ ಏಕಾಣುಜೀವಿ ಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಗುಂಪಿನವಾಗಿವೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳು ಕೇವಲ ಒಂದು ಇಲ್ಲವೇ ಎರಡು ನಿರವಯವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಲ್ಲವು. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಅನೇಕ ಸಾವಯವ ಮತ್ತು ನಿರವಯವ ರೂಪಾಂತರಗಳಿಗೆ ಈ ಎರಡನ್ನೆಯ ಗುಂಪಿನವು ಇನ್ನೂ

ಹೆಚ್ಚು ದುಂಬಿವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ವಿಭಜಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆಯು ಬಹಳ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ಆದಾ ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ಶಕ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಈ ಶಕ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕ ದ್ರವ್ಯಗಳ ಬಂಧನವು ಖನಿಜರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶ ಬಿಡುಗಡೆ ವೇಗವು ಸಾವಯವ ವಸ್ತುಗಳ ವಿಭಜನೆಯ ವೇಗವನ್ನವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸಾವಯವವಸ್ತು ವಿಭಜನೆಯ ವೇಗವನ್ನು ಅಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ವಿಧಾನಗಳಿವೆ. ಮೊದಲಿನ ಉಳಿಕೆ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ಇಂಗಾಲಾಂಶ ನಷ್ಟ ಇಲ್ಲವೇ ತೂಕದಲ್ಲಿಯ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅಳತೆಮಾಡುವುದು ಒಂದು ವಿಧಾನ. ಸಾವಯವ ವಸ್ತು ವಿಭಜನೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದ ಆಮ್ಲಜನಕ ಮತ್ತು ಹೊರಬಿಟ್ಟ ಇಂಗಾಲ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳೆಯುವುದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನ. ಸಾವಯವ ಉಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಗ್ನಿನ್ ಇಲ್ಲವೇ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್‌ನಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಘಟಕಾಂಶವು ವಿಭಜನೆಯು ಮುಂದುವರಿದಂತೆ ಇಲ್ಲವಾಗುವ ವೇಗವೂ ಸಹ ವಿಭಜನೆಯ ವೇಗವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ 14C ಎಂದು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಸಾವಯವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಳಸಿ, ನಮೂದಿತ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ 14C ಚಟುವಟಿಕೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲವೇ ಹೊರಬರುವ ಇಂಗಾಲ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್‌ನ 14C ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುವುದಾಗಿದೆ.

ಸಾವಯವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳೆಂದರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಬಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆಗಳು, ಸಾವಯವ ಆಮ್ಲಗಳು. ಅಮೈನೊ ಆಮ್ಲಗಳು, ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಫಾಸ್ಫೇಟ್‌ಗಳು ಮುಂತಾದ ಸಂಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿವೆ. ಪಿಷ್ಟ, ಪ್ರೋಟೀನ್, ಕೊಬ್ಬು, ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್, ಹೆಮಿಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಮುಂತಾದ ಜಟಿಲ ವಸ್ತುಗಳು ಮುಂದೆ ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತವೆ. ಇನ್ನೂ ಜಟಿಲ (ಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ) ಪದಾರ್ಥಗಳಾದ ಲಿಗ್ನಿನ್ ಮುಂತಾದವು ಕೆಲಕಾಲ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನಿಧಾನವಾಗಿ ವಿಭಜಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ಮೊದಲಿನ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಇಂಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವು ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತ ಬರುತ್ತದೆ. 14C ಎಂದು ನಮೂದಿತವಾದ ಹುಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇಂಗಾಲದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿನ ನಷ್ಟವು ಮೊದಲಿನ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 60ರಷ್ಟು ದ್ವೈರವಹುವೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಇಂಗಾಲದ ನಷ್ಟವು ಶೇಕಡಾ 20ರಷ್ಟು ಇದ್ದು, ಮಿಕ್ಕ ಶೇಕಡಾ 20ರಷ್ಟು 4 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚುಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದಿದ್ದಿತು.

ಈ ವಿಭಜನೆ ವೇಗವು ಸೇಂದ್ರಿಯ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಾರಜನಕದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಶೇಕಡಾ 50ರಷ್ಟು ಇಂಗಾಲವೂ ಶೇಕಡಾ 50ರಷ್ಟು ಸಾರಜನಕವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು 10 ಭಾಗ ಇಂಗಾಲವನ್ನು ಅರಗಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಒಂದು ಭಾಗ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತವೆ. ದಾರುವುಳ್ಳ (ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವ) ಅಂಗಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 0.2 - 0.5ರಷ್ಟು ಸಾರಜನಕವಿರುತ್ತದೆ. ದ್ವಿವಳ ಧಾನ್ಯದ ಬೆಳೆಯ ಒಣಮಲ್ಲಿನಂಥ ಮತ್ತು ಅಂಗಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 1.5 ರಿಂದ 3.5ರಷ್ಟು ಸಾರಜನಕವಿರುತ್ತದೆ. ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 1.5 ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 2.5ರಷ್ಟು ಸಾರಜನಕವಿರುತ್ತದೆ. ಸಗಣೆ ಗೊಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 3ರಷ್ಟು, ಗೋಧಿ ಮಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 0.32ರಷ್ಟು, ಮರಗಳನ್ನು ಗರಗಸದಿಂದ ಕೊಯ್ದಾಗ ಬರುವ ಮರದ ಹೊಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 0.1ರಷ್ಟು, ಒಣರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 11ರಷ್ಟು ಸಾರಜನಕವಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾರಜನಕವು ಸೇಂದ್ರಿಯ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ವಿಭಜನೆಯ ವೇಗವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾರಜನಕವು ಕಡಮೆಯಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ವೇಗದಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆಗೊಳ್ಳಲು ಅವಕ್ಕೆ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಸಾರಜನಕವು ಕಡಮೆ ಇರುವ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಹಾಕದೇ ಹೋದರೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ವಿಭಜನಾ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಸ್ಯವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸಾರಜನಕವು ದೊರಕದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಭಜನಾ ಕ್ರಿಯೆಯು ಸಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಇಂಗಾಲ:ಸಾರಜನಕ(C:N) ಪ್ರಮಾಣವು ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತ ಬಂದು ಕಡೆಗೆ 10:1 ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಾವಯವವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಅದೃಶ್ಯತೆಗಿಂತ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಸಾವಯವ ಸಾರಜನಕವು ಖನಿಜೀಕರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ; ಅದರ, ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೇಡವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಖನಿಜರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಳಿದು ಸಸ್ಯಬಳಕೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಗಾಲ:ಸಾರಜನಕ ಕಡಮೆಯಾಗಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು ಎಂದರೆ, ರಕ್ತದ ಪುಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಳಿತ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹಾಕಬಹುದು. ಈ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಾರಜನಕವು, ಕೂಡಲೇ ಸಸ್ಯವರ್ಗಗಳಿಗೆ ದಕ್ಕುತ್ತದೆ. ಇಂಗಾಲ:ಸಾರಜನಕ ಪ್ರಮಾಣವು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಂತರವು ಕಡಮೆಯಾಗುವವರೆಗೂ ವಿಭಜನಾ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಬೇಕು; ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕಬಹುದು.

ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು, ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳ ಮೂಲದ ಸಾವಯವ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಬೆರಸಿ, ರಾಶಿಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ತೇವಾಂಶ ಒದಗಿಸಿ

ಪವೆ ಸಂಚಾರವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಯುಪರ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಗ ವಿಭಜನೆಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ತತ್ಪಲವಾಗಿ ತೀಕ್ಷ್ಣಕಾವು (ಉಪ್ಪು) ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಪಸಹಿಷ್ಣು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿನೋಮೈಸೀಟಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಚಟುವಟಿಕೆಯುಳ್ಳವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ವಿಭಜಿಸಬಹುದು. ಆಗ ದುರ್ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ರೋಗಕಾರಕ ಸಸ್ಯ ವರ್ಗಗಳು ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾಂಫೋಸ್ಪಿ ಗೊಬ್ಬರವು ಪರಿಪಕ್ವವಾದಾಗ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮಸ್ ಅಂಶವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಧನ ವಿದ್ಯುದ್ವಾಹಿನಿ ವಿನಿಮಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಾಂಫೋಸ್ಪನ್ನು ಗುಡ್ಡೆಮಾಡುವಾಗ ಸಡಿಲವಾಗಿ ಗುಡ್ಡೆ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಾಳಿಯಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಇಂಗಾಲವು, ಇಂಗಾಲ ದೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಾರಜನಕವು ಅಮೋನಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಕಾಂಫೋಸ್ಪಿ ಹೃದ್ವತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಇಂಗಾಲ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಪಾರಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ನಾಶವಾಗುವಂತೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿನಿಮಾನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳಲು ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಡುವುದಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಭಜನೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿಯಾಡಲು ಹಾಗೂ ಕೊನೆ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅರೆಬರೆ ಗಾಳಿಯಾಡಲು ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಡುವುದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥ ವಿಭಜನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಾವಯವ ವಸ್ತುವಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುರಚನೆ, ಗಾಳಿಯಾಡುವಿಕೆ, ಉಷ್ಣಾಂಶ, pH ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಲಿಗ್ನಿನ್ ಎಂಬ ವಸ್ತುವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಉಳಿಕೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ವಿಭಜನೆಗೆ ಬಗ್ಗುವುದಿಲ್ಲ. ದಾರು ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಮರದ ಹೊಟ್ಟು ಬೇಗನೆ ವಿಭಜನಾ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಜಗ್ಗದಿರಲು ಕಾರಣ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಲಿಗ್ನಿನ್ ವಸ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಸಿಲಿಕೆಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳು ವಿಭಜನೆಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಬತ್ತದ ಮಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಲಿಕೆ ಎಂಬ ವಸ್ತುವಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಕ್ಷಾರದಿಂದ ತೊಳೆದ ಹೊರತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೊಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಲಿಗ್ನಿನ್ ಮತ್ತು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಸೇಂದ್ರಿಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಪೂರ್ವಚಿಕಿತ್ಸೆಗೊಳಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಬೇಗನೆ ಕೊಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾವಯವ ಉಳಿಕೆಗಳ ಕೊಳೆಯುವಿಕೆಗೆ ಪ್ರಭಾವಬೀರುವ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಎಷ್ಟು ನುಣ್ಣನೆ ಅರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂಬುದು ಒಂದಂಶ. ಅಖಂಡ ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ವಿಭಜನೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳು ನುಣ್ಣರೆತಗೊಳ್ಳು

ವುರಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ಅಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೇಲ್ವೈ ಪ್ರದೇಶ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವೇಗದ ವಿಭಜನೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತೇವಾಂಶವಿರುವುದು ಅವಶ್ಯ. ಶೇಕಡಾ 80-90ರಷ್ಟು ತೇವಾಂಶವಿದ್ದಾಗಲೂ ಸಹ ವಿಭಜನೆ ವೇಗ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬಾಧಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ತೇವಾಂಶವು ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ನಿರ್ವಾಯು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಲೆದೋರಿ ವಸ್ತುವು ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ಉತ್ಕರ್ಷಣೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮರ್ವಾಸನೆಯುಳ್ಳ ಅಮೈನೋಗಳು, ಸಾವಯವ ಆಮ್ಲಗಳು, ಮದ್ಯಸಾರಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಕರ್ಷಿತ ನಿರವಯವ ಗಂಧಕ ಮಿಶ್ರಣಗಳು ಅಂದರೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ (H_2S) ಮುಂತಾದುವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ; (H_2) ಮತ್ತು (CH_4) ಅನಿಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಪುನಃ ಪಾಯುಪರಸ್ಥಿತಿಯುಂಟಾದಾಗ ಈ ಕೆಲವು ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ಉತ್ಕರ್ಷಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ವಾಯುಪರ ಸೂಕ್ಷ್ಮಸಸ್ಯಗಳಿಂದಕೂಡಲೇ ಉತ್ಕರ್ಷಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿರ್ವಾಯುಪರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ಟಿಡಿಯಂ ಪ್ರಭೇದಗಳು, ಮಿಥೇನ್ ಉತ್ಪಾದಕ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಡೈಸಲ್ಫೊಮಿಬ್ರಿಯೊ ಮುಂತಾದುವು ಚಟುವಟಿಕೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. 30°ರಿಂದ 40°C ಉಷ್ಣಾಂಶವು ಸಾವಯವ ವಸ್ತುಗಳ ಲೀಫ್ಟ್ ವಿಭಜನೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಸೇಂದ್ರಿಯ ವಸ್ತುಗಳು ಲೀಫ್ಟ್ವಾಗಿ ಕೊಳೆಯುತ್ತವೆ. ಉಷ್ಣಾಂಶವು 5°C ಇರುವಾಗಲೂ ಸಹ ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಗಾಸೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯ ಕಡಮೆ ಉಷ್ಣಾಂಶವು ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ವಸ್ತು ರಚನೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಕಾರಣ, ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ ಪ್ರದೇಶದ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥವು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉಷ್ಣವಲಯದ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಂಗ್ರಹವು ಬಹಳ ಕಡಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉಷ್ಣವಲಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಉಷ್ಣಾಂಶವೂ ಆವ್ರತೆಯೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು, ಸಾವಯವ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಗನೆ ವಿಭಜನೆಯಾಗಿ ಬೇಗನೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆರಿಹೋಗಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಸಸ್ಯಗಳ ಉಳಿಕೆ (ಆವಶೇಷ)ಗಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿವರೂ ಈ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ವಸ್ತು ಅಂಶವು ಕಡಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತಟಸ್ಥತೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ pH ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾವಯವ ಉಳಿಕೆಗಳ ತೀವ್ರ ವಿಭಜನೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸಾವಯವ ಉಳಿಕೆಗಳು ಸೇರುವ ವೇಗವೂ ಸಹ ವಿಭಜನೆಯ ವೇಗದಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸಾವಯವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇರಿಸಿದಂತೆ, ಇಂಗಾಲ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಬರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶೇಕಡಾ ಇಂಗಾಲಾಂಶವು ಬಿಟ್ಟು ಇಂಗಾಲ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ, ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಾವಯವ ವಸ್ತು ವಿಭಜನೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಲಿನಿಂದ ಇರುವ ಹ್ಯೂಮಸ್ ವಸ್ತುಗಳು, ಇವು ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರಿದ ಸೇಂದ್ರಿಯ ವಸ್ತುಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ವಸ್ತುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗಾಲ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮಸ್ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ವಿವಿಜೀಕರಣವಾಗುತ್ತವೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಹಿತಕರ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ 5ರಿಂದ 50 ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಇಂಗಾಲ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಇದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ 300 ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗಳಷ್ಟು ಆಗಬಹುದು. 5ರಿಂದ 50 ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೊಮ್ಮುವುದೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ 10-100 ಕಿಲೋ ಗ್ರಾಮ್ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಸಂವಾದಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಸರಾಸರಿ 20 ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಗಳಷ್ಟು ಇಂಗಾಲ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಆಗ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ 2500 ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಗಳಷ್ಟು ಇಂಗಾಲ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಉಷ್ಣವಲಯ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ತೇವಾಂಶವಿರುವುದೇ ಆಗಿದೆ. ಇಂಗಾಲ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೊಮ್ಮುವಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಈ ಮೌಲ್ಯಗಳು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 2-5ರಷ್ಟು ಹ್ಯೂಮಸ್ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಸಿಪ್ಪವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಂವಾದಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮಣ್ಣನ್ನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದಲೂ, ಅಗಾಗ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕೆದಕುವುದರಿಂದಲೂ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಹ್ಯೂಮಸ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ (1961) ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಂತೆ 25 ವರ್ಷಗಳೂ ಬೆಳೆಯಿಟ್ಟ 28 ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥ ಸಾವಯವ ವಸ್ತುಗಳು, 3.29ರಿಂದ 1.43ರಷ್ಟು ಕಡಮೆ (ನಷ್ಟ)ಯಾದುವು ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಈ ನಷ್ಟವು ಮೊದಲಿನ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತ ಬಂದಿತು. ಮತ್ತೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಳುಮೆಯನ್ನೇ ಮಾಡದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರಣ್ಯ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿಯ ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥವು ಮುಂದೆ ಉಳುಮೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕೀವಲ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 2.3ರಿಂದ 1.59ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಿತು ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಸೇಂದ್ರಿಯ ವಸ್ತುಗಳು ಏನಿಜಾಂಶ

ರೂಪವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಟು ಹೊಂದುವುದು, ಆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಾವಯವ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸೇರದಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ವಸ್ತುಗಳು ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಂಗಾಲ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ವಿಭಜನೆಯಾಗುವ ಒಟ್ಟು ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಶೇಕಡಾಂಶವು ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಕಡೆದು ನಿಯತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸಾವಯವ ಉಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಹ್ಯೂಮಸ್ಸಿನ ಖನಿಜೀಕರಣ ವೇಗವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರಿಸುವ ಸಾವಯವ ಉಳಿಕೆಗಳ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು 14C ಪಟ್ಟಿ ನಮೂದಿತವಾದ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಸಾವಯವ ವಸ್ತು ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾವಯವ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ತೋರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಹೊರಬರುವ ಇಂಗಾಲ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್‌ನಲ್ಲಿಯ 14C ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಅಳಿಯುವುದರಿಂದ ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಾವಯವ ಉಳಿಕೆಯಿಂದ ಕೇವಲ ಇಂಗಾಲ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್‌ನ್ನು ಮಾತ್ರ 14 ಇಂಗಾಲ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಇದ್ದ ಸಾವಯವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾದ ಇಂಗಾಲ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್‌ಗೆ ನಮೂನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರಿಸಿದ ಸಾವಯವ ತಳಪಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಬಹುಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದೇ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇರಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳು ಇರುಜನಿತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ರಸ್ಥಗಳಿಗೆ ತಾಜಾಚೈತನ್ಯ ದಾಯಕ ತಳಪಡಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತವೆ.

ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಇತರೆ ಮಾರ್ಪಾಟುಗಳು ಎಂದರೆ ಉಷ್ಣಾಂಶ, ತೇವಾಂಶ, ಗಾಳಿಯಾಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು pHನಂಥ ಅಂಶಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಾವಯವ ವಸ್ತುಗಳ ವಿಭಜನೆಯ ವೇಗದಲ್ಲಾಗುವ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಾವಯವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತವೆ.

ಅಧ್ಯಾಯ 8

ಸಾರಜನಕ ಖನಿಜೀಕರಣ

ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕಿರುವ ಸಸ್ಯಪೋಷಕಾಂಶವೆಂದರೆ ಸಾರಜನಕ. ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಗಂಧಕ ಮತ್ತು ರಂಜಕಗಳೂ ಬೇಕು. ನಿವ್ವಳ ಖನಿಜೀಕರಣವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಸ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವು. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾರಜನಕದ ಬಹುಭಾಗ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಾವಯವ ದಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಾರಜನಕಾಂಶ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾವಯವ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಸಸ್ಯಗಳು ಬಹುತೇಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ನಿರವಯವ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದಕಾರಣ ಸಾವಯವ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ನಿರವಯವ ರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಮೋನೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಾರಜನಕೀಕರಣಗಳು ಈ ಪರಿವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಎರಡೂ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು. ಇದರಲ್ಲಿ, ಮೊದಲಿನದು ಸಾವಯವ ಮಾಧ್ಯಮ ಜೀವಿಗಳಿಂದಲೂ ಎರಡನೆಯದು ರಾಸಾಯನ ಸ್ವಪೋಷಿತ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಂದಲೂ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಸಾವಯವ ಸಾರಜನಕ ಖನಿಜೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲಗಳ ಖನಿಜೀಕರಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಈ ಎರಡೂ ಘಟಕಗಳು ಸಮಾನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಖನಿಜೀಕರಣ ಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅಮೋನೀಕರಣದಲ್ಲಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಇಂಗಾಲ ತಳಪಡೆಗಳ ಜೀವದ್ರವ್ಯ ಪರಿಣಾಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯರ್ಥವಸ್ತುವಾಗಿ $\text{NH}_4\text{-N}$ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ: ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದ ಅಧಿಕ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾವಯವ ಸಾರಜನಕದ ಬಹುಭಾಗವು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತ ಸಾರಜನಕವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 20-40 ಭಾಗವು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಹ್ಯೂಮಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳಾಗಿಯೂ ಶೇ. 5-10 ಭಾಗ ಗ್ಲುಕೋಸಮೈನ್‌ನಂಥ ಅಮೈನೋ ಸಕ್ಕರೆಗಳಾಗಿಯೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಿಕ್ ಆಮ್ಲಗಳ ಪ್ಯೂರೈನ್ ಹಾಗೂ ಪಿರಿಮಿಡೈನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಗಿಯೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಅಮೈನೋ ಸಕ್ಕರೆಗಳ ವಿಭಜನ

ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ $\text{NH}_4\text{-N}$ ಲಿಗ್ನಿನ್-ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಂಕೀರ್ಣವನ್ನು ವಿಛೇದಿಸಿ ಒಂದಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುವ ಸ್ಥಿರೀಕರಣವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಲಿಗ್ನಿನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎರಡನ್ನೂ ವಿಛೇದಿಸುವುದರಿಂದಾಗಿ ಖನಿಜೀಕರಣ ವೇಗವು ನಿಧಾನವಾಗುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯ ಉಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಬಲ್ಲ ಸಾರಜನಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಹ್ಯೂಮಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳು ಮತ್ತು ಅಮೈಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಸಾವಯವ ಸಾರಜನಕದ ಸ್ವಲ್ಪಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಖನಿಜೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಅಮೋನೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾವಯವ ಮಾಧ್ಯಮ ಏಕಾಣುವಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಕೇವಲ ಖನಿಜರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಅಮೋನಿಯಂವು ಮಾತ್ರ ಸಾರಜನಕೀಕರಣ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಂದ ನೈಟ್ರೇಟ್‌ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳಲು ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಸಾವಯವ ಮಾಧ್ಯಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಪ್ರೋಟೀನನ್ನು ಆಕ್ರಮಣಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಪೆಪ್ಟೈಡ್‌ಗಳಾಗಿಯೂ ಬಳಿಕ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳಾಗಿಯೂ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳು, ಉತ್ಪರ್ಷಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಉತ್ಪರ್ಷಣರಹಿತವಾಗಿ ಅಮೈನ್ ಕಳೆತಗೊಂಡ ಅಮೋನಿಯಂ ಮತ್ತು ಸಂವಾದಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಮ್ಲಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿಯೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾರಜನಕವು ಸಸ್ಯಬಳಕೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವುದೇ ಎಂಬುದು ಆ ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿರುವ ಇಂಗಾಲ : ಸಾರಜನಕ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನವಲಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಧ್ನ ಖನಿಜೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಇಂಗಾಲ : ಸಾರಜನಕ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕುರಿತು ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೇಸಾಯದ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರಜನಕವು ಕಡಮೆ ಇರುವ ಉಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಳೆಯುವ ಸಮೀಪವಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ, ಎರಡನೆಯ ಬೆಳೆಯು ಸಾರಜನಕ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತದೆ. ಸಮೀಪವಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸಾರಜನಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 2 ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 4ರಷ್ಟು ಭಾಗವು ಖನಿಜೀಕರಣಗೊಂಡು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ 70 ರಿಂದ 150 ಪೌಂಡು ಸಾರಜನಕವು ಹೂಮಸ್‌ನಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಉಷ್ಣವಲಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುತ್ತದೆ.

ಸಸ್ಯಗಳು ನೈಟ್ರೇಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಚ್ಛಿಸಿದರೂ ಸಹ ಅಮೋನಿಯಂ ಅಥವಾ ಸಾರಜನಕ ಅಥವಾ ಅಮೈಡ್ ರೂಪಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಪಡೆದು ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಸಾರಜನಕವು ಸಸ್ಯಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಸಾರಜನಕದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಾಗಿ ರೂಪಾಂತರ

ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಈ ಸಸ್ಯಗಳು ಮುಂದೆ ಸತ್ತುಹೋಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಆಹಾರವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು: ಅವು ಹೀಗೆ ಸುಧಾರಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಿಂದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಲರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಸ್ಯಗಳೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ ಮಣ್ಣಿಗೆ ತಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಅಥವಾ ದೇಹ ರಚನೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುತ್ತವೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಉಳಿಕೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಣಮಾಡಿ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಅಮೋನಿಯಂ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಪ್ರತಿ ಏಕಮಾನ ಅಮೋನಿಯಂವಿಲ್ಲೂ ಸುಮಾರು ಐದನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಅರಗಿಹೋಗಿ. ಉಳಿದ ನಾಲ್ಕು ನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವು ಸಸ್ಯಬಳಕೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಫ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳಂಥ ಸಾರಜನಕ ಸಂಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲಭ್ಯ ಸಸ್ಯ ಉಳಿಕೆಗಳೂ ಮೇಲಿನಂತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಈಡಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಭಾಗವು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿಯೆ ಹ್ಯೂಮಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ: ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪುನೋ ಆವುಗಳು, ಲಿಗ್ನಿನ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪುನೋ ಸಕ್ಕರೆಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ಮುಂದೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಆಕ್ರಮಿಸುವುದನ್ನು ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧಿಸುತ್ತವೆ: ಆದರೆ, ಹ್ಯೂಮಸ್ ಅಷ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರತಿರೋಧಕಾರಿಯಲ್ಲ. ಅದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊಸ ಸಾವಯವ ಉಳಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಸಾರಜನಕ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಹಾಕುವೆಯೇ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಗುರಿಯಿಲ್ಲದ ಬೆಳೆಯಡಲಾದ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ಕೊಳೆತು, ಅತ್ಯಂತ ಕೇಡುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಸತ್ತ ಕೋಶಗಳಿಂದಲೂ ಸಹ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹ್ಯೂಮಸ್ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅವಶೇಷಗಳು ಒಂದರೆ ಯೂರಿಯ, ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲ, ಅಮೋನಿಯಂ ಅಥವಾ ಇಂಗಾಲ-ಸಾರಜನಕಪ್ರಮಾಣವು 5:1 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಮೆಯಾಗಿರುವ ಸತ್ತ ಪ್ರಾಣಿ ಶರೀರಗಳು ಸೇರಿದರೆ, ಅಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಮಯವ ಇಂಗಾಲ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ಹ್ಯೂಮಸ್‌ನ್ನು ಜೀವಿದ್ರವ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಿ ಆ ಸಾರಜನಕ ಸಮೃದ್ಧ ಪ್ರಾಣಿ ಉಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಅಮೋನಿಯಂವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಗಾಳಿಯಾಡುವಿಕೆ, ತೇವಾಂಶ, pH ಮತ್ತು ಉಷ್ಣಾಂಶಗಳು. ಅಮೋನೀಕರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಪರಿಸರದ ಅಂಶಗಳು. ಅಮೋನೀಕರಣವು ವಾಯುಪರ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಾಯುಪರ ಸ್ಥಿತಿಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಜರುಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ವಾಯುಪರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಜನಾ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೋನಿಯಂ, ಇಂಗಾಲ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಸಾವಯವ ಆಮ್ಲಗಳು ಹಾಗೂ ಇಂಡೋಲ್, ಸ್ಕೇಟೋಲ್, ಮರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟಾನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೊಜನ್

ಸೆಪ್ಟೇಡ್‌ಗಳೇ ಮುಂತಾದ ದುರ್ದವಾಸನೆಯುಕ್ತ ಸಂಯುಕ್ತವಸ್ತುಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತವೆ. ನಿರ್ದಾಯುಪರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೋನಿಯಾ-ಸಾರಜನಕ ವಸ್ತುವು ಸೈಟ್ರೇಟ್ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಉತ್ಪರ್ಷಣೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ತಟಸ್ಥ (ಅತಿ ಹುಳಿಯೂ ಅತಿ ಕ್ಷಾರವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಸಮನಾಗಿರುವ) pH ಸ್ಥಿತಿಯು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅಮೋನೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ: ಅದ್ವಯುತ pH ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕುಗ್ಗುತ್ತದೆ. ಬಹುತೇಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ರೂಪಾಂತರಗಳೆಲ್ಲ 30° ರಿಂದ 40°C ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಮೋನೀಕರಣವು 40° ರಿಂದ 60°C ನಲ್ಲಿ ಚುರುಕಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ವಿಭಜನೆಯು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರದ ಗುಡ್ಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಮೋನೀಯ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನೂ ತಡೆಯಬಲ್ಲ ಉಷ್ಣಸಹಿಷ್ಣು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಭಾಗಿಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ನೈಟ್ರೇಟ್‌ಗಳಂತಲ್ಲದೆ, ಅಮೋನಿಯದ ಶೇಖರಣೆಯ ಹೆಚ್ಚಳವು ಸಾರಜನಕದ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ದಾರಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿಯೇ ಜೇಡಿ ಮತ್ತು ಹ್ಯೂಮಸ್ ಕಲಿಲಗಳು ಅಮೋನಿಯಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಚರಾಣುಗಳನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಂಡು ಒಳಸೋಸಿಕೆ ಇಲ್ಲವೇ ಅವೀಕರಣದಿಂದ ನಷ್ಟವಾಗದಿರುವಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಜೇಡಿ ಮತ್ತು ಹ್ಯೂಮಸ್‌ಗಳು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ನಷ್ಟವು ಗಣನೀಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಯೂರಿಯ ಜಲವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

ಯೂರಿಯವು ಸಾವಯವ ಸಾರಜನಕ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಯೂರಿಯಾಲಯಕ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳಿಂದ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಅಮೋನಿಯ ಮತ್ತು ಇಂಗಾಲದೈ ಆಕ್ಸೈಡ್‌ಗಳಾಗಿ ಜಲವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸ್ಪೋರೋಸಾರ್ಸಿನ ಯೂರಿಯ ಎಂಬ ಬೀಜಾಣು ರೂಪಿಕ ಕಾಕ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟಿಲ್ಲಸ್ ಪಾಸ್ಪುಯುರೈಗಳು ಮುಖ್ಯ ಯೂರಿಯಾಲಯಕ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳಾಗಿವೆ. ಯೂರಿಯಾ ಜಲವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಿಂದ ಅಮೋನಿಯಾ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣವು ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಷಾರಮಯವಾಗಿ (pH 11ರವರೆಗೆ) ಇತರ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾಲಯಕ ಏಕಾಣು ಜೀವಿಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಕ್ಷಾರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೊಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕ್ರಿಯೆಯು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅವು ಅಂಥ ಕ್ಷಾರ pH ಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ನೈಟ್ರೊಸೊಮೊನಾಸ್ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳು ಕ್ಷಾರ pH ಗಳಿಗೆ ಬಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವು; ಇವು ತಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿ, ಶೇಖರವಾಗಿದ್ದ ಅಮೋನಿಯವನ್ನು ಉತ್ಪರ್ಷಿಸಿ, ನೈಟ್ರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ವಿದ್ಯುತ್

ದ್ವಾಹಿತಕಣವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ, ನೈಟ್ರೇಟ್ ವಿಪವರಿಣಾಮದನ್ನಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯೂರಿಯಾಯಿಡ್ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳು ಯೂರಿಯಾ ಜಲವಿಶ್ಲೇಷಣ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ರಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಆಗಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಗಾಲ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಮೂಲವಾಗಿ ಪೆಪ್ಟೋಸ್ ಮತ್ತು ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳ ತಳಪದಿಯೇಕಾಗುತ್ತದೆ (ಇವು ನಿಷ್ಪವದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ). ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸೈನಮೈಡ್ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಸಾರಜನಕ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿದೆ. ಬೆಳೆಗಳು ಇದನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಅಂದರೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸೈನಮೈಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಸೈನಮೈಡ್ ಆಗಿ ಜಲವಿಶ್ಲೇಷಣಮಾಡಿ, ಬಳಿಕ ಯೂರಿಯಾ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಣುಜೀವಿಗಳಿಂದ ಆಗುವ ಪರಿವರ್ತನೆಯಲ್ಲ. ಯೂರಿಯಾವು ಇಂಗಾಲ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಅಮೋನಿಯಾ ಆಗಿ ಯೂರಿಯಾಯಿಡ್ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳಿಂದ ಜಲವಿಶ್ಲೇಷಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಸ್ವಪೋಷಿ ಸಾರಜನಕೀಕರಣ

ಸಾರಜನಕೀಕರಣ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳು ತಮ್ಮ ವಾಯುಪರ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ನಿರವಯವ ವಿದ್ಯುತ್ಕಣ ದಾನಿಗಳನ್ನೂ ಇಂಗಾಲಡೈಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ಇಂಗಾಲ ಮೂಲವಾಗಿಯೂ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸಾರಜನಕೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಂತಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಮೊದಲನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೊಸೊಮೊನಾಸ್ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಅಮೋನಿಯವನ್ನು ನೈಟ್ರೇಟಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಎರಡನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೊಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭೇದಗಳು ನೈಟ್ರೇಟನ್ನು ನೈಟ್ರೇಟಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಸ್ಲೆಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮುಂಚ್ಚಿ (1877) ಮೊಟ್ಟಮೊದಲಿಗೆ ಸಾರಾಜನಕೀಕರಣವು ಜೈವಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೆಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಇವರು ಮಣ್ಣನ್ನು ಬಚ್ಚಲು(ಮೋರಿ) ನೀರಿನಿಂದ ನೆನಸಿ, ಆ ಬಚ್ಚಲು ನೀರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಅಮೋನಿಯವು ನೆನಸಿದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಸ್ ನಂಥ ಸಂಜುರೋಧಕಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲವೇ ಮಣ್ಣನ್ನು ಬಿಸಿಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಾರಜನಕೀಕರಣವು ನಿಂತುಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು ; ಆದರೆ ಪುನಃ ತೋಟದ ಹಸಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ತಂದುಹಾಕುವುದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಯೆಯು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಸಾರಜನಕೀಕಾರಕ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳು ನಿಧಾನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯುಳ್ಳವು. ಅತ್ಯಂತ ಹಿತಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸದಾ ಅವು ವಿಭಜನೆಗೆ 10 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲಾವಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸಾರಜನಕೀಕಾರಕ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳು ದಂಡರೂಪದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಾಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸುರುಳಿಯಾದ ಆಕಾರದವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಆಕಾರ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಭೇದಗಳು ಪೂತಿಕೋಶಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳು

ತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಜಾಗ್ಗಿಯ ಎಂಬ ಲೋಳೆಯುಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

ಇವುಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಮೇಲೆ pH, ಗಾಳಿಸಂಚಾರ, ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಉಷ್ಣಾಂಶಗಳು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ pH ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ. pH 6.0ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಮೆ ಇದ್ದರೆ, ಸಾರಜನಿಕರಣ ವೇಗವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕುಗ್ಗುತ್ತದೆ. 7.5 ರಿಂದ 8.5 ರವರೆಗಿನ pH ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದ್ದು pHವುಳ್ಳ ಆರಣ್ಯಪ್ರದೇಶಗಳ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ 7-9 ppmನಲ್ಲಿ ಅಮೋನಿಯಾ ಮಟ್ಟವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದರೆ $\text{NO}_3\text{-N}$ (ನೈಟ್ರೇಟ್-ಸಾರಜನಕ)ಗಳು ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಪತ್ತೆಮಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮಸಸ್ಯಗಳು $\text{NH}_4\text{-N}$ ಗೆ ಬಲವು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಪ್ತಜನಕವು ಬದ್ಧ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜೊಗು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ನೀರುನಿಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರಜನಿಕರಣವು ಸ್ವಲ್ಪವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಧಾರಣ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು pH ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ, ನೈಟ್ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವುದೋ, ಅಷ್ಟೇ ವೇಗವಾಗಿ ಉತ್ಪರ್ಷಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೈಟ್ರೇಟ್ ಸಂಗ್ರಹವು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಷವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಷಾರತೆ ಮತ್ತು ಅಮೋನಿಯಾ ಮಟ್ಟಗಳಿರುವ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ನೀರು ಹೆಚ್ಚು ಗಟ್ಟಿವಂಥ ಶೀತಲ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸಾರಜನಿಕರಣ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ: ಆದರೆ, ಅವು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇಂಥಾ ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿಯಲ್ಲೂ ಜೀವಿಸುತ್ತವೆ. ಹಿಮಗಟ್ಟಿದ ಮಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಮಂಜುಕರಗಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಸಾರಜನಿಕರಣ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಾಧಾರಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ 2 ರಿಂದ 20 ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್‌ಗಳಷ್ಟು $\text{NO}_3\text{-N}$ ಇರುತ್ತದೆ: ಏಕೆಂದರೆ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇದು 50 ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್‌ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಬಹುದು. ಸಾರಜನಿಕರಣವು ಸಾಮಾನ್ಯ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ತಕ್ಕಷ್ಟು ತೇವಾಂಶವಿರಬೇಕಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಿಯೆಯು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಗಾಳಿಯಿಲ್ಲದ ಬಣಗಿದ ಮಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಮುಂದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪುನಃ ನೀರಿನಿಂದ ಒದ್ದೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾರಜನಿಕರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರಾವರಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲವೇ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ನೈಟ್ರೇಟಗಳು ಕೂಡಲೇ ಬಿಸಿದುಹೋಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಬಿಸಿದು ಹೋಗದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಸ್ಯಗಳೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲವಾಗ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಗೊಂಡು ನಿರ್ವಾರಜನಿಕರಣ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳಿಂದ ನೈಟ್ರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು

ಸೈಟೋಜನ್ ಅಸಲಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಸಾವಯವ ಮಾಧ್ಯಮ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಸಾರಜನಕೀಕರಣ

ಮುಕ್ಕಾಲು ಪಾಲು ಬೆಳೆಯದುವ ಡಿವಿಷನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನ ಸ್ವಪೋಷಿತ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳೇ ಸಾರಜನಕೀಕರಿಸಿದರೂ ಈಚೆಗೆ ಅನೇಕ ಸಾವಯವ ಮಾಧ್ಯಮ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳೂ ಸಹ ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಬಗೆಯ ಸಾರಜನಕೀಕಾರಕ ಸಾವಯವ ಮಾಧ್ಯಮ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಒಂದು ಅಮೋನಿಯಮ್ ಉತ್ಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿವಿಧ ಸಾವಯವ ಸಾರಜನಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಉತ್ಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಟೆಫ್ಟೋಮೈಸಸ್, ಮೈಕ್ರೊಪ್ಲಾನೊಸ್ಟೋರ, ಬ್ಯಾಕ್ಟಿಲ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೊಮೊನಾಸ್ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಪೈಕಿ, ಆಪ್ಟರ್‌ಜಿಲ್ಲಸ್, ಫ್ಲಾವಸ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ಟರ್‌ಜಿಲ್ಲಸ್ ಕಾರ್ಬೋಸೆಪ್‌ಗಳು ಅಮೋನಿಯಮನ್ನು ನೈಟ್ರಿಟರಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಪರೂಪವಾಗಿ ನೈಟ್ರೇಟಾಗಿ ಉತ್ಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಹೀಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ನೈಟ್ರಿಟನ್ನು ಅವು ತಮ್ಮ ಮೈಗೂಡಿಕೆಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸಾವಯವ ಮಾಧ್ಯಮ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯದಾದ ನೊಕಾರ್ಡಿಯಾಕಾರಿಸಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೊಮೊನಾಸ್ ಪ್ರಭೇದಗಳು ನೈಟ್ರೊಫಿನ್‌ಲಾಗಳು ಹಾಗೂ ನೈಟ್ರೊಜೆನೋಮೇಟ್‌ಗಳಂಥ ಸಾವಯವ ಸಾರಜನಕ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಮತ್ತು ಪೆರೂವಿಕ್ ಆಕ್ಸಲೋಸೆಟಿಕ್ ಹಾಗೂ ಆಲ್ಬೋಸೋಗ್ಲೂಟಾರಿಕ್ ಆಮ್ಲಗಳ ಅಕ್ಸೈಮ್‌ಗಳಿಂದ ನೈಟ್ರಿಟ್ರಿಟ್ ಮತ್ತು ನೈಟ್ರೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ ಆಪ್ಟರ್‌ಜಿಲ್ಲಸ್ ಫ್ಲಾವಸ್ ಎಂಬುವ ಪೆಪ್ಟೋನನ್ನು ನೈಟ್ರಿಟ್ ಹಂತದವರೆಗೆ ಉತ್ಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಆಮ್ಲಯುತ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಸ್ವಪೋಷಿತ ಸಾರಜನಕೀಕಾರಕಗಳು ಕಡಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪರಿಷ್ಕರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಮಾಧ್ಯಮ ಜೀವಿಗಳಿಂದಾಗುವ ಸಾರಜನಕೀಕರಣವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವುದು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೈನೋಫಿನ್‌ಲಾಗಳನ್ನು (ಎದರೆ, ಅನಿಲೈನ್) ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಲವು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ನಾಶಕಗಳು ದುರ್ಜಯ ಇಳಿಮುಖಿತೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೊಮೊನಾಸ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ಟರ್‌ಜಿಲ್ಲಸ್ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಅಮೈನೋ ಗುಂಪಿನವನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ನೈಟ್ರೇಟ್‌ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಲ್ಲವೆಂದು ಕಂಡುಬಂತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಅಣುಜೀವಿಗಳು ನೈಟ್ರಿಟನ್ನು, ನೈಟ್ರೇಟ್‌ಗಳಾಗಿ ಉತ್ಕರ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಅಮೋನಿಯವನ್ನು ನೈಟ್ರೇಟಾಗಿ ಉತ್ಕರ್ಷಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆಯೂ 8 ವಿದ್ಯುತ್ಕಣ ಬದಲಾವಣೆ (-3 ರಿಂದ +5 ರ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ಹಂತದಿಂದ) ಯನ್ನೊಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಮಧ್ಯಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ NH_4^+ ಮತ್ತು N_2 ಹಾಗೂ ನೈಟ್ರೈಟು ನೈಟ್ರೇಟಾಗಿ ನೇರ ಉತ್ಕರ್ಷಣಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಗಳ ನಡುವಣ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ ಮೈನ್ ಮತ್ತು ಹೈಪೊನೈಟ್ರೈಟ್‌ಗಳಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಅಧ್ಯಾಯ ೨

ಸಾರಜನಕದ ಪರಿವರ್ತನೆ—ನಿಸ್ಸಾರಜನಕೀಕರಣ

ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಸಾರಜನಕ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಿಕ್ ಆಮ್ಲಗಳನ್ನು ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಆಮೋನಿಯಾ ವಿದ್ಯುದ್ವಾಹಕಣ ಇಲ್ಲವೇ ಸರಳ ಸಾವಯವ ಸಾರಜನಕ ಅಮ್ಲಸೊ ಆಮ್ಲಗಳಂಥ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದ್ಧತಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದಕಾರಣ, ಪುಣ್ಣಿಗೆ $\text{NO}_3\text{-N}$ ಪೂರೈಸಿದಾಗ ಅದು ಆಮೋನಿಯಾ ವಿದ್ಯುದ್ವಾಹಕಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ದೇಹಗತ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಅಪಕರ್ಷಣ (ಆಪ್ಸಿಮಿಲೇಟರಿ ನೈಟ್ರೇಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್) ಎಂದು ಹೆಸರು. ಮತ್ತೊಂದುಕಡೆ, ನಿಸ್ಸಾರಜನಕೀಕರಣ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳು ಹೆಚ್ಚುಕಡಮೆ ನಿರ್ವಾಯವರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೇಟನ್ನು ತುದಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ಕಣ ಸ್ವೀಕಾರಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನೈಟ್ರೇಟ್, ನೈಟ್ರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅನಿಲ, ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಆಮೋನಿಯಗಳಂಥ ಅನೇಕ ಅಪಕರ್ಷಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಜೀವ ಪದ್ಧತಿಯ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಅಪಕರ್ಷಣ (ಡಿಸ್ಸಿಮಿಲೇಟರಿ ನೈಟ್ರೇಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್) ಎಂದು ಹೆಸರು. ಜೀವಪದ್ಧತಿಯ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಅಪಕರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಬೀಳುವ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳೆಂದರೆ, ನೈಟ್ರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅನಿಲ ; ಇವೆರಡೂ ಬಾಷ್ಪ (ಆವಿ) ಗುಣವುಳ್ಳವಾಗಿದ್ದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಜೀವಪದ್ಧತಿಯ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಅಪಕರ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅನಿಲ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಭಾಗವಾಗುತ್ತವೆ. ರಾಸಾಯನ ಸಂಶ್ಲೇಷಕ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಧಕ ಉತ್ಪರ್ಷಕ ಏಕಾಣುಜೀವಿ ಥಯೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಡಿಸೈಟ್ರಿಫಿಕನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜಲಜನಕ ಉತ್ಪರ್ಷಕ ಏಕಾಣುಜೀವಿ ಮೈಕ್ರೊಕಾಕ್ಸ್ ಡಿಸೈಟ್ರಿಫಿಕನ್ಸ್, ಸ್ಯೂಡೊಮೊನಾಸ್ ಎರುಜಿನೋಸ, ಬ್ಯಾಕ್ಟಿಲ್ಲ, ಲಿಚಿಸ್ ಫಾರ್ಮಿಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟಿಲ್ಲಾ ಸಿರಿಯಸ್ಗಳು ನಿಸ್ಸಾರಜನಕೀಕರಣ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ

ಭಾಗಗಳೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ನಿಸ್ಸಾರಜನಕೀಕಾರಕ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲುನವು ವಾಯುಪರ ಉಸಿರಾಟ ಜೀವದ್ರವ್ಯ ಪರಿಣಾಮಕೊಂದಿದ್ದು, ನಿರ್ವಾಯುಪರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವು ಕೇವಲ NO_2 ಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ತುದಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ಕಣ ಸ್ವೀಕಾರಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಬ್ಯಾಸಿಲ್ಲಸ್ ನಿಸ್ಸಾರಜನಕೀಕಾರಕ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಐಜೈಕ ನಿರ್ವಾಯು ಪರಜೀವಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅಂಥ ನಿರ್ವಾಯುಪರಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೇಟ್‌ನ್ನು ತುದಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ಕಣ ಸ್ವೀಕಾರಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹುದುಗುವಿಕೆ ಜೀವದ್ರವ್ಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರ್ಯ ಸಾಗಿಸುತ್ತವೆ.

ನಿಸ್ಸಾರಜನಕೀಕರಣಕ್ಕೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಾಯುಪರ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ಇರಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ಆಮ್ಲಜನಕವು ಕಡಮೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ನೈಟ್ರೇಟ್ ಇವ್ವಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸಾರಜನಕೀಕರಣ ಕ್ರಿಯೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಬೀಳುವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಸಾದಯವ ತಳಪಡಿ ಗಳಿದ್ದಾಗಲೂ ಸಹ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ವಾಯು ಸಂಚಾರವಿದ್ದರೂ ಸಹ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸಾರಜನಕೀಕರಣವು ತೋರುಬಹುದು. ಉಳುವೆಮಾಡಿದ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಬೇರುವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸಾರಜನಕೀಕಾರಕ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳು ಬಹು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಅನೇಕವೇಳೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ್ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತವೆಂದು ಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಿಸ್ಸಾರಜನಕೀಕರಣ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿರುತ್ತವೆಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ನಿಸ್ಸಾರಜನಕೀಕರಣ ಕ್ರಿಯೆಯು ಆಮ್ಲಜನಕ ಸೇತವನ್ನವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿಯೇ ಆಮ್ಲಜನಕ ಪೂರೈಕೆಯು ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಸಸ್ಯ ವರ್ಗಗಳಿಂದ ಆಮ್ಲಜನಕ ಬಳಕೆಯಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವ ಇಂಗಾಲ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ರೇಖರಣೆ, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಗಾಳಿಯೂ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಪದರದ ಮೇಲಿರುವ ಗಾಳಿಯೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆರೆಯುವುದು, ಅಧಿಕ ತೇವಾಂಶ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ವಾಯುರಂಧ್ರಗಳು ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗಿ ವಾಯು ಚಲನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೇಟ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕಾರಿಗಳಾದ ಅಂಶಗಳು ನಿಸ್ಸಾರಜನಕೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕಾರಿಗಳು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಧಿಕ ಸಾರಜನಕೀಕರಣ

ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನೈಟ್ರೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಸ್ಯಗಳು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಿದುಹೋದಿದ್ದಾಗ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುತ್ತದೆ.

ಕೆಲವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಮ್ಲಜನಕದ ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳಲ್ಲೂ ನಿಸ್ಸಾರಜನಕೀಕರಣ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು, ಅಮ್ಲಜನಕ ಸಾಂಕ್ರಮಿಕವಾಗಿ ನಿಸ್ಸಾರಜನಕೀಕರಣಗಳ ನಡುವೆ ವಿಪರ್ಯಯ ಸಂಬಂಧವಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಣ್ಣಿಗೆ ಅಧಿಕ ಕಾರ್ಬೊಹೈಡ್ರೇಟ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿರುವಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸಾರಜನಕೀಕರಣದಿಂದ ನಿರವಯವ ಸಾರಜನಕವು ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಬೊಹೈಡ್ರೇಟ್‌ಗಳಂಥ ಸಾಧಾರಣ ತಳಹದಿಗಳು, ನಿಸ್ಸಾರಜನಕೀಕರಣ ಏಕಾಣುಜೀವಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಸ್ಯಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ಬೇಕಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಾಯುಪರ ಸ್ಥಿತಿಯುಂಟಾಗಿ ಅಧಿಕ ನಿಸ್ಸಾರಜನಕೀಕರಣ ನಷ್ಟ ಕೈದೆಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಸಾವಯವ ತಳಹದಿಗಳಲ್ಲಿ ದಿರುವಾಗ, ನಿಸ್ಸಾರಜನಕೀಕರಣದಿಂದಾಗುವ ನಷ್ಟವು ಗಣನೀಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ; ಇಲ್ಲದೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಂತುಹೋಗುತ್ತದೆ.

ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಿಡುವುದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಸ್ಸಾರಜನಕೀಕರಣವು ಕಡಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ನೈಟ್ರೇಟನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಕಾರಣವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ. ನಿಸ್ಸಾರಜನಕೀಕರಣದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಇತರ ವಾತಾವರಣದ ಅಂಶಗಳೆಂದರೆ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಮತ್ತು pH ಗಳಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಅಂದರೆ, 60°-65°C ಗಳಷ್ಟು ಉಷ್ಣಾಂಶವು ನಿಸ್ಸಾರಜನಕೀಕರಣಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ತಾಪ ಸಹಿಷ್ಣು ನಿಸ್ಸಾರಜನಕೀಕರಣ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳು ಈ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುಮಾರು 25°C ಉಷ್ಣಾಂಶದಿದ್ದಾಗಲೂ ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸಾರಜನಕೀಕರಣ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳ ಕಡಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. pH 5.5ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಮೆ ಇರುವ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾರಜನಕವು ನಷ್ಟವಾದರೆ ಅದು ರಾಸಾಯನ(ಅಜೈವಿಕ)ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ನೈಟ್ರೇಟ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದುವುದರಿಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೈಟ್ರಸ್ ಆಮ್ಲ (HNO₂)ವು ಅಮೈನೊ ಆಮ್ಲ ಅಥವಾ ಅಮೋನಿಯಂ ಲವಣಗಳೊಡನೆ ರಸಾಯನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಗುವುದರಿಂದಾಗಿ ಸಾರಜನಕ ಅನಿಲವೂ ಸಹ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿಸ್ಸಾರಜನಕೀಕರಣ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾರಜನಕ ನಷ್ಟವು ಎಷ್ಟೆಂದು ನಿರ್ದಿರವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಹೆಕ್ಟೇರು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 10ರಿಂದ 100ಕೆಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಸಾರಜನಕವು ನಷ್ಟವಾಗುವುದೆಂದು ಕೆಲವು ಕರಗುಮಾಪಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಂದ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ, ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕಿದ ರಸಾಯನ ಗೊಬ್ಬರಗಳು, ಬೀಜ, ಮಳೆಯ ನೀರು, ಗೊಬ್ಬರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು, ಬಿಸಿಯುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕೊಚ್ಚಿಕೆಯಿಂದಾಗುವ ಸಾರಜನಕ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿದ ಬೆಳೆಯು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಾರಜನಕ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಸಾರಜನಕ ಮತ್ತು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾರಜನಕ ನಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಬೆಳೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡ ಸಾರಜನಕ ಮೊತ್ತಗಳ ನಡುವಣ(ಕೊರತೆಯು) ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿಸ್ಸಾರಜನಕೀಕರಣದಿಂದಾದ ನಷ್ಟವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಮೋನಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ, ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಸಹ, ಬೆಳೆಯಿಂದ ಹೋದ ಸಾರಜನಕ ಅಂಶವು ಶೇಕಡಾ 50ಭಾಗ ಮಾತ್ರವೆಂಬುದು. ಇದರಿಂದ, ಕಡಮೆ ಸಾರಜನಕ ಇಳುವರಿಗಳಿಗೆ ನಿಸ್ಸಾರಜನಕೀಕರಣವೇ ಕಾರಣವೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಸಮೂಹಿತ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಬಿತ್ತಿದ ಹುಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ, ಹಾಗೆ ಹಾಕಿದ ಸಾರಜನಕದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 10ರಿಂದ 40ರಷ್ಟು ಸಾರಜನಕವು ನಿಸ್ಸಾರಜನಕೀಕರಣದಿಂದ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆಂದು ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬೆಳೆಯ ಬೇರುವಲಯದ ಬಳಿ ಆಮ್ಲಜನಕವು ಕಡಮೆಯಾಗಿ, ಬೇರುಗಳು ಹೊರಹಾಕಿದ ಸಾವಯವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಬೇರುವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ನಿಸ್ಸಾರಜನಕೀಕರಣ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿಮೂಲ ಹಾಗೂ ಇಂಗಾಲ ತಳಪಡಿಗಳಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುವುದೇ ಆಗಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ.

ದೇಹಗತ ನೈಟ್ರೇಟು ಅಮೋನಿಯಾ ಅಗಿ ಅಪಕರ್ಷಣೆಹೊಂದುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಜೀವವಸ್ತುಲಯ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಅಪಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ, ನೈಟ್ರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅನಿಲವಾಗುವಿಕೆಗಳೆರಡೂ ನೈಟ್ರೈಟ್ ಮತ್ತು ಹೈಪೊನೈಟ್ರೈಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಧ್ಯಪರ್ತಿಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಇದು ನಾಲ್ಕು ವಿದ್ಯುತ್ಕಣ ಬದಲಾವಣೆ(+5 ರಿಂದ +1)ಯನ್ನೊಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದೇಹಗತ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಅಪಕರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ, ನಾಲ್ಕು ವಿದ್ಯುತ್ಕಣಗಳು ಹೈಪೊನೈಟ್ರೇಟ್ ಅಮೋನಿಯಾ (+1 ರಿಂದ -3) ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲಮೈನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಮಧ್ಯಪರ್ತಿಗಳಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ಕಣ (+1ರಿಂದ 0) ಜೀವವಸ್ತುಲಯ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಅಪಕರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಪೊನೈಟ್ರೇಟ್

ಮತ್ತು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅನಿಲಗಳ ನಡುವೆ ಜವಲಾಪಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಸಾರಜನಕ ಸ್ಫಿರಿಕರಣ-ಅಸಹಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಹಜೀವನ

ಭೂವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸಾರಜನಕವು ಹೇರಳವಾಗಿದೆ. ಅದು ಅನಿಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 80 ಭಾಗ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಈ ಅನಿಲರೂಪಿ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಸಸ್ಯವರ್ಗಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ತಮ್ಮ ಬೆಳೆದಣಿಗೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಅಸಮರ್ಥವಾಗಿವೆ. ಅನೇಕ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ನೀಲಿಹಸುರು ಶೈವಲಗಳು ಈ ವಾತಾವರಣದ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಅಮೋನಿಯಾ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ, ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಜೀವಕೋಶದೊಳಗೆ ಸಾರಜನಕ ಸಂಯುಕ್ತವಸ್ತುಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸಸ್ಯವರ್ಗಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ವಾತಾವರಣದ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಸ್ಫಿರಿಕರಿಸುವ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಗೆ ಇವೆ. ರೈಜೋಬಿಯಂ ಪ್ರಭೇದದ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳು ಬೇಳೆಕಾಳು ಬೆಳೆಗಳ ಬೇರುಗಂಟುಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಸ್ಫಿರಿಕರಿಸುತ್ತವೆ. ಇತರ ಅನೇಕ ಸ್ವತಂತ್ರಜೀವಿ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳೂ ಮತ್ತು ನೀಲಿ-ಹಸುರು ಶೈವಲಗಳೂ (ಹೆಟೆರೊಸಿಸ್ಟ್ ಜಾತಿಗಳು) ಸಹ ವಾತಾವರಣದ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಸ್ಫಿರಿಕರಿಸುತ್ತವೆ. ಸ್ವತಂತ್ರಜೀವಿ ಏಕಾಣುಗಳು ಎಂದರೆ ಅಜಟೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಬ್ರೆವೆರಿಯಂ, ಹಾರ್ಸಿಯಂ ಜಾತಿಯವು ಹಾಗೂ ಟಾಟಿಪಾಕ್ರಿಕ್ಸ್, ನಾಸ್ತಾಕ್, ಅನಬೇನ ಮತ್ತು ಅಲೋಸಿರ ಮುಂತಾದ ಜಾತಿಯ ಹೆಟೆರೊಸಿಸ್ಟಿನ ನೀಲಿಹಸುರು ಶೈವಲಗಳು ಪಾಯುಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಬಂಧಿಸುತ್ತವೆ. ಕ್ಲೋರೊಬಿಯಂ, ಕ್ರೋಮಾಟಿಯಂ ಮತ್ತು ರೋಡೋಸ್ಪೈರಿಲ್ಲಂ ಜಾತಿಯ ಮ್ಯಾಪ್ಪಿಂಗ್‌ನೀವಕ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ಟಿಡಿಯಂ, ಕ್ಲೀಬ್ಬಿಯಲ್ಲ, ಅಕ್ಟೋಮೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಡೈಸೆಲ್ಫೊವಿಬ್ರಿಯೋ, ಬ್ಯಾಕ್ಟಿಲ್ಲಸ್ ಪಾಲಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಿಥೇನೋಬ್ಯಾಕ್ಟಿಲ್ಲಸ್ ಒಮೆಲಿಯಾನ್ಸ್ಕೈ ಜಾತಿಯ ಸಾದರವದ ಮಾಧ್ಯಮ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳು ನಿರ್ವಾಯುಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಬಂಧಿಸುತ್ತವೆ. ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವ ಸಾರಜನಕ ಸ್ಫಿರಿಕಾರಕ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳ ಪೈಕಿ ಅಜಟೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಪಾಸ್ತಾಲ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೊಮೈಸೆಟ್ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಮತ್ತು ಎಂಟೆರೊಬ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ಗಳು ಸಹ ರೈಜೋಬಿಯಂ ಜಾತಿಯ ಬೇರುಗಂಟು ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳಷ್ಟೇ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಸ್ಫಿರಿಕರಿಸಬಲ್ಲವೆಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇವು ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲುಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಕಳೆಗಳಂಥ ಬೇರುಗಂಟಿನಲ್ಲೂ ನಿಕಟ ಸಹಜೀವನದಿಂದ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಸ್ಫಿರಿಕರಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾರಜನಕದ ಸ್ಫಿರಿಕರಣವು ಶಿಲಾವಲಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಅಜಟೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಚಲಿಸುಬಲ್ಲವು : ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಶಾ ವರಣ ಕಶಾಂಗ(ಪರಿಟ್ರೈಕಾನ್ಸ್ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ)ಗಳ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ಅನೇಕವು ಪೂತಿಕೋಶಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರ (4.7m) ವಹಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಜಾರ್ನಿಯ ಅಜಟೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಬೈಜೆರಿಂಕಿಯ ಪ್ರಭೇದ ಗಳು ಸಾರಜನಕಮುಕ್ತ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಾಗ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲೋಳೆ (ಅಂಟು)ಯನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅಜಟೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಂಬುದು ಬಹು ಹೆಚ್ಚಾದ ಉಸಿರಾಟ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ್ ಒಪ್ಪೆ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಒಂದು ಗುಟೆಗೆ 500ರಿಂದ 1000 ಮಿಲಿಲೀಟರ್‌ಗಳಷ್ಟು ಆಮ್ಲ ಜನಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣವು ಅವರವಾಗಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಾಯುಪರ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಅಜಟೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ಗಳು ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡೆಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾರ್ಬೋ ಡೈಟ್ರೇಟುಗಳನ್ನು ಉಸಿರಾಟಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸಕ್ಕರೆಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ಬಹುತೇಕ ಉಸಿರಾಟ ಜೀವದ್ರವ್ಯ ಪುನಃಮಕ್ರಿಯೆಯು ಆಮ್ಲಜನಕಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅದರ ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ರಕ್ತನೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದ ರಲ್ಲಿ ಬಹುಮಟ್ಟು ಆಮ್ಲಜನಕ ಬಳಕೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಈ ಸಕ್ಕರೆಯ ಅಂಶವನ್ನು ಜೀವ ಕೋಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅದು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅಜಟೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಬೈಜೆರಿಂಕಿಯ ಮತ್ತು ಪರ್ನಿಯ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಸಕ್ರಿಯ ಸಾರಜನಕಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಕಾಲ ದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ವಿಪುಲ ಲೋಳೆಯು ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಆಮ್ಲಜನಕದಿಂದ ಹಾಳಾಗದಿರುವ ಒಂದು ಸುಧನವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲೋಳೆಯು ಆಮ್ಲಜನಕವು ಜೀವಕೋಶದೊಳಕ್ಕೆ ತೂರಿಕೊಂಡು ಹೋಗದಿರುವಂತೆ ತಡೆಯುವ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಅಜಟೋಬ್ಯಾಕ್ಟರುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಟಸ್ಥದಿಂದ ಕ್ಷಾರತೆ ಯುಳ್ಳ ಮುಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಬೈಜೆರಿಂಕಿಯಗಳು ಉಷ್ಣದೇಶಗಳ ಆಮ್ಲ ಮಾಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಭಾರತದ ಮುಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಅಜಟೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಕ್ರೋಕಾ ಕ್ಯಮ್ ಬೈಜೆರಿಂಕಿಯ ಇಂಡಿಕ ಮತ್ತು ಜಾರ್ನಿಯ ಗಮ್ನೇಸಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರದೇಶ ಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿವೆ.

ಸ್ವತಂತ್ರಜೀವಿ ಏಕಾಣುಗಳು ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸಿದ ಸಾರಜನಕವು ಅವುಗಳ ಕೋಶ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಅದು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೇರವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅವು ಏಕಾಣುಗಳು ಸತ್ತಮೇಲೆ, ವಿಭಜನೆಗೊಂಡಾಗ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರಜೀವಿ ಸಾವಯವ ಮಾಧ್ಯಮ ಏಕಾಣುಗಳ ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀ ಕರಣವನ್ನು, ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಇಂಗಾಲ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಲ್ಲದಿರುವಾಗ

ಗಣನೀಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಜಟೋಬ್ಯಾಕ್ಟರುಗಳು ಬಳಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರತಿಗ್ರಾಮ್ ಇಂಗಾಲ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಿಂದ, 10-15 ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಸಾರಜನಕವುಳ್ಳ 100-150 ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್‌ಗಳಷ್ಟು ಬೂತೂಕದ ಅಜಟೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಒದಗುತ್ತವೆ. ಜೀವಿಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿಯೇ ಬಹುವಾಗಿ ಅಂದಾಜುಮಾಡಿದ ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೆಕ್ಕೀರಿಗೆ 1ರಿಂದ 2 ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್‌ಗಳೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅಮ್ಲಜನಕದ ಸೇಳೆತವು ಕಡಮೆಯಾದಾಗ ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುತ್ತದೆ; ಏಕೆಂದರೆ, ಇವು ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಅಥವಾ ನೀರಾವರಿಯಿಂದ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಜಲಸಂತ್ಯಾಪ್ತಿಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಮತ್ತಿತರ ಸಾವಯವ ಮಾಧ್ಯಮ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳ ಉಸಿರಾಟಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಲೂ ಬಿಗಿತ ಕಡಮೆಯಾಗುವಿಕೆ ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ವಿವಿಧಬಗೆಯ ವಾಯುಪರ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಇಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಆಧಿಕ ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಜೇಗವು ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಂದ, ಬೇರುವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕಾರಕ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಬೇರುಗಳು ಹೊರಹಾಕಿದ, ಕರಗಬಲ್ಲ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟುಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಗಾಲಯುಕ್ತ(ಕಾರ್ಬೋನೇಸಿಯಸ್) ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತಿರುವಾಗ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರೀಕರಣವಾಗಬಹುದೆಂದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸಮೀಪ ಸಾರಜನಕ ಸಮೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳು ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕಾರಕ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮರ್ಥ ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕಾರಕಗಳಲ್ಲದ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳಿಂದ ಕುಗ್ಗುತ್ತವೆ. ಸ್ವತಂತ್ರಜೀವಿ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳಿಂದ ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣವಾಗುವಿಕೆಯು ಸಮೀಪ ಸಾರಜನಕವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಹಾಗೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಇಂಗಾಲಯುಕ್ತ(ಕಾರ್ಬೋನೇಸಿಯಸ್) ವಸ್ತುಗಳಿರುವಾಗ ಗಣನೀಯವಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುತ್ತದೆ.

ಸೋವಿಯೆಟ್ ಯೂನಿಯನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಆಧಿಕವೆಳೆ ಇಳುವರಿಗಾಗಿ ದುಣ್ಣು ಇಲ್ಲವೇ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಅಜಟೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸೋವಿಯೆಟ್ ಯೂನಿಯನ್ನಿನ ಹೊರಗೆ ಇಂಥ ಅಭ್ಯಾಸ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಬೀಜ ಇಲ್ಲವೇ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಅಜಟೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದೆಂದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಹ ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಸಾಹವು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ.

ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗ, ಮತ್ತಿತರ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ, ನಡೆಸಲಾದ ಕೆಲವು ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಂದ ಮುಣ್ಣಿಗೆ ಅಜಟೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಅಧಿಕ ಬೆಳೆ ಇಳುವರಿ, ಬೀಜಗಳ ಉತ್ತಮ ಮೊಳೆಯುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೇರು ಮತ್ತು ಕಾಂಡ ಬೆಳೆವಣಿಗೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಬತ್ತದ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ನಾಟಿಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಅವುಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಅಜಟೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಕಲೆಸಿದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆದ್ದಿ ನಾಟಿಮಾಡುವುದರಿಂದಲೇ ಇಳುವರಿಯು ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ 25 ರಿಂದ 50 ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್‌ಗಳಷ್ಟು ಸಾರಜನಕ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ದೊರಕುವಷ್ಟು ಬಂದಿತು. ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದಮೇಲೆ, ಪ್ರೇರು ಇನ್ನೂ ಬೆಕ್ಕದಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಬೇರುಗಳೂ ಮತ್ತು ಕಾಂಡ ಪುಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವುದು ಈ ಅಜಟೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ನ ಉಪಚಾರದಿಂದ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಅಜಟೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಉಪಚಾರದಿಂದ ಮುಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇಂಡೋಲ್ ಅಸೆಟಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಜೆಬ್ಬರಲ್ಲಿನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜೀವಸತ್ವಗಳಂಥ ಬೆಳೆವಣಿಗೆಕಾರಕಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಪರಿಣಾಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳೆಗಳ ಬೇರಿನಂಚು ಮತ್ತು ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಹಜೀವನವು ಅಜಟೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲವೇ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಾಗ ಬೆಳೆಗಳ ಬೆಳೆವಣಿಗೆಯ ಮೇಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚಳಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣವೂ ಕಾರಣವೆಂದು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣದ ಅಂದಾಜನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರೂಪಿಸಲಾದ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಸಿಟಿಲೀನ್ ಅಪಕರ್ಷಕ ತಂತ್ರ(ಅಸಿಟಿಲೀನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್)ದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದರಿಂದ ಪ್ರತಿಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ 20-100 ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣವಾಗುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಕೆಲವು ನೀರಿಹಸರು ಶೈವಲಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣ ಅಂದರೆ ತೇವಾಂಶ, ಗಾಳಿ, ಬೆಳಕು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಬೆಳೆವಣಿಗೆಗೆ ಅಡಚಣೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಸಹ ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸುತ್ತವೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಶೈವಲಗಳು, ಉಷ್ಣದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತೇವಾಂಶವಿರುವ ಕಡೆ ಮತ್ತು ಬತ್ತದ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಪುಲವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಮುಣ್ಣು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯವರ್ಗಗಳಿಗೆ ನೀರಿಹಸರು ಶೈವಲಗಳಿಂದಾಗಿ ದೊರೆಯುವ ಸ್ಥಿರೀಕೃತ ಸಾರಜನಕ ಕೊಡಿಗೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಸಾಕಷ್ಟು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶೈವಲಗಳಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ 2ರಿಂದ 10 ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್‌ಗಳಷ್ಟು ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣಗೊಳ್ಳುವುದೆಂದು ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಟಾಲಿಪಾರ್ಥಿಕ್ ಚಿನಾಯಿ ಎಂಬ ನೀರಿಹಸರು ಶೈವ

ಲವು ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ 72 ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸುವುದೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಸಿಂಗ್ ಅಲೋಸಿರ ಫರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬಿನೀಲಿ ಹಸುರು ಶೈವಲವನ್ನು ಬತ್ತದ ಗದ್ದೆಗೆ ಸೇರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಶೇ.114ರಷ್ಟು ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಬತ್ತದ ಪೈರಿಸಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗ್ ಎಂಬುವನು ತೇವಾಂಶಭರಿತವಾದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕದಲಿಸದೆ ನೀಲಿಹಸುರು ಶೈವಲಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚುವುದರಿಂದ 75 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ 100 ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್‌ಗಳಷ್ಟು ಸಾರಜನಕ ಲಾಭವುಂಟಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ (ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಾಯ 5ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ). ಬೆಳಕು, ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಉಷ್ಣಾಂಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರಂಜಕ ಮತ್ತು ಮಾಲಿಬ್ಡಿನಮ್ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷಾರ pHಗಳೂ ಸಹ ನೀಲಿಹಸುರು ಶೈವಲಗಳ ಬೆಳೆವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಗಳೆಂದು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬೇಳೆಕಾಳು ರೈಜೋಬಿಯಂ ಸಹಜೀವನದಿಂದ ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ

ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬರವುದರಲ್ಲಿ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು ದುಹತ್ತವು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ತಿಳಿದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಬೇಳೆಕಾಳು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸದಿರುವಲ್ಲಿಯೂ, ಹಸುರಲೆ ಗೊಬ್ಬರದಂತೆಯೂ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಾರಜನಕದಿಂದ ಫಲವತ್ತಾಗಿಸುವ ಬೇಳೆಕಾಳು ಬೆಳೆಗಳ ಅದ್ವಿತೀಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಮೂಲಕಾರಣ ಬೇಳೆಕಾಳು ರೈಜೋಬಿಯಂಗಳ ಸಹಜೀವನದಿಂದ ವಾತಾವರಣದ ಸಾರಜನಕವು ಸ್ಥಿರೀಕರಣಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸುವುದು ಬೇಳೆಕಾಳು ಬೆಳೆಗಳ ಸಹಜ ಗುಣಧರ್ಮವೆನಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ಬೇರುಗಂಟುಗಳಲ್ಲಿರುವ ರೈಜೋಬಿಯಮ್‌ಗಳು ಬೇಳೆಕಾಳು ಬೆಳೆಗಳ ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟುಗಳನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಸಸ್ಯಗಳು ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟು(ಶರ್ಕರ ಪಿಷ್ಟ)ಗಳನ್ನು ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳು ವಾತಾವರಣದ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸಿ, ಆಶ್ರಯದಾತ ಸಸ್ಯಗಳ ಪೋಷಣೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆಮಾಡುತ್ತವೆ. ಒಮ್ಮೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬೇರುಗಂಟುಗಳು ಉಂಟಾದುದಾದರೆ, ಅಗ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಮೊರಗಿನ ಸಾರಜನಕವು ಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಬೇರುಗಂಟು ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಅವು ಆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯದಲಾಗಿರುವ ಬೇಳೆಕಾಳು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಭೇದಗಳೇ ಆಗಿರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮಣ್ಣಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಆಯಾ ಬೇಳೆಕಾಳು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಏಕಾಣುಜೀವಿ ವಿಭೇದವನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಜಲೇಪನ ಮೂಲಕ ಸೇರಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದ್ಧತಿ. ಹೀಗೆ ಒಳ ಸೇರಿಸಿದ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೈಜೋಬಿಯಗಳು ತಮ್ಮ ತಂತುಜಾಲದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸೋಂಕು ನಾಳ(ಸೋಂಕುತಂತು)ದ ಮೂಲಕ ಬೇರು ರೋಮದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಮಾಡುತ್ತವೆ. ಬೇರಿನ ರೋಮದ ತುದಿಯ ಪೊರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಗ್ಗು(ಹಳ್ಳ)ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸೋಂಕುನಾಳವು ಬೇರುರೋಮದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಮಾಡಿ, ತೊಗಟೆ(ಹೊರ) ಕೋಶ(ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಸೆಲ್)ದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಚತುರ್ಯುಗ್ಮಕೋಶ (4Nವರ್ಣತಂತುಗಳು)ವನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಿದಾಗ ಚತುರ್ಯುಗ್ಮಕೋಶವು ಪದೇ ಪದೇ ವಿಭಜನೆಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಚೋದನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ, ಬೇರುಗಂಟು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳು ಆಶ್ರಯದಾತ ಸಸ್ಯಕೋಶದ ಜೀವವೈವ್ಯದೊಳಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಗಂಟೆನೋಳಿಗೆ ಕೋಶಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲವೇ ದಲವಾರು ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿದ್ದು ಪೊರೆಯಂಥ ಕವಚದಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳು ಅನಿಯತ(ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ)ರೂಪವನ್ನು ತಾಳುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏಕಾಣುಜೀವಿಯಿಂದ (ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ)ರೂಪಗಳೆಂದು ಹೆಸರು. ಈ ಏಕಾಣುಜೀವಿಯಿಂದ ಅಂಗಾಂಶವು ವಾತಾವರಣದ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಗಂಟುಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ರೈಜೋಬಿಯ ಕೋಶಗಳು ಆಶ್ರಯದಾತ ಬೇಳೆಕಾಳು ಸಸ್ಯಗಳ ಬೇರುಗಂಟು(ಅತಿಥೇಯ)ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುವ ಬೇರುಗಂಟು ಅಂಗಾಂಶವು ಏಕಾಣುಜೀವಿಯಿಂದ ರೂಪಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದು ರಕ್ತವರ್ಣಜನಕವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ(ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸುವ) ಬೇರುಗಂಟುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಿಷ್ಟುರಿಣಾಮಕಾರಿ ರೈಜೋಬಿಯಗಳು ಗಂಟುಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದರೂ ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಗಂಟುಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತವರ್ಣಜನಕವು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕಾಣುಜೀವಿಯಿಂದ ಅಂಗಾಂಶಕ್ಕೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕ್ರಮಗೊಳಿಸುವುದು ರಕ್ತವರ್ಣಜನಕದ ಕಾರ್ಯ. ಏಕಾಣುಜೀವಿಯಿಂದ ಅಂಗಾಂಶವು ವಿತ ಆಮ್ಲಜನಕ ಬಿಗುಪಿನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ; ಇದರಿಂದ ಏಕಾಣುಜೀವಿಯಿಂದಗಳು ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ನೀಲಿಹಸುರು ರೈವಲಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರೀಕರಣವು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು

ನಿರ್ವಾಯುಪರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬೇರುಗಂಟುಗಳಲ್ಲಿಯ ರಕ್ತವರ್ಣಜನಕವು ಅವ್ಯಜನಕ ಶುದ್ಧೀಕಾರಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಅವ್ಯಜನಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಮೆಮಾಡುತ್ತದೆಂದು ಆಗಲೇ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ನಿಷ್ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ(ನಿಸ್ಸಾರಜನಕೀಕಾರಕ) ಬೇರುಗಂಟುಗಳು ರಕ್ತವರ್ಣಜನಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂಥಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಅನೋನ್ಯ ಸಹಜೀವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಪರಾವಲಂಬಿ ಸಹಜೀವನವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ.

ರೈಜೋಬಿಯಂ ವಿಭೇದಗಳು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಅತಿಥೇಯಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಬಟಾಣಿಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರುಗಂಟುಮಾಡುವ ಏಕಾಣುಜೀವಿ ವಿಭೇದಗಳು (ರೈಜೋಬಿಯಂ ಲೆಗ್ಯೂಮಿನೋಸರಮ್) ಇತರ ಬೇಳೆಕಾಳು ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರುಗಂಟುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಒಂದುಪೇಳಿ ಅವು ಗಂಟುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿಮಾಡಿದರೂ ಅವು ನಿಷ್ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ; ಏಕೆಂದರೆ, ಅವು ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾರವು. ರೈಜೋಬಿಯಂ ಮಿಲಿಲೋಟ್ರಿ ಕುದುರೆಮೆಂತೆ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರುಗಂಟುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿಮಾಡುತ್ತವೆ. ರೈಜೋಬಿಯಂ ಟ್ರೈಫೋಲಿ ಕ್ಲೋವರ್ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೇರುಗಂಟುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ರೈಜೋಬಿಯಂ ಜಪಾನಿಕಂ ಸೋಯಾ ಅವರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೇರುಗಂಟುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿಮಾಡುತ್ತವೆ. ಒಂದೇ ರೈಜೋಬಿಯಂ ಪ್ರಭೇದದಿಂದ ಬೇರುಗಂಟುಗಳಾಗುವ ವಿವಿಧ ಬೇಳೆಕಾಳು ಸಸ್ಯಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಇನಾಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ಯೂಪ್‌ಗಳೆಂದು ಹೆಸರು. ಇಂಥ ಆರು ಕ್ರಾಸ್ ಇನಾಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ರೈಜೋಬಿಯಂ ಮಿಲಿಲೋಟ್ರಿಗಳು ಬೇರುಗಂಟುಮಾಡುವ ಕುದುರೆಮೆಂತೆ ಗುಂಪು, ರೈಜೋಬಿಯಂ ಟ್ರೈಫೋಲಿ ಬೇರುಗಂಟುಮಾಡುವ ಕ್ಲೋವರ್ ಗುಂಪು, ರೈಜೋಬಿಯಂ ಲೆಗ್ಯೂಮಿನೋಸಾರಂಗಳು ಬೇರುಗಂಟುಮಾಡುವ ಬಟಾಣಿ ಗುಂಪು, ರೈಜೋಬಿಯಂ ಲೂಪಿನ್ಯ ಬೇರುಗಂಟುಮಾಡುವ ಲೂಪಿನ್ ಗುಂಪು, ರೈಜೋಬಿಯಂ ಫೇಸಿಯೋಲೈ ಹುರುಳಿಕಾಯಿ ಗುಂಪು ಮತ್ತು ರೈಜೋಬಿಯಂ ಜಪಾನಿಕಂಗಳು ಬೇರುಗಂಟುಮಾಡುವ ಸೋಯಾ ಅವರೆ ಗುಂಪು. ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಬೇಳೆಕಾಳು, ಅಲಸಂದೆ ಮತ್ತು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೇರುಗಂಟುಮಾಡುವ ಅಲಸಂದೆ ಗುಂಪೂ ಇದೆ; ಈ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರುಗಂಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ರೈಜೋಬಿಯಂ ವಿಭೇದಗಳನ್ನು ಅಲಸಂದೆ ಬಗೆಯ ರೈಜೋಬಿಯಂಗಳೆಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲಸಂದೆ ಬಗೆಯ ರೈಜೋಬಿಯಂಗಳು ಸೋಯಾ ಅವರೆ ರೈಜೋಬಿಯಂಗಳನ್ನು ಎಂದರೆ, ರೈಜೋಬಿಯಂ ಜಪಾನಿಕಂಗಳನ್ನು ಹೋಲುತ್ತವೆ. ಪುಟ್ಟಮಾಡಿದ ರೈಜೋಬಿಯಂ ಪ್ರಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕವು ತಮ್ಮ ಆಶ್ರಯದಾತ ಬೇಳೆಕಾಳು ಬೆಳೆ


ಗಳಲ್ಲದೆ ಇತರವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬೇರುಗಂಟುಗಳನ್ನಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮರ್ಗೀಕರಣವು ಅಷ್ಟೇನೂ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನದಲ್ಲ.

ಸಹಜೀವನದಿಂದ ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣಮಾಡುವಿಕೆಯು ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣ ಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರದ ಒಂದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಜೈವಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ ; ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿಯೆ ಬಹುಪಾಲು ಸಾರಜನಕವು ಸ್ಥಿರೀಕರಣಗೊಂಡು ಮಣ್ಣು ಸಸ್ಯವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರಿನಲ್ಲಿ 100ರಿಂದ 200 ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್‌ಗಳಷ್ಟು ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಲೂಕೇನ ಲೂಕೋಸೆಫಲ ದಂಥ ಕೆಲವು ಮೇವಿನ ಬೇಳೆಕಾಳು ಬೆಳೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಹಿತಕರ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ 400ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್‌ಗಳಷ್ಟು ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸುತ್ತವೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಬಹುತೇಕ ದ್ವಿದಳಕಾಳು ಬೆಳೆಗಳು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 50-100ಕಿಲೋ ಗ್ರಾಮ್‌ಗಳಷ್ಟು ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸುತ್ತವೆ.

ಬೇರುಗಂಟು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ವಾತಾವರಣದ ಅಂಶಗಳು ಪ್ರಭಾವಬೀರುತ್ತವೆ. ಬೇಳೆಕಾಳು ಬೆಳೆಗಳು ಮಣ್ಣಿಗೆ ರಂಜಕ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ರಂಜಕ ಗೊಬ್ಬರದಿಂದಾಗಿ ಬೇಳೆಕಾಳು ಬೆಳೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾರ ಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಮರ್ಥ ವಾಗಿ ಆಗಲು ಕೆಲವು ಕಿರಿಯ ಮೂಲಧಾತುಗಳು ಅಂದರೆ, ಮಾಲಿಬ್ಡಿನಂ ಮತ್ತು ಬೋರಾನ್‌ನಂಥವು ಅವಶ್ಯ. ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾರಜನಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಗೊಬ್ಬರ ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೇರುಗಂಟುಗಳು ಕಡಮೆಯಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀ ಕರಣವೂ ಕುಗ್ಗುತ್ತದೆ.

ಬೇಳೆಕಾಳು ಬೆಳೆಗಳು ಅನೇಕ ವ್ಯವಸಾಯೋತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತ ವಾಗಿವೆ. ಅವು ದನಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಮೃದ್ಧ ಮೇವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಆ ಬೆಳೆಗಳಿಂದ ಉದುರಿದ ಎಲೆಗಳು, ಕಾಂಡಗಳು, ಬೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಬೇರುಗಂಟು ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಸಾರಜನಕ ಮಣ್ಣನ್ನು ಫಲವತ್ತಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇತರ ಬೆಳೆಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಬೆಳೆಪರಿವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಾಗ ಬೇಳೆಕಾಳು ಬೆಳೆಗಳು ಸಹ ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲವೇ ಬೆಳೆಪರಿವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹಾಕಿರುವ ಬೇಳೆಕಾಳಿಂತರ ಬೆಳೆ ಗಳು ಮತ್ತು ಮೇವಿನ ಹುಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರೀಕೃತ ಸಾರಜನಕ ವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.

ಸಾರಜನಕ ಸ್ಫಿರೀಕರಿಸುವ ಜೀವಿ(ಸಹಜೀವಿ, ಅಸಹಜೀವಿ, ವಾಯುಪರ, ನಿರ್ವಾಯುಪರ. ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಕ, ಸಾವಯವ ಮಾಧ್ಯಮ ಜೀವಿ, ರಾಸಾಯನ ಸಂಶ್ಲೇಷಕ ಜೀವಿ ಇತ್ಯಾದಿ)ಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ತೋರಿಬಂದರೂ ಸಾರಜನಕ ಸ್ಫಿರೀಕರಣವು ಮುಂದುವರಿಯುವ ಕೇಂದ್ರಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಕಿಣ್ವಗಳು ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ತೆರನಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸಾರಜನಕ ಸ್ಫಿರೀಕರಣ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಎಟಿಪಿ ರೂಪದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಪಕರ್ಷಕ ಶಕ್ತಿ(ವಿದ್ಯುತ್ಕಣ)ಗಳು ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ವಾಯು ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದು ದುರ್ಬಲ ಆಮ್ಲಜನಕ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ತೆಳು ಪೊರೆಯಿರುವಿಕೆ. ಲೋಳೆ ಉತ್ಪಾದನೆ, ರಕ್ತವರ್ಣಜನಕ(ಬೇರುಗುಟ್ಟು ಸಹ ಜೀವನದಲ್ಲಿ). ಅಧಿಕ ಉಸಿರಾಟ ವೇಗ, ಕೋಶಗಾತ್ರ(ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ, ಅಧಿಕ ಉಸಿರಾಟವೇಗಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೋಶದಂಚನ್ನು ಕಡಮೆಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಡಮೆ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ) ಮುಂತಾದುವು ಸಾರಜನಕ ಸ್ಫಿರೀಕಾರಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕದ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಪೈರೂವಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಕಣಗಳನ್ನು (N_2 ವನ್ನು NH_3 ಅಗಿ ಅಪಕರ್ಷಿಸಲು) ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪೈರುವೇಟಿನಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಅಸಿಟೈಲ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಶಕ್ತಿ(ಎಟಿಪಿ)ಯನ್ನು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಕಣಗಳು ಅಪಕರ್ಷಿತ ಫೆರಡಾಕ್ಸಿನ್(ಅಪಕರ್ಷಕ ಶಕ್ತಿ)ಅನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅನಿಲರೂಪದ ಸಾರಜನಕವು ನೈಟ್ರೋಜನೇಸ್ ಕಿಣ್ವಗಳಿಂದ ಉತ್ಪೇಜನಗೊಂಡು ಫೆರಡಾಕ್ಸಿನಿನಿಂದ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಈ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡ ಸಂಯುಕ್ತ ಪರಾಧವು ಎಟಿಪಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ, ಉತ್ಕರ್ಷಿತ ಫೆರಡಾಕ್ಸಿಯವು ಪುನರುತ್ಪತ್ತಿಗೊಂಡು ಅಮೋನಿಯದೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅಮೋನಿಯವು ಅಮೈನೊ ಆಮ್ಲಗಳ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಬಳಕೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಅಮೈನೊ ಆಮ್ಲಗಳು ಜೀವಕೋಶದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಉಪಯೋಗಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದರ ಒಟ್ಟಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣಿಸಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಬಹುದು:



ಸಾರಜನಕಸ್ಫಿರೀಕಾರಕ ಜೀವಿಗಳ ಶರೀರಕ್ರಿಯಾಶಾಸ್ತ್ರ, ಜೀವರಾಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ತಳಿಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇವುಗಳ ಕಿಣ್ವವು ಅನೇಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದು ಸಾರಜನಕ ಅನಿಲದ

ಜೊತೆಗೆ ಇದೂ ಸಹ ಅನೇಕ ತಳಪಡಿಗಳ ಅಪಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ವೇಗವರ್ಧಿಸಬಲ್ಲದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅಸಿಟಲೀನನ್ನು ಎಥಿಲೀನ್ ಆಗಿಯೂ ಮಿಥೈಲ್ ಸೈಯನೈಡನ್ನು ಮಿಥೇನ್ ಮತ್ತು ಮಿಥೈಲ್ ಅಮೈನ್ ಆಗಿಯೂ H^+ ಅನ್ನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಗಿಯೂ, ಸಯನೈಡನ್ನು ಮಿಥೇನ್ ಮತ್ತು ಅಮೋನಿಯಂಗಳಾಗಿ, ಅಸೈಡನ್ನು ಸಾರಜನಕ ಮತ್ತು ಅಮೋನಿಯ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಅಪಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕಾರಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಪಡೆದ Mo-Fe-ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವಿಯಿಂದ ಪಡೆದ Fe-ಪ್ರೋಟೀನ್ ಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ; ಎಂದರೆ, ಈ ಎರಡೂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗಲೂ, ಅವು ಸಾರಜನಕವು ಅಮೋನಿಯವಾಗಿ ಅಪಕರ್ಷಣೆಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ವೇಗವರ್ಧನೆಗೊಳಿಸಬಲ್ಲವು.

ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕಾರಕಗಳಿಂದ ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕಾರಕ ವಂಶವಾಹಿಗಳ(ನಿಫ್ ಜೀನ್) ತಳಿ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕಾರಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಾರಜನಕದಿಂದ ನಿಗ್ರಹಿತವಾಗದ ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕಾರಕಗಳ ಉತ್ಪರಿವರ್ತಿತಗಳು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಉತ್ಪರಿವರ್ತಿತಗಳು NH_4 (ಸಂಯುಕ್ತ ಸಾರಜನಕ) ಸಾಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ(ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ)ವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತವೆ. ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವ ರೈಜೋಬಿಯ (ಅಸಹಜೀವನದಲ್ಲಿ)ಗಳಿಂದ ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕಾರಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಬೇಳೆಕಾಳುಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಂಶವಾಹಿಗಳನ್ನು (ನಿಫ್ ಜೀನ್) ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೂ ನಡೆದಿವೆ. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ದಿನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಈಗಿರುವ ಸಾರಜನಕ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗಿ, ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ರಾಸಾಯನ ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಸಾರಜನಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಅವಲಂಬನೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆಂದು ಆಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಧ್ಯಾಯ 10

ಇತರ ಖನಿಜ ಪ್ರೋಷಕಾಂಶಗಳ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು

ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಅತಿಮುಖ್ಯ ಪರಿಣಾಮವೆಂದರೆ, ಅವಶ್ಯ ಮೂಲಧಾತುಗಳನ್ನು ಸಾವಯವ ರೂಪದಿಂದ ನಿರಪಯವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಸಸ್ಯಗಳು ಈ ರೂಪತಳಿದ ಧಾತುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇಹಗತಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಗಂಧಕ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ಮಾರ್ಪಾಡು

ಗಂಧಕವು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಉತ್ಕರ್ಷಿತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ (ಸಲ್ಫೈಡ್ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ -2ರಲ್ಲಿಯೂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ +6ರಲ್ಲಿಯೂ) ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಂದಾಗುವ ಬಹುಮುಖ್ಯಪರಿವರ್ತನೆಯೆಂದರೆ H_2S ಉತ್ಕರ್ಷಣೆ ಗೊಂಡು S ಮತ್ತು SO_4 ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು SO_4^{2-} H_2S ಆಗಿ ಅಪಕರ್ಷಣೆಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದೆ. ಗಂಧಕವು ಸಲ್ಫೇಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಮಾಧ್ಯಮ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಸಸ್ಯ ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಧಕವು ಅಪಕರ್ಷಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀರು ನಿಂತ ಜಾಗು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಅಪಕರ್ಷಿತ ಗಂಧಕ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಸಹ ನಿರವಯಮ ಸಲ್ಫೈಡ್‌ಗಳಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಆದಕಾರಣ, ಲಭ್ಯ ಗಂಧಕವನ್ನು ಸಸ್ಯಗಳು ಕುಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯುಕ್ತರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಬಲ್ಲ ಗಂಧಕ ಅಪಕರ್ಷಕ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಗಂಧಕವು ಶೇಕಡಾ 0.01 ರಿಂದ 0.05 ಭಾಗವಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ಕಾಲುಭಾಗ ಸಾವಯವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಕಾಲುಭಾಗ ನಿರವಯವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಶುಷ್ಕ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ

ಅದು ಜಪ್ತಂ ಗಂಟುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ (ಕಾಲ್ಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್) ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗಂಧಕಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಮುಖ್ಯ ಸಾವಯವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳೆಂದರೆ ಅಮೈನೊ ಆಮ್ಲಗಳು, ಸಿಸ್ಟೈನ್, ಸಿಸ್ಟೀನ್ ಮತ್ತು ಮಿಥಿಯೊಸೈನ್. ಕೆಲವು ಜೀವಸತ್ವ (ವಿಟಿಮಿನ್)ಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಕಿಣ್ವ ಎ, ಬಯೋಟಿನ್, ಫಯಾಮಿನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾವಯವ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹಾಗೂ ಫಯೋಸಯನೇಟ್, ಫಯೋಯೂರಿಯಂ, ಅಲ್ಕಲಾಯಿಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲುಕೋಸೈಡ್ ಸಾವಯವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಗಂಧಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಗಂಧಕವು ಅಮೈನೊ ಆಮ್ಲಗಳು, ಕೆಲವು ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಕಿಣ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫೈಡ್ರೈಲ್ ($-SH$ ಗುಂಪು)ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸಾವಯವ ಉಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಅವು ವಿಭಜನೆಗೊಂಡು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಗಂಧಕವೂ ಸಹ ಇತರ ಮೂಲಧಾತುಗಳಂತೆಯೇ ಖನಿಜೀಕರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಾವಯವ ಗಂಧಕವಸ್ತುಗಳ ಖನಿಜೀಕರಣವು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರಜನಕ ಖನಿಜೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸದೃಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾವಯವ ಗಂಧಕ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ವಿಭಜನೆಯಿಂದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರಿಯೆಯು ಸಾವಯವ ಮಾಧ್ಯಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಸಲ್ಫೇಟಾಗಿ ಉತ್ಕರ್ಷಣೆಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಸ್ವಪೋಷಕ ಏಕಾಣುಜೀವಿಯಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಟ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಸಿಲ್ಲಸ್ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಆಕ್ಟಿನೊಮೈಸೀಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಗಂಧಕಯುಕ್ತ ಸಾವಯವ ಸಂಯುಕ್ತವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಆಗಿ ಖನಿಜೀಕರಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ಸಾವಯವ ಮಾಧ್ಯಮ ಜೀವಿಗಳಾಗಿವೆ. ಫಯೋಬ್ಯಾಸಿಲ್ಲಸ್, ಬೆಗ್ಗಿಯೇಟಿ ಮತ್ತು ಫಯೋತ್ರಿಕ್ಸ್ ಜಾತಿಗಳ ಸ್ವಪೋಷಿತ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳು ಮೂಲಧಾತುರೂಪದ ಗಂಧಕಮುಖೇನ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡನ್ನು ಸಲ್ಫೇಟಾಗಿ ಉತ್ಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ; ಇವು ಈ ಉತ್ಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಶಕ್ತಿಮೂಲವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕ್ಲೋರೊಬಿಯಂ ಮತ್ತು ಕ್ರೋಮೊಟಿಯಂ ಜಾತಿಯ ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಕ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳು ಇಂಗಾಲ ದೈಆಕ್ಸೈಡ್‌ನ ಅಪಕರ್ಷಣೆಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡನ್ನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್‌ದಾನಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆಸ್ಪರ್ಜಿಲ್ಲಸ್, ಪೆನಿಪಿಲ್ಲಿಯಂ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಿಯಂ ಜಾತಿಯ ಅನೇಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಸಿಸ್ಟೈನ್, ಮಿಥಿಯೊಸೈನ್, ಫಯೋಯೂರಿಯಂ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಸಾವಯವ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಫಯೋಬ್ಯಾಸಿಲ್ಲಸ್ ಡಿನೈಟ್ರಿಫಿಕೇನ್ಸ್ ಜೀವಿಯು H_2S ನ್ನು SO_4^{2-} ಆಗಿ ಉತ್ಕರ್ಷಿಸಿ ತದೇಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ತುದಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ಕಣ ಸ್ವೀಕಾರಕವಾಗಿ ಅಮ್ಲಜನಕವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನೈಟ್ರೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅನಿಲ ಮತ್ತು ನೈಟ್ರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್‌ಗಳಾಗಿ ಉತ್ಕರ್ಷ

ಸುತ್ತದೆ. ಬೆಗ್ಲಿಯೇಟ, ಥಯೋಕ್ಸಿನ್ ಮತ್ತು ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಕ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಜಲಜೀವಿಗಳು; ಇವು ಭೂವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಉತ್ಪಾದಕಗಳಾಗಿ ಅಷ್ಟೇನೂ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದವುಗಳಲ್ಲ.

ಥಯೋಬ್ಯಾಕ್ಟಿರಿಯಾ ಜಾತಿಯ ಗಂಧಕ ಉತ್ಪರ್ಷಕ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ್ಫೈಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಧಕ ಪೂರೈಕೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲಾ ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಂದ ನರಗುಂದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ(ಕರ್ಮಮಣ್ಣು) ಅಧಿಕ ಸೋಡಿಯಂಯುಕ್ತ ಕ್ಷಾರ ಮಣ್ಣುಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಗಂಧಕ ಉತ್ಪರ್ಷಕ ಥಯೋಬ್ಯಾಕ್ಟಿರಿಯಾಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಇಂಥ ಮಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪೈರೈಟ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಗಂಧಕ ಸೇರಿಸಿ ಬಿಸಿಮಾಡಿ, ಕ್ಷಾರಸಹಿಷ್ಣು ಥಯೋಬ್ಯಾಕ್ಟಿರಿಯಾ ಥಯೋಕ್ಸಿಡಾನ್‌ಗಳ ಪ್ರಭೇದದ ಅಣುಜೀವಿಯನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಮಣ್ಣಿನ ಜಲವಾಹಕತೆ ಮತ್ತಿತರ ಭೌತಿಕ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗೊಂಡು, pH 9.5ರಿಂದ ತಟಸ್ಥತೆಗೆ ಬಂದಿತು. ಈ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಸೋಡಿಯಂಯುಕ್ತ ಜೇಡಿಮಣ್ಣು 2-4 ವಾರಗಳ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಲಜನಕ ಜೇಡಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡಿತು.

ಜೈಸಲೊವಿಬ್ರಿಯಾ ಜಾತಿಯ ಅಪಕರ್ಷಕ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಾಯುಪರ ಜೀವಿಗಳು. ಇವು ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಸಾವಯವ ಅಮ್ಲಗಳು, ಮಧ್ಯಸಾರಗಳು ಮತ್ತು ಜಲಜನಕಗಳನ್ನು ಜಲಜನಕದಾಸಿಗಳಾಗಿಯೂ ಸಲ್ಫೇಟನ್ನು ತುದಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ಕಣ ಸ್ವೀಕಾರಕವಾಗಿಯೂ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫೇಟ್‌ಗಳು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಆಗಿ ಅಪಕರ್ಷಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದಿರುತ್ತವೆ. ಬತ್ತದ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಮೋನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಹಾಕಿದ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳು ಮಣ್ಣಿನ ಅಪಕರ್ಷಣ ವಲಯದಲ್ಲಿ(ಎಂದರೆ ಉತ್ಪರ್ಷಣ ಪದರದಿಂದ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಅಂಗುಲ ಕೆಳಗೆ) ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇಂಥ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅವು ಸಸ್ಯವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕುವ ಗಂಧಕದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕಡಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಹೆಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಅಮ್ಲಜನಕವು ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಲ್ಫೈಡ್ ವಿದ್ಯುದ್ವಾಹಕಣ ಜಲವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಕ್ಷಾರ pH

ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ದ್ರಾವಣದಿಂದ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಗಳಂಥ ಲೋಹ ವಿದ್ಯುತ್ಕಣಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಬತ್ತದ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹಿತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ ಅದು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಷವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದು.

ರಂಜಕದ ಮಾರ್ಪಾಟು

ಸಾರಜನಕ ಮತ್ತು ಗಂಧಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ರಂಜಕವು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗೊಳಗದೆ ಸಾವಯವ ಸಂಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆರೆತಿರುತ್ತದೆ. ಸಾವಯವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದು ಬಹುವಾಗಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಿಕ್ ಆಮ್ಲದಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಎಸ್ಪರ್ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಟಿಪಿ, ಎಡಿಪಿ, ಫೈಟಿನ್, ಸಕ್ಕರೆ ಫಾಸ್ಫೇಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಫೊಲಿಪಿಡ್‌ಗಳಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ನಿರವಯವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಬ್ಬಿಣ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್‌ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಥ್ರೋ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ. ಈ ನಿರವಯವ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಅದು, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ಸಸ್ಯವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ದಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಬಹುವಾಗಿ ರಂಜಕವನ್ನು ಕರಗಬಲ್ಲ ನಿರವಯವ ಅಥ್ರೋ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವು. ಫಾಸ್ಫೇಟ್‌ಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಕರಗಬಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು pH 6.5ರಿಂದ 7.0ರಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಕ್ಷಾರವಿರುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗದೆ ಇರುವ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೀಸಿಯಂ ಫಾಸ್ಫೇಟ್‌ಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಆಮ್ಲ pH ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗದಿರುವ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಸ್ಫೇಟ್‌ಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾವಯವ ಫಾಸ್ಫೇಟ್‌ಗಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಸಾವಯವ ಮಾಧ್ಯಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಂದ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಜಲವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೊಳಗುತ್ತವೆ. ಆಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಕೂಡಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೀಸಿಯಂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಆಗಿನ ಮಣ್ಣಿನ pH ಸ್ಥಿತಿಸುಗುಣವಾಗಿ ಬೆರೆತು, ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ರಂಜಕವನ್ನು ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರಜನಕ, ರಂಜಕ ಪ್ರಮಾಣವು 15:1ರಿಂದ 10:1ರವರೆಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ 10:1ರಿಂದ 5:1ರವರೆಗೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ರಂಜಕವು ಇತರ ಮೂಲಧಾತುಗಳಿಗಿಂತ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ

ವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ(ದೃಢಾಸ್ಥನನ್ನು ಹೊಂದುವ) ಛಾತುವಲ್ಲ. ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಲಘು ರಂಜಕವನ್ನು ಸಾಮಯಿಕ ರಂಜಕದ ಸಂಯುಕ್ತವಸ್ತುಗಳಾದ ವಿಫಲನೆಯಾದಿ ತಮ್ಮ ಜೀವಕೋಶಗಳ ರಚನೆಗೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ರಂಜಕದ ಚಲನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ ರಂಜಕವು ಸಸ್ಯವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಈ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ನಿರವಯವ ಫಾಸ್ಫೇಟ್‌ಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗದ ಫಾಸ್ಫೇಟ್‌ಗಳು ಸಾಗಯುವ ಮತ್ತು ನಿರವಯವ ಆದ್ದುಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಕರಗದ ರೂಪ ತೆಗೆಯುತ್ತವೆ.

ಸಾಮಯಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಫಲನೆಯಾಗುವಾಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು, ದ್ರವ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವುದು ಫೈಟಿನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಸ್ ಕಿಣ್ವಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿ, ರಂಜಕವನ್ನು ನಿರವಯವ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಫಾಸ್ಫೇಟು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೂಡಲೇ ಅದ್ದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕಿಣ್ವಣ ಮತ್ತು ಅಲೂಮಿನಿಯಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗದಿರುವ ವಸ್ತುವಾಗಿ, ಸಸ್ಯವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಿಗದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಫೈಟಿನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಸ್ ಆದ್ದುಗಳು ಕೂಡ ಕಿಣ್ವಣ ಮತ್ತು ಅಲೂಮಿನಿಯಂ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಫೈಟಿನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಸ್ ಇವುಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಆಸ್ಪರ್ಜಿಲ್ಲಸ್, ಪೆನಿಸಿಲ್ಲಿಯಂ ಮತ್ತು ರೈಜೋಪಸ್ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಮತ್ತು ಅಥೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಸಿಲ್ಲಸ್ ಪ್ರಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಸಾಮಯಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ರಂಜಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ತಕ್ಕ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವುದಲ್ಲದೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗದ ಇರುವ ನಿರವಯವ ಫಾಸ್ಫೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕರಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಸಸ್ಯವರ್ಗಕ್ಕೆ ದಕ್ಕುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸಾಗಯದ ಅವಶೇಷಗಳು ವಿಫಲನೆಯಾಗುವಾಗ, ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಂಗಾಲ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಆದ್ದುವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡು ಕ್ರಮೇಣ ಕರಗದ ಇರುವ ನಿರವಯವ ಫಾಸ್ಫೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ದ್ರಾವಣಕ್ಕೆ ತರುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಪ್ರಭೇದಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಲಿಲಿಯಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಬಕಾರುಬೀವಿಗಳು, ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಮೊಲೊಸಾಸ್, ಬ್ಯಾಸಿಲ್ಲಸ್, ಮೈಕೊಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ, ಮೈಕೊಕೊಕ್ಟಾಸ್, ಆಸ್ಪರ್ಜಿಲ್ಲಸ್, ಪೆನಿಸಿಲ್ಲಿಯಂ ಮತ್ತು ಪೆನಿಸಿಲ್ಲಿಯಂ ಮುಂತಾದ ಜಾತಿಯವು ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಸಾಮಯಿಕ ಆದ್ದುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಆದ್ದುಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗದಿರುವ ನಿರವಯವ ಕ್ಯಾಲ್ಷಿಯಂ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಫಾಸ್ಫೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕರಗಬಲ್ಲ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರುತ್ತವೆ; ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ, ಫಾಸ್ಫೇಟ್‌

ಟನ್ನು ಕರಗಿಸಬಲ್ಲ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳೆಂದರೆ ಥರ್ಮೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರ್ಸ್ ಪ್ರಭೇದವಾಗಿವೆ. ಇವು ಅಪಕರ್ಷಿತ ಗಂಧಕ ಸಂಯುಕ್ತವಸ್ತುಗಳಿದ್ದಾಗ ಸಲ್ಫೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಾರಜನಕೀಕಾರಕ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳು ಅಮೋನಿಯಂ ಲವಣಗಳಿಂದ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಆಮ್ಲವೂ ಕರಗದಿರುವ ನಿರವಯವ ಫಾಸ್ಫೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕರಗಬಲ್ಲ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಯವ ಸಂಯುಕ್ತವಸ್ತುಗಳ ನಿರ್ವಾಯುಪರ ವಿಭಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಯವ ಆಮ್ಲಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿ ಅವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗದಿರುವ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಸ್ಫೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕರಗಬಲ್ಲ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತೃತವಿದ್ಯಾ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಶಿಲಾ ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಕ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್‌(ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗದಿರುವ ಟ್ರೈಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಫಾಸ್ಫೇಟ್)ನ್ನು ಥರ್ಮೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರ್ಸ್ ಥರ್ಮೋಸ್ಟಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಧಕದ ಮೂಲಧಾತುಗಳೊಡನೆ ಸೇರಿಸಿ ಬಿಸಿದುದಾದಾಗ, ರಾಕ್‌ಫಾಸ್ಫೇಟ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಒಟ್ಟು ರಂಜಕಾಂಶದ ಶೇಕಡಾ 60ಭಾಗವು ಮೂರುವಾರ ದೊಡ್ಡಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಬಲ್ಲ ರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡಿತು. ಅನೇಕ ಸಾಮಯವ ಮಾಧ್ಯಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಗಂಧಕಯುಕ್ತ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳಿಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಮಾಡುತ್ತವೆ. ಗಂಧಕ ಅಪಕರ್ಷಕ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳು ಸಹ ಸಲ್ಫೈಡ್‌ಗಳಿಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ವಸ್ತುವು, ಥರಿಕ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಥರಸ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಬಲ್ಲ ಫಾಸ್ಫೇಟು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಥರಿಕ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಇರುವ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ, ನಿರ್ವಾಯುಪರಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧಾನದಿಂದ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಬಲ್ಲ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವುದು.

ಸಾಮಯವ ಪದಾರ್ಥಗಳ ವಿಭಜನೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುವ ವಾತಾವರಣದ ಅಂಶಗಳು ರಂಜಕದ ಖನಿಜೀಕರಣಕ್ಕೂ ಸಹ ಸಹಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಿಕ್ ಆಮ್ಲಗಳಿಂದ ಫೈಟಿನ್ ಅಥವಾ ಫಾಸ್ಫೊಲಿಪಿಡ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಬೇಗನೆ ರಂಜಕಾಂಶವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಬಹುದು.

ಸಾಮಯವ ಮಾಧ್ಯಮ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳ ಫಾಸ್ಫೇಟನ್ನು ಕರಗಬಲ್ಲ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವ ವಿಶೇಷ ಗುಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನೇಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಫಾಸ್ಫೇಟನ್ನು ಕರಗಿಸಬಲ್ಲ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೊಮೈಸೀಸ್ ವಿಭೇದಗಳನ್ನು ಬೀಜಕ್ಕೂ

ಮಣ್ಣಿಗೂ ಸೇರಿಸಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಯೋಗಮಾಡಿದ ಪ್ರಮೀಣರು, ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಫೇಟನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನವೇ ಈ ವಿಧಾನದಿಂದಲೂ ಉಂಟಾಗುವುದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದರೆ, ಈ ರೀತಿ ಅಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅನೇಕರು ಈ ಅಭ್ಯಯನವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬತ್ತದ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಆಫೋಫಾಸ್ಫೇಟನ್ನು ಆಫೋಫಾಸ್ಫೈಟ್, ಹೈಫೋಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಫೈನ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಿಸುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಕಿರಿಯ ಮೂಲಧಾತುಗಳ ಮಾರ್ಪಾಡು

ಸಸ್ಯಗಳ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅನೇಕ ಮೂಲಧಾತುಗಳು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಕಿರಿಯ ಮೂಲಧಾತುಗಳು (ಟ್ರೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್) ಎಂದು ಹೆಸರು. ಈ ಪಟ್ಟಿಗೆ ತಾಮ್ರ, ಕಬ್ಬಿಣ, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಜಿಂಕ್, ಬೋರಾನ್, ಮಾಲಿಬ್ಡೀನಂ ಮತ್ತು CO ಇವೇ ಮುಂತಾದುವು ಸೇರುತ್ತವೆ. ಇವು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೊಂದರ ಕೊರತೆಯುಂಟಾದರೆ, ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಕೊರತೆ ಲಕ್ಷಣಗಳುಂಟಾಗಿ ತತ್ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಫಸಲು ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಧಾತುಗಳು ಅನೇಕ ಅದರೈಜೀವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕಿಣ್ವಗಳಂತೆ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಅನೇಕ ಮೂಲಧಾತುಗಳು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪರ್ಪಣ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಅಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಫೆರಿಕ್ ರೂಪಕ್ಕೆ ಉತ್ಪರ್ಪಿಸುವಿಕೆಯು ಥಯೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಫೆರೋಆಕ್ಸಿಡಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೆರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಫೆರೋ ಆಕ್ಸಿಡಾನ್ಸ್ ಜೀವಾಣುಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ pH5ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಮೆಯಿದ್ದಾಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇವೆರಡೂ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಪೋಷಿತ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳಾಗಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಉತ್ಪರ್ಪಿಸುವ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳು ಜಲೀಯ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸ್ಟ್ರೋಟಿಲಸ್ ಲೆಪ್ಟೊಫ್ರಿಕ್ಸ್, ಕಲ್ಡಿಯೊನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾನೊಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭೇದ ಮುಂತಾದುವು ಈ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಇವು ಅಪಕರ್ಷಿತ ಕಬ್ಬಿಣ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಉತ್ಪರ್ಪಿಸುತ್ತವೆ.

ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥಗಳು

- Aberdeen, J.E.C. and Patil Kulkarni, B. C., 1969. Measurement of Concentration and distribution of *Ceratomyxa Paradoxa*(deseyens) Moreau. *Australian Journal of Agricultural Research*. 1962, 20: 845-856.
- Alexander, M., *Introduction to Soil Microbiology*. New York : John Wiley and Sons 1961.
- Burges A., and Rawled, F., *Soil Biology*. London and New York: Academic Press, 1967.
- Butler, F.C., 1953. Saprophytic behaviour of some Cercal root-rot fungi. Saprophytic Colonization of wheat straw. *Annals of Applied Biology*. 40: 284-297.
- Fogg, C.E., Stewart, W.D.P., Fay, P., and Walsby, A.E. *The Blue Green Algae*. London: Academic Press, 1973.
- Griffin, D.M., *Ecology of Soil Fungi*. London. Champman and Hall, 1972.
- Hiremath, P.C., Studies on brown leafspot of rice caused by *Dresehlera Cryzae*. M. Sc. (Agr.) Thesis. of University Agricultural Sciences. Bangalore 1974.
- Maclaren and Peterson, G.H., *Soil Biochemistry*. New York : Marcel Decker, 1967.
- Mulder, E.G., Lie, T.A., and Woldendrop, J.W., *Biology and Soil Fertility in Soil Biology*. Paris : UNESCO Publication, 1969.

- Quispel, A., *The Biology of Nitrogen Fixation*. Amsterdam : North Holland Publishing Company, 1975.
- Singh, R.N., 1950. Reclamation of Usar lands in India through blue green algae. *Nature*, 1950, 165: 325-326.
- Singh, R.N., *Role of Blue Green Algae in Nitrogen Economy of Indian Agriculture*. New Delhi : I.C.A.R Publication, 1961.
- Waksman, S.A., *The Actinomycetes*. Baltimore(USA): the william and Walkins Com., 1959.

ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದಕೋಶ

ಅಂಗಾಂಶ	Tissue
ಅಜಲ ಬೀಜಕಣ	Akinet
ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮ	Side effect
ಅಣುಸಾಲ:ಗಟ್ಟಿವಿಕೆ	Polymerization
ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರ(ಹಿತಕರ)	Optinum
ಅನಿಲವಂದಗಟ್ಟಿಕೆ	Adsorption
ಅನುತ್ಪರ್ಷಣೆ	Nonoxydation
ಅಪಕರ್ಷಣೆ	Reduction
ಅಮೈನೋಕಳಿತ	Deaminate
ಅವಲೋಕನ	Observation
ಅಸ್ಪಟಿಕ	Amorphous
ಅಸದಜೀವನ	Asymbiotic
ಅಕಗೊಳಿತ	Necrosis
ಅಹ್ಲಾಜನಕರಹಿತ	Anoxygenic
ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಕೊಳೆರೋಗ	Putato scab
ಆವರಣಸ್ಥಾನ	Ecological niches
ಆವೀಕರಣ	Volotalization
ಇರುಜನಿತ(ಇದ್ದೆಲ್ಲುಟ್ಟಿದ)	Autoschthonus
ಉಗ್ರ	Virulant
ಉತ್ಪರ್ಷಣೆ	Oxidation
ಉತ್ಪ್ರಿವರ್ತಿತ	Mutant
ಊದಾತೀತ	Ultraviolet
ಊಬೀಜಕಣ	Oospore
ಯಣವಿದ್ಯುದ್ವಾಹಿಕಣ	An-ion
ಏಕಾಣುಜೀವಿ	Bacteria
ಏಕಾಣುಜೀವಿ ಭಕ್ಷಕ	Bacteriophage
ಏಕಾಣುಜೀವಿಯೆಂದ	Bacteroid
ಐಚ್ಛಿಕ	Facultative
ಒಣಗು(ಬತ್ತು)	Desiccate

ಒಳಕೋಶೀಯ	Introcellular
ಒಳಸೋಸಿಕೆ	Leach
ಕರಗುಗುಡ್ಡಿ	Lysate
ಕರಗುಮಾಪಕ	Lysemeter
ಕರುಳು	Gut
ಕಶಾಂಗ	Flagella
ಕ್ಷಾರ	Alkali
ಕಿರಣಸ್ವಪೋಷಿತ	Photoautotrophic
ಕಿರಣಸ್ವರಣ	Fluorescent
ಕಿರಿಯ ಮೂಲಧಾತು	Trace element
ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳು	Stunt
ಕುಟುಂಬ	Family
ಕುದುರೆಮೆಂತೆ	Lucerne
ಕೂಡುಜೀವಿತನ	Commensalism
ಕೇಂದ್ರಕಾಪ್ಪು	Nucleic acid
ಕೇಶಾಪರಣ	Peritrichon
ಕೊನಿಡಿಯೋಹಿಡಿಕೆ	Conidiophore
ಕೋಶ	Cell
ಕೋಶದ್ರವ	Protoplasm
ಖಂಡ	Fragment
ಜಗ್ಗದ, ಜಟಿಲ	Recalcitrant
ಜಗ್ಗದ(ಜಟಿಲ)ಪರಮಾಣು	Recalcitrant molecule
ಜಟಿಲ, ಸಂಕೀರ್ಣ	Complex
ಚತುರ್ಯುಗ್ಯಕೋಶ	Tetraploid
ಚಪ್ಪಟೆಹುಳು	Flat worm
ಚಲನಾತ್ಮಕ	Motile
ಚಲಬೀಜಕಣ	Zoospore
ಜರಿ	Centipede
ಜಲವಿಶ್ಲೇಷಣ	Hydrolysis
ಜಾತಿ	Genus
ಜಾರುಗಾಜು	Slide

ಜಾರುಯೂವು	Slime mold
ಜೀವವ್ರವ್ಯ (ಜೀವಕಣರಸ)	Cytoplasm
ಜೀವವೃದ್ಧಿ ತಿರಾಸ್ತ	Ecology
ಜೀವವಸ್ತುಲಯ	Dissimination
ಜೀವ್ಯಾಣುವರ್ಧಕಸಾಧನ	Agar
ತಂತು	Filament
ತಂತುಜಾಲ	Mycelium
ತಂತುದಾರ	Hypha
ತಳಿಪಡಿ	Substrate
ತಳಿಶಾಸ್ತ್ರ	Genetics
ತಾಪಪ್ರಿಯ	Thermophile
ಪ್ರಾಪ್ರಾರಂಭಿಕ	Primitive
ತೋರುಹಾಯಿಕೆ	Transduction
ತೆಳ್ಳರೆ	Lamella
ದರಲಕ್ಷ, ದರಲಕ್ಷದ ದರಲಕ್ಷ	Trillion
ದ್ವಿವಳಧಾನ್ಯ	Pulse
ದ್ವಿವಳಧಾನ್ಯ	Binary fission
ದ್ವಿವಳಧಾನ್ಯ	Lactic acid
ಮೃತಸಂರಕ್ಷಕ ಪೃಷ್ಠೋಪಿತ ಜೀವಿ	Photo autotrophic
ದೇಹಗತ, ರಕ್ತಗತ	Assimilate
ದೇಹಗತ ಸೈಟ್ರೇಟ್ ಅಪಕರ್ಷಣ	Assimilatory Nitrate reduction
ಧನ ನಿವೃದ್ಧಾಪಿಕಣ	Cat-ion
ಸಂಯುಕ್ತೋಧಿ	Antiseptic
ನಿರ್ಧರಿಸು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸು	Determine
ನಿರ್ವಾಯುಪರ	Anaerobic
ನಿರಾಸರ	Inhospitable
ನಿಶ್ಚಲೀಕರಣ	Immobilization
ಸೂಕ್ಷ್ಮರತ	Comminution
ಪಂಜಿಡಿಸಿ	Chelate
ಪರಭಕ್ಷಣ	Predation

ಪರಮಾಣು	Molecule
ಪರಸ್ಪರಾವಲಂಬನ	Mutalism
ಪರಿಸರ	Environment
ಪ್ರಸರಣ	Radiation
ಪ್ರಭೇದ	Species
ಪಾಚಿ	Mosses
ಪಾಲಿಮರ್ ಅಣುಸಾಲು	Polymer chain
ಪಿಷ್ಟ	Starch
ಪುನರ್ ಸಂವೃತ್ತ	Recycling
ಪೂತಿಕೋಶ	Cyst
ಪೂರ್ವಕಣ ಬೀಜ ಸಂಯೋಗ	Precaryotic
ಪೆಟ್ರಿಡಿಸ್	Petrirdish
ಪ್ರೋಟೀನ್ ಲಯಕ	Proteolites
ಬದ್ಧ	Obligate
ಬಸಿದುಡೋಗು	Leach
ಬಾಷ್ಪೀಕರಣ	Volatalization
ಬಿ-ವಲಯ	B-Horizon
ಬೀಜಕಣ	Spore
ಬೀಜಾಣುದಾನಿ	Sporangium
ಬೀಜಾಣುದಾನಿ ಹಿಡಿಕೆ	Sporangioephore
ಬೇಳೆಕಾಳು	Legume
ಮಣ್ಣು ದುರ್ಬಲೀಕರಣ ಫಲಕ ವಿಧಾನ	Soil dilution plate method
ಮಧ್ಯಮಜೀವಿ ವರ್ಗ	Mesofauna
ಮರಹೇನು	Woodlice
ಮಾಂಸಾಹಾರಿ	Predacious
ಮೂಲಧಾತು	Element
ಮೂಲಧಾತುರೂಪದ ಗಂಧಕ	Elemental sulphur
ಮೇದಸ್ಸು, ಕೊಬ್ಬು	Aliphatic
ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ	Assimilation
ಮೊಳೆನೀಳೆ	Germiupe

ಯುಕ್ತ, ಬೀಜಕಣ
 ಯೂರಿಯಲಯಕ
 ರಕ್ತವರ್ಣಜನಕ
 ರಾಸಾಯನಿಕ ಸ್ವಪೋಷಿತ ಜೀವಿ
 ಲಯಜನಕ
 ಲೋಳೆ
 ಲಯನ
 ಲೋಳೆಯಂಥ
 ವಂಶ
 ವಂಶವಾಹಿ
 ವಂಶವಾಹಕ
 ವರ್ಣಮಾಪಕ
 ವರ್ಗ
 ವಸಾಹತು
 ವಾತಾವರಣ
 ವಾಯುಪರ
 ವಾಯುಮಂಡಲ (ವಾತಾವರಣ)
 ವಿಕಾಸ
 ವಿಘಟಿತ ಕಣಬೀಜ
 ವಿದ್ಯುತ್ಕಣ
 ವಿದ್ಯುತ್ಕಣದಾನಿ
 ವಿದ್ಯುತ್‌ಕಣ ಸ್ವೀಕಾರಕ
 ವಿದ್ಯುದ್ವಾಹಕಣ
 ವಿಭಾಗ
 ವಿಭೇದ
 ವಿರೋಧಿ
 ವಿಷಾಣು
 ಶಂಕುಕಾಯಿಮರ
 ಶತಕೋಟಿ
 ಶಿಲಾವಲ್ಕಿ
 ಶರೀರಧೃಗಳು

Zygosporc
 Ureolitic
 Haemoglobin
 Chemo autotropic
 Lysogenic
 Slime
 Lyse
 Mucilaginous
 Phylum
 Gene
 Genome
 Colourimeter
 Class
 Colony
 Atmosphere
 Aerobic
 Atmosphere
 Evolution
 Eucaryotic
 Electron
 Electron donor
 Electron acceptor
 Ion
 Division
 Strain
 Antagonistic
 Virus
 Conifers
 Billion
 Lichene
 Fungi

ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಪರೋಪಜೀವನ
ಶೈವಲ
ಸಂತಾನವೃದ್ಧಿಮಾಡಿ
ಸಂತೃಪ್ತ
ಸಂಯುಕ್ತ
ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ
ಸತು
ಸಹಜೀವನ
ಸ್ಥಳಾವರಣ, ಗೂಡು
ಸ್ರವಣ
ಸ್ವಯಂಜೀರ್ಣತೆ
ಸಾವಯವ ಮಾಧ್ಯಮಜೀವಿ
ಸ್ವೀಕಾರಕ
ಸಂಗಂಧಿತ
ಸುಪ್ತ, ಗುಪ್ತ
ಸುಪ್ತಭಕ್ಷಕ
ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ವರ್ಗ
ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ಶಾಸ್ತ್ರ
ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಸಸ್ಯ
ಸೋಂಕುವಾಹಕ
ಸೌಮ್ಯಭಕ್ಷಕ
ಹರಿತ್ತು
ಹಲಸಕ್ಕರೆ ಲವಣ
ಹವಳದ ದಿಬ್ಬ
ಹುಟ್ಟುಗುಣ, ಮೂಲಸ್ವಭಾವ
ಹುದುಗುವಿಕೆ
ಹುಸಿಪಾದ
ಹೆಜ್ಜೀವಿವರ್ಗ
ಹೊರಚಿವು
ಹೊರದಬ್ಬಿಕೆ (ದೂಡಿಕೆ)

Micoparasitism
Algae
Proliferate
Saturated
Compound
Synthesis
Zinc
Symbiosis
Niches
Exudation
Autolysis
Heterotroph
Recipient
Aromatic
Latent
Latent phage
Microfauna
Microbiology
Microflora
Vector
Temperate phage
Chlorophyll
Saccaride
Coral reef
Trait
Zymogenous
Pseudopodia
Macrofauna
Exoskeleton
Extrusion

ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

	ಸಾಧಾ	ಕೃತಿಗಳ
1. ಸುಭಿಕ್ಷತೆಗೆ ತೆರೆದ ಬಾಗಿಲು (ದ್ವಿತೀಯ ಮುದ್ರಣ)	2-50	
2. ಪೀಡೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ದ್ವಿತೀಯ ಮುದ್ರಣ)	7-50	
3. ಕೀಟ ವಿಂಗಡಣೆ	15-00	
4. ಕೀಟ ಹತೋಟಿ (ದ್ವಿತೀಯ ಮುದ್ರಣ)	12-50	
5. ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಶರೀರ ಕ್ರಿಯಾಶಾಸ್ತ್ರ, ಭಾಗ-1	6-25	
6. ತರಕಾರಿ ಬೇಸಾಯ	12-50	
7. ಕೃಷಿ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ನಿರೂಪಣಾವಳಿ	5-00	6-25*
8. ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕೈಪಿಡಿ	15-00	19-00*
9. ರೈತರ ನೆಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಮರಗಳು	15-00	19-00*
10. ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಶರೀರ ಕ್ರಿಯಾಶಾಸ್ತ್ರ, ಭಾಗ-2	11-25	15-00
11. ಬೀಜಗಣಿತ ಪರಿಚಯ	15-00	20-00
12. ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ	15-00	19-00
13. ಮಣ್ಣು	11-25	15-00*
14. ಕೃಷಿ ಸಹಕಾರ	6-25	10-00*
15. ಕಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಳೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ	15-00	19-00*
16. ಗೋಸಂಪತ್ತು	6-25	10-00*
17. ಧಾನ್ಯದಾಸ್ತಾನು ತತ್ವ ಮತ್ತು ಪದ್ಧತಿಗಳು	7-50	11-25
18. ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ಪಾದಕತೆ	17-50	21-25
19. ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ (ದ್ವಿತೀಯ ಮುದ್ರಣ)	6-00	16-00
20. ಹೊಲದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೀಳುವ ಕೆಲವು ಕೀಟಗಳು	8-25*	12-50*
21. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಡುವ ಕ್ರಮಗಳು	7-50*	12-50*
22. ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಶರೀರ ಕ್ರಿಯಾಶಾಸ್ತ್ರ, ಭಾಗ-3	10-00	15-00
23. ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣಾ ರೀಕ್ಷಣಾ ಪದ್ಧತಿಗಳು	11-25	16-25*
24. ಕಣಜದ ಪೀಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಹತೋಟಿ	15-00	19-00
25. ಸಸ್ಯ ವರ್ಗೀಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರ	15-00	20-00
26. ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ (ದ್ವಿತೀಯ ಮುದ್ರಣ)	6-00	16-00
27. ಕಡಲ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ	5-00	10-00
28. ಧಾನ್ಯದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೀಳುವ ಕೀಟಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಹತೋಟಿ	10-75*	

* ಪ್ರತಿಗಳು ತೇರಿವೆ

	ಸಾಧಾ	ಕ್ಯಾಲಿಕೂ
29. ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೀಳುವ ಕೀಟಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಹತೋಟಿ	4-50*	
30. ಶಿಶುವಿಹಾರ (ದ್ವಿತೀಯ ಮುದ್ರಣ)	6-00	
31. ಬೇಳೆಕಾಳು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೀಳುವ ಕೀಟಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಹತೋಟಿ	7-50*	
32. ಕೃಷಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಮೀಕ್ಷಣೆ	9-50	14-00
33. ಇಲಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ	9-50	13-25
34. ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೀಳುವ ಕೀಟಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಹತೋಟಿ	21-50*	
35. ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೀಳುವ ಕೀಟಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಹತೋಟಿ	16-25	
36. ಕ್ಯಾನಿಂಗ್-ಆಹಾರ ಜೋಪಾನನೆಯ ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ವಿಧಾನ	16-25	21-25
37. ಅಲಂಕಾರ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೀಳುವ ಕೀಟಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಹತೋಟಿ	10-75	
38. ಜೀವಕೋಶ ಕ್ರಿಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಜೀವರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ	20-00	25-00
39. ಎಲುಬುಶಾಸ್ತ್ರ	11-25	16-25
40. ಕದಲೆಕಾಯಿ	10-00	15-00
41. ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರವೇಶಿಕೆ, ಭಾಗ-1	25-00	30-00
42. ತೆಂಗು, ಅಡಕೆ, ಇತರ ಗರಿಮರಗಳಿಗೆ ಬೀಳುವ ಕೀಟಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಹತೋಟಿ	9-00	
43. ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೀಳುವ ಕೀಟಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಹತೋಟಿ	12-00	
44. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೋಳಿಸಾಕಣೆ	22-50	27-50
45. ಕಲ್ಲುನಾರು(ಭೂತಾಳೆ) ಗಿಡಗಳು	5-00	
46. ಎಣ್ಣೆಬೀಜ (ಕಾಳು)ಗಳ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೀಳುವ ಕೀಟಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಹತೋಟಿ	7-50	
47. ಹತ್ತಿ (ನೂಲು). ಹಾಗೂ ನಾರಿನ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೀಳುವ ಕೀಟಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಹತೋಟಿ	10-00	
48. ಹಸುರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರ, ಮೇವು ಹಾಗೂ ಉಪ್ಪುನೇರಿಳೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೀಳುವ ಕೀಟಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಹತೋಟಿ	5-00	

	ಸಾಧಾ	ಕ್ಯಾಲಿಕೂ
49. ಮಾವಕ(ಹೇಗೆಸೊವ್ವು, ಗಾಂಜ) ಮತ್ತು ಸಾಂಬಾರ (ಅರಿಶಿನ ಇತ್ಯಾದಿ) ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೀಳುವ ಕೀಟಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಹತೋಟಿ	3-75	
50. ಕೃಷಿ ಉಪಯೋಗಿ ಕೆಲವು ವೃಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಬೀಳುವ ಕೀಟಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಹತೋಟಿ	4-50	
51. ಸಸ್ಯಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ	25-00	30-00
52. ಮೀನುಗಾರಿಕೆ	10-00	15-00
53. ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಯುವಕ ರೈತಸಂಘಗಳ ಸಂಘಟನೆ	8-25	13-25
54. ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರವೇಶಿಕೆ, ಭಾಗ-2	20-00	25-00
55. ಸಾಮಯವ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರವೇಶಿಕೆ	14-00	19-00
56. ಪಶುರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ	12-50	17-50
57. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜೀನುಸಾಕಣೆ	20-00	25-00
58. ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಮೂಲದ ಸೋಂಕುರೋಗಗಳು	7-50	12-00
59. ದೊಡ್ಡರೋಗ	5-00	
60. ಮೂಲ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ	19-00	24-00
61. ಜೀನುಸಾಕಣೆ	17-50	22-50
62. ಕೃಷಿ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದಕೋಶ	3-25	
63. ಮಣ್ಣು ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸುರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಬೆಳೆ ಉತ್ಪಾದನೆ	20-00	25-00
64. ಕೃಷಿ ಅನಿಲಯಂತ್ರ ಹಾಗೂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರುಗಳು		60-00
65. ಸಹಕಾರಿ ಬೇಸಾಯ	18-00	23-00
66. ಕೋಶ	20-00	25-00
67. ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳ ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣ	12-50	19-00
68. ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಭೂಗಣಶಾಸ್ತ್ರ	20-00	25-00
69. ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ರೂಪಿಣಿಗಳು	17-00	22-00
70. ರೇಖಾತ್ಮಕ ಬೀಜಗಣಿತ	30-00	35-00
71. ಹುಲಿ-ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೃಗ	20-00	24-00
72. ನೀರಾವರಿ ತತ್ವ ಹಾಗೂ ಪದ್ಧತಿಗಳು	45-00	50-00
73. ಮಣ್ಣು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಕೃಷಿ	45-00	50-00
74. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವರ್ತನೆ	17-00	22-00

	ಸಾಧಾ	ಕಾರ್ತಿಕಾ
75. ಬೆಳೆ ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಹತೋಟಿ		125-00
76. ಸಸ್ಯತಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಧಾನಗಳು		60-00
77. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಶರೀರಕ್ರಿಯಾಶಾಸ್ತ್ರ	17-00	22-00
78. ಆಹಾರ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಗಳಿಸಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು (ಆಹಾರ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ವಿಜ್ಞಾನ, ಭಾಗ-1)	8-50	
79. ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ, ಕುಟುಂಬ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಹೆಸರುಗಳು	15-00	20-00
80. ಮೀನು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಗರೋತ್ಪನ್ನ ಆಹಾರಗಳ ಶೀತ ಜೋಪಾಸನೆ	20-00	25-00
81. ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕೀಲು ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯುಶಾಸ್ತ್ರ	20-00	25-00
82. ಕುರಿಸಾಕಣೆ	8-00	13-00
83. ಜೋಳ	10-00	15-00
84. ಹಂದಿ ಭ್ರೂಣಶಾಸ್ತ್ರ	35-00	40-00
85. ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯನಾಗಾರ ದನಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ	25-00	30-00
86. ದಾಸ್ಯಾನು ಕೀಟಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಹತೋಟಿ	8-00	
87. ಮನೆ ಕೀಟಗಳು ಇತರ ಪೀಡೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಹತೋಟಿ	10-00	
88. ಜಾನುವಾರು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬೀಳುವ ಕೀಟಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಹತೋಟಿ	10-00	
89. ತೆಂಗಿನ ಬೇಸಾಯ	9-00	14-00
90. ಆಹಾರ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಕೆಡುವಿಕೆಯ ತತ್ವಗಳು (ಆಹಾರ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ವಿಜ್ಞಾನ, ಭಾಗ-2)	11-00	
91. ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರದ ಬೆಳೆವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಿಧಾನಗಳು (ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ಜಗತ್ತು, ಭಾಗ-2)	17-00	
92. ಕೃಷಿ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದಕೋಶ	2-00	
93. ಹಸುರು ಸಸ್ಯದ ಜೀವನ	12-00	17-00
94. ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಚರ್ಮಪಚಯ (ಜೀವದ್ರವ್ಯ ಪರಿಣಾಮ) ಕ್ರಿಯೆಗಳು, ರಚನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯ ಸಂಬಂಧ (ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ಜಗತ್ತು, ಭಾಗ-2)	18-00	

	ಸಾಧಾ	ಕಾವ್ಯ
95. ವಿವಿಧ ಆಹಾರಗಳು ಕಲುಷಿತವಾಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ (ಆಹಾರ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ವಿಜ್ಞಾನ, ಭಾಗ-3)	15-00	
96. ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಆಹಾರ ಗಳು ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕಿಣ್ವಗಳು (ಆಹಾರ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ವಿಜ್ಞಾನ, ಭಾಗ-4)	7-00	
97. ರೋಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳು (ಆಹಾರ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ವಿಜ್ಞಾನ, ಭಾಗ-5)	5-00	
98. ಆಹಾರದ ನೈರ್ಮಲ್ಯ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ತನಿಖೆ (ಆಹಾರ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ವಿಜ್ಞಾನ, ಭಾಗ-6)	6-00	
99. ಕೃಷಿ ಕರ್ನಾಟಕ	12-50	17-50
100. ದಾಸ್ತಾನು, ಮನೆ, ಜಾನುವಾರು ಹಾಗೂ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬೀಳುವ ಕೀಟಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಹತೋಟಿ	35-00	
101. ಮತ್ಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ		50-00
102. ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ	35-00	40-00
103. ಫಾರ್ಮಿನರ್ವಹಣೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ		60-00
104. ಆಹಾರ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ವಿಜ್ಞಾನ		62-50
105. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ	25-00	35-00
106. ಬತ್ತದ ಬೇಸಾಯ	15-00	25-00
107. ಧಾನ್ಯದ ಬೆಳೆಗಳ ರೋಗಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಹತೋಟಿ	12-00	17-00
108. ವ್ಯವಸಾಯ ಮುನ್ನಡೆ	18-00	28-00
109. ಕೀಟಶಾಸ್ತ್ರ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದಕೋಶ	3-50	
110. ಸಚಿತ್ರ ಬತ್ತದ ಬೆಳೆ	12-50	22-50
111. ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆ ಕೈಪಿಡಿ	10-00	20-00
112. ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ಶಾಸ್ತ್ರ	10-00	20-00
113. ಭೂಸಾರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ	7-50	17-50
114. ಬೀಜಸ	9-00	19-00
115. ವೈರಸ್‌ಗಳು (ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ಜಗತ್ತು, ಭಾಗ-3)	7-50	